

全国高等教育自学考试

儿科护理学 (二)

单元综合测试 (一)

(考试时间 150 分钟)

本单元测试包括教材第一章至第五章中的内容,考查的重点、难点有:儿科护理学的范围和特点,小儿的体格发育,心理与社会的发展,儿童生长发育的评估,小儿营养与喂养,各年龄期儿童健康保健特点,传染病的管理和计划免疫,住院儿童的心理反应和护理,正常足月新生儿的特点及护理,新生儿重症监护单位,新生儿肺透明膜病,新生儿常见疾病的概念、临床特点、药物治疗、护理诊断与护理措施。

题号	一	二	三	四	五	总分	
题分	30	10	15	25	20	核分人	
得分						复查人	

第一部分 选择题 (30 分)

得分	评卷人

一、单项选择题 (本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的四个备选项中,只有一个符合题目要求,将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- 小儿 1 岁时体重约为出生时的 ()
A. 1 倍
B. 2 倍
C. 3 倍
D. 4 倍
- 小儿脑重接近于成人的年龄是 ()
A. 3 岁
B. 5 岁
C. 7 岁
D. 9 岁
- 婴儿期每日约需热能 ()
A. 250 kJ/kg
B. 380 kJ/kg
C. 420 kJ/kg
D. 460 kJ/kg

- 7~12 个月小儿的体重计算公式为 ()
A. 出生时体重(kg) + 月龄 × 0.7(kg)
B. 6(kg) + 月龄 × 0.25(kg)
C. 8(kg) + 月龄 × 0.15(kg)
D. 年龄(岁) × 2 + 7(或 8)
- 一个婴儿扶腋下能站得直,两手各握一玩具,能喃喃地发出单调音节,能伸手取物,能辨别人声,望镜中人笑。其最可能的年龄是 ()
A. 4 个月
B. 5 个月
C. 7 个月
D. 8 个月
- 1~9 岁腕部骨化中心的数目约为 ()
A. 岁数减 2
B. 岁数减 1
C. 岁数加 2
D. 岁数加 1
- 婴儿每日需水 ()
A. 50 ml/kg
B. 80 ml/kg
C. 100 ml/kg
D. 150 ml/kg
- 按 WHO 规定,成熟乳是指 ()
A. 产后最初 4 天内分泌的乳汁
B. 产后 5~10 天的乳汁
C. 产后第 11 天~9 个月的乳汁
D. 产后 10 个月以后的乳汁
- 为小儿接种活疫苗、菌苗时的皮肤消毒应用 ()
A. 2% 碘酊及 75% 乙醇
B. 2% 碘酊
C. 75% 乙醇
D. 新洁尔灭
- 适于胎龄儿是指出生体重在同胎龄平均体重的 ()
A. 第 10 百分位以下者
B. 第 20 百分位以下者
C. 第 10 至 90 百分位之间者
D. 第 90 百分位以下者
- 正常新生儿的呼吸频率为 ()
A. 18~24 次/分
B. 24~30 次/分
C. 30~40 次/分
D. 40~50 次/分
- 正常新生儿出生后 1 h 体温 ()
A. 可降 2.5℃
B. 可升 2.5℃
C. 可降 1.5℃
D. 可升 1.5℃
- 下列生物制品的用法,叙述错误的是 ()
A. 麻疹减毒活疫苗的接种对象为出生后 6 个月未患过麻疹的正常小儿
B. 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸应用凉开水溶化喂服
C. 为减少疼痛,流行性乙型脑炎注射前,可加入亚硫酸氢钠
D. 卡介苗用于预防结核病,小儿出生 24 h 后,即可接种
- 新生儿排胎便的时间一般为出生后 ()
A. 6 h
B. 8 h
C. 10 h
D. 12 h

15. 胚胎期是指怀胎最初 ()
 A. 4 周 B. 6 周
 C. 8 周 D. 10 周
16. 2 岁时小儿的身长约为 ()
 A. 50 cm B. 60 cm
 C. 75 cm D. 85 cm
17. 遗尿症是指_____仍发生不随意排尿 ()
 A. 3 岁后 B. 4 岁后
 C. 5 岁后 D. 6 岁后
18. 锌缺乏可影响核酸及蛋白质的合成,使垂体生长激素分泌减低,致使患儿 ()
 A. 身材矮小、智力发育延迟 B. 运动协调性差
 C. 前庭功能障碍 D. 呕吐、腹泻
19. 3 个月婴儿,体重 6 kg,给予 8% 糖牛奶喂养,每日需要牛奶的量是 ()
 A. 660 ml B. 760 ml
 C. 820 ml D. 860 ml
20. 小儿上部量与下部量相等的年龄是在 ()
 A. 2 岁 B. 6 岁
 C. 8 岁 D. 12 岁
21. 小儿听觉发育完善的年龄是 ()
 A. 2 岁 B. 4 岁
 C. 6 岁 D. 8 岁
22. 幼儿期对住院的反应不包括 ()
 A. 分离性焦虑 B. 退化现象
 C. 孤独感和反抗情绪 D. 忧虑自己会变成残废或死亡
23. 新生儿期是指 ()
 A. 脐带结扎起至生后 28 天止
 B. 脐带结扎起至生后 7 天止
 C. 脐带结扎起至生后 24 h 止
 D. 脐带结扎起至生后 30 天止
24. 脐带无菌结扎后逐渐干燥,一般脱落的时间为 ()
 A. 4~5 天 B. 5~6 天
 C. 1~7 天 D. 7~10 天
25. 长期哺羊乳的小儿易致 ()
 A. 缺铁性贫血 B. 巨幼红细胞贫血
 C. 再生障碍性贫血 D. 急性白血病

26. 为预防以下几种传染病使用的免疫制剂中属于减毒活疫苗的是 ()
 A. 结核 B. 脊髓灰质炎
 C. 伤寒 D. 乙型脑炎
27. 幼儿与学龄前期儿童对疾病的认识特点是 ()
 A. 常将疼痛等感觉与惩罚相联系,对疾病的发展及预后缺乏认识
 B. 对疾病的病因有一定的认识,认为道德行为与病因有关
 C. 恐惧身体的伤残和死亡
 D. 能够认识到疾病的原因,能用言语表达身体的不适
28. 新生儿循环系统的特点不包括 ()
 A. 卵圆孔关闭 B. 动脉导管关闭
 C. 听诊心前区无杂音 D. 动脉血压平均为 9.3/6.7kPa
29. 围生期是指 ()
 A. 胎龄满 28 周至出生后满 7 天
 B. 胎龄满 28 周至出生后满 2 天
 C. 脐带结扎起至生后 28 天止
 D. 脐带结扎起至生后 7 天止
30. 小婴儿的腋温正常值是 ()
 A. 36~37℃ B. 36.5~37.5℃
 C. 36.8~37.8℃ D. 37.5℃ 以下

第二部分 非选择题(70 分)

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分)

31. 前囟早闭或过小见于_____;晚闭或过大见于佝偻病、_____。
32. 婴儿开始进行户外活动的每日_____,每次_____。
33. 分离性焦虑分为三个阶段,即_____,_____与超然或否认阶段。
34. 新生儿溶血是由_____存在的与胎儿不配合的血型抗体(IgG)进入_____后引起的。
35. 新生儿硬肿病常并发_____,临终时可发生_____,肺部出现细湿啰音,口鼻流出鲜血。

号

准考证号

考场

诚信承诺：本人在考试中所提供的个人信息真实准确；

自愿遵守考试纪律；

如有违纪情况自愿接受相应处罚。

承诺人：_____

考试地点（考点学校名称）_____

密 封 线 内 不 要 答 题

得 分	评卷人

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36. 儿科护理学

37. 儿童保健

38. 青春期

39. 混合喂养

40. 适于胎龄儿

得 分	评卷人

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

41. 小儿生长发育过程中常见的心理行为偏移有哪些?

42. 简述母乳的优点。

43. 简述新生儿窒息复苏的方案。

44. 简述新生儿肺透明膜病的临床表现。

45. 简述新生儿生理性与病理性黄疸的临床特点。

47. 患儿系早产儿,女性,出生体重为 1 450 g,孕周为 32 周,出生后不久出现进行性呼吸困难。查体:T 36. 1℃,P 160 次/分,R 68 次/分,皮肤青紫,四肢较凉,口周吐沫,鼻扇,有三凹征,肌张力低,反应弱。

- 要求:(1)写出临床诊断。
(2)列出主要护理诊断。
(3)列出主要护理措施。

得分	评卷人

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

46. 试述对住院儿童心理反应的护理。

