

全国高等教育自学考试

儿科护理学(一)

单元综合测试(一)

(考试时间:150分钟)

本单元测试涵盖了考试大纲第一章至第六章的重点内容,通过练习使考生理解掌握考试重难点。主要的考核点包括:儿科护理学的范围及其相关内容;小儿生长发育及其各期发育特点;小儿保健及其各期保健特点;住院儿童的护理;新生儿及新生儿疾病患儿的护理;营养性疾病患儿的护理。

题号	一	二	三	四	五	总分	
题分	30	10	15	25	20	核分人	
得分						复查人	

第 I 部分 选择题

得分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

1. 婴儿期是指 ()
 - A. 自出生后脐带结扎开始至生后 28 天
 - B. 从出生后到 3 周岁之前
 - C. 自出生后到 2 周岁之前
 - D. 自出生后到 1 周岁之前
2. 前囟闭合的时间为 ()
 - A. 1~1.5 岁
 - B. 2~4 个月
 - C. 4~6 个月
 - D. 6~8 个月
3. 小儿平均出生体重为 ()
 - A. 3kg
 - B. 4kg
 - C. 5kg
 - D. 2kg
4. 小儿各系统发育最早的是 ()
 - A. 生殖系统
 - B. 神经系统
 - C. 脂肪组织
 - D. 淋巴系统
5. 某出生体重为 3kg 的小儿 5 个月时的标准体重为 ()
 - A. 7kg
 - B. 6.5kg
 - C. 9kg
 - D. 7.4kg

儿科护理学(一)单元综合测试(一)

6. 小儿从几岁开始能辨前后 ()
 - A. 4 岁
 - B. 2.5 岁
 - C. 3 岁
 - D. 2 岁
7. 食物的特殊动力作用最强的是 ()
 - A. 蛋白质
 - B. 脂肪
 - C. 糖
 - D. 矿物质
8. 下列哪一项不属于婴儿辅食添加的原则 ()
 - A. 婴儿腹泻时暂停辅食添加
 - B. 可同时添加多种辅食
 - C. 从稀到稠
 - D. 从细到粗
9. 母乳喂养的优点不包括 ()
 - A. 营养丰富,微量元素的吸收率低于牛乳
 - B. 易消化吸收
 - C. 有增进婴儿免疫力的作用
 - D. 含优质蛋白质
10. 2~3 岁小儿的呼吸频率是 ()
 - A. 20~25 次/分
 - B. 25~30 次/分
 - C. 30~40 次/分
 - D. 40~50 次/分
11. 5 岁小儿的舒张压正常值为 ()
 - A. 75mmHg
 - B. 65 mmHg
 - C. 60 mmHg
 - D. 45 mmHg
12. 正常新生儿呼吸与脉搏的比值是 ()
 - A. 1:2
 - B. 1:4
 - C. 1:1
 - D. 1:3
13. 患病或住院后害怕自己的身体残缺不全和发生改变的患儿见于 ()
 - A. 婴儿期
 - B. 学龄期儿童
 - C. 幼儿和学龄前儿童
 - D. 青少年
14. 小儿股静脉穿刺的部位是 ()
 - A. 腹股沟任意一点
 - B. 腹股沟中点
 - C. 腹股沟中 1/3 与外 1/3 交界处
 - D. 腹股沟中 1/3 与内 1/3 交界处
15. 给小儿测量血压时选择袖带宽度应为上臂长度的 ()
 - A. 1/2
 - B. 2/3
 - C. 3/4
 - D. 3/5
16. 对住院儿童的一般情况进行资料收集时,不需要收集 ()
 - A. 姓名
 - B. 年龄
 - C. 种族
 - D. 此前患病的详细情况
17. 新生儿高胆红素血症光疗时,灯管与婴儿皮肤的最合适距离是 ()
 - A. 15~30cm
 - B. 33~50cm
 - C. 55~60cm
 - D. 60~70cm
18. 新生儿重度窒息的表现不包括 ()
 - A. 皮肤苍白
 - B. 呼吸微弱或无呼吸
 - C. 心音低钝
 - D. 肌张力增强

儿科护理学(一)单元综合测试(一)

19. 新生儿破伤风清洁脐带时,宜使用 ()
 A. 75% 酒精 B. 1.5% 碘伏
 C. 1.5% 龙胆紫 D. 3% 过氧化氢
20. 新生儿轻度窒息的 Apgar 评分为 ()
 A. 0~2 分 B. 0~3 分
 C. 4~7 分 D. 8~10 分
21. 新生儿抚触的顺序是 ()
 A. 上肢、下肢、背部、腹部、臀部、头部、胸部
 B. 胸部、头部、背部、上肢、下肢、腹部、臀部
 C. 头部、胸部、上肢、背部、下部、腹部、臀部
 D. 头部、胸部、腹部、上肢、下肢、背部、臀部
22. 胎儿娩出后,关于气血循环和动力学的变化,下列说法中不正确的是 ()
 A. 脐带结扎,胎盘一脐血循环终止 B. 卵圆孔功能性关闭
 C. 动脉导管功能性关闭 D. 肺血管阻力增加
23. 下列关于新生儿泌尿系统的说法,错误的是 ()
 A. 肾功能不完善 B. 肾脏浓缩功能较差
 C. 肾排出过剩钠的能力较强 D. 多在出生后 24 小时内排尿
24. 肥胖儿童的体重至少超过同性别、同身高小儿参考平均值的 ()
 A. 10% B. 20% C. 25% D. 30%
25. 佝偻病最早出现的症状是 ()
 A. 免疫的低下 B. 肌肉松弛
 C. 神经精神症状 D. 生长发育迟滞
26. 重度营养不良婴幼儿的体重低于正常均值的 ()
 A. 20%~25% B. 25%~40%
 C. 30% 以上 D. 40% 以上
27. 肥胖患儿每天至少应该坚持运动 ()
 A. 20 分钟 B. 50 分钟 C. 40 分钟 D. 30 分钟
28. 维生素 D 缺乏性佝偻病头部症状不包括 ()
 A. 前囟过大 B. 颅骨软化 C. 方颅 D. 囟门闭合早
29. 支气管肺炎多见于以下哪个年龄段的小儿 ()
 A. 1 岁以下 B. 1~2 岁 C. 2~3 岁 D. 3~5 岁
30. 当血清离子钙浓度下降至多少以下时,可引起神经肌肉兴奋性增高 ()
 A. 1.0mmol/L B. 1.5mmol/L
 C. 1.75mmol/L D. 1.88mmol/L

第 II 部分 非选择题

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分)

31. 男孩的青春期是从_____岁开始至_____岁。
32. 患儿入暖箱后,应定时测量体温,并做好记录,在患儿体温未升至正常之间应每小时监测_____次,升至正常后可每_____小时检测 1 次。
33. 预防接种后患儿出现过敏性休克应立即皮下或静脉注射 1:1000 肾上腺素_____ml,必要时可重复注射。
34. 新生儿肺透明膜病又称_____,多见于_____。
35. 濒死儿童父母的心理反应过程可分为五个阶段:否认震惊、愤怒_____,_____、接受。
36. 婴儿适当的断奶时期为_____个月。

得 分	评卷人

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

37. 幼儿期
38. 过渡乳

密 封 线 内 不 要 答 题

39. 人工喂养

40. 正常足月新生儿

41. 雾化吸入法

得 分	评卷人

四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)

42. 简述小儿年龄阶段的划分。

43. 简述婴儿辅助食品的添加原则。

44. 简述住院儿童健康教育的原则。

45. 简述新生儿黄疸的治疗原则。

46. 简述营养性维生素 D 缺乏性佝偻病的原因。

得分	评卷人

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

47. 一小儿体重 14kg,身高 91cm;能跑,会骑三轮车,会洗手、洗脸,能穿简单的衣服;能说短歌谣,数几个数;能认识画上的东西,认识男女,自称“我”,表现自尊心、同情心,怕羞。请根据以上资料写出:
- (1)该小儿的年龄。
 - (2)该小儿处于哪一个年龄期。
 - (3)此年龄期小儿的保健重点。

48. 12 个月婴儿,体重低于正常均值 30%,腹部皮褶厚度 0.35cm,身高低于正常,消瘦明显,肌张力明显降低,肌肉松弛。请根据以上资料:

- (1)写出该患儿最可能的医疗诊断。
- (2)写出 3 个该患儿主要的护理诊断。
- (3)写出该患儿主要护理措施。

密封线内不要答题