

全国高等教育自学考试

内科护理学 (二)

单元综合测试 (一)

(考试时间 150 分钟)

本单元测试涵盖大纲 1~3 章内容,考查的重点包括慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘、心力衰竭、冠心病等呼吸、循环系统疾病及其护理。

题号	一	二	三	四	五	六	总分	
题分	15	10	20	15	20	20	核分人	
得分							复查人	

第 I 部分 选择题(25 分)

得分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- 慢性支气管炎的诊断标准:每年咳嗽、咳痰(或伴喘息)至少_____个月,并连续_____年或更长;能除外其他原因引起的慢性咳嗽 ()
A. 2;3 B. 3;3 C. 2;4 D. 3;2
- 吸入支气管舒张剂后 $FEV_1/FVC < \underline{\hspace{1cm}}$ 及 $FEV_1 < \underline{\hspace{1cm}}$ 预计值,可确定为不完全可逆的气流受限 ()
A. 70% ;80% B. 80% ;70% C. 70% ;70% D. 60% ;70%
- 关于 COPD 的并发症错误的是 ()
A. 慢性支气管炎 B. 慢性肺源性心脏病
C. 自发性气胸 D. 呼吸衰竭
- 下列关于支气管哮喘临床表现的叙述,不正确的是 ()
A. 具有反复发作性 B. 非常严重时哮鸣音可不出现
C. 发作时呈吸气性呼吸困难 D. 在夜间和清晨发作或加重

- 肺炎链球菌肺炎最具特征性的表现是 ()
A. 呼吸困难 B. 咳铁锈色痰 C. 语颤增强 D. 咳嗽、胸痛
- 确诊肺结核的重要依据为 ()
A. 典型的症状、体征 B. 结核菌素试验阳性
C. 贫血或红细胞沉降率加速 D. 痰中找到结核菌
- 下列各项关于肺心病的发病机制,错误的是 ()
A. 肺心病发生的关键环节是肺动脉高压 B. 缺氧引起肺血管收缩
C. 肺血管收缩造成肺动脉高压 D. 肺动脉高压导致左心负荷加强
- 呼吸衰竭最早出现的症状是 ()
A. 发绀 B. 呼吸困难 C. 精神症状 D. 心血管系统症状
- 患者,男性,60 岁,患冠心病心绞痛 5 年,轻度活动后出现心悸、气短,休息后很快缓解。该患者的心功能属于 ()
A. I 级 B. II 级 C. III 级 D. IV 级
- 窦性心动过速常见原因中,错误的是 ()
A. 心力衰竭 B. 休克 C. 吸烟后 D. 颅内高压
- 同步电复律的正确概念是 ()
A. 心电图中心 P 波触发放电 B. 心电图中心 T 波触发放电
C. 可在心电图中心任何时间放电 D. 心电图中心 R 波触发放电
- 下列各项中不属于心绞痛的常见诱因是 ()
A. 劳累 B. 感冒 C. 饱食 D. 睡觉
- 成人高血压的诊断标准是 ()
A. 收缩压 $\geq 130\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 80\text{mmHg}$
B. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$
C. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
D. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- 病毒性心肌炎最常见的病因是 ()
A. 流感病毒 B. 柯萨奇病毒 C. 埃可病毒 D. 腺病毒
- 急性肺水肿的特征性表现是 ()
A. 端坐呼吸 B. 哮鸣音 C. 严重气急 D. 咳粉红色泡沫痰

得分	评卷人

二、多项选择题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分,在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- 以下关于肺泡上皮 II 型细胞的叙述哪项是正确的 ()
A. 分泌表面活性物质 B. 降低肺泡表面张力
C. 维持肺泡容量的稳定性 D. 防止肺泡萎陷
E. 分泌的表面活性物质与呼吸困难无关

17. 肺气肿的典型临床表现是 ()
- A. 呼吸困难 B. 逐渐加重的呼吸困难
C. 肺气肿体征 D. 气喘
E. 咳嗽、咳痰
18. 下列关于支气管哮喘的临床表现叙述正确的是 ()
- A. 非常严重时哮鸣音可不出现 B. 胸闷、咳嗽和喘鸣
C. 发作性吸气性呼吸困难 D. 严重者可有端坐呼吸
E. 在夜间和清晨发作或加重
19. 留取合格的痰标本正确的方法是 ()
- A. 留取晨起第一口痰 B. 先用清水漱口 3 次
C. 轻轻咳出痰液 D. 如患者无痰可不采集
E. 盛于加盖的无菌容器中
20. 下列灭菌方法中能消灭结核菌的方法是 ()
- A. 70% 酒精 2 分钟 B. 煮沸 100℃ 5 分钟
C. 高压蒸汽 (120℃) 持续 30 分钟 D. 干燥环境下 5 个月
E. 将痰吐在纸上直接焚烧
21. 下列各项导致容量负荷过重的有 ()
- A. 心瓣膜返流性疾病 B. 肺动脉高压
C. 心内外分流性疾病 D. 高血压
E. 全身性血容量增多
22. 下列各项会使心率低于 60 次/分的有 ()
- A. 运动员 B. 休克 C. 颅内高压 D. 甲状腺功能减退
E. 阻塞性黄疸
23. 心绞痛患者口服硝酸甘油治疗的护理措施中, 正确的是 ()
- A. 发作时舌下含服, 一般 3~5 分钟可缓解
B. 若用药后出现面部潮红、头胀痛、心悸, 应告诉患者是由于药物扩张头面部血管所致, 以解除其顾虑
C. 第一次用药应避免站立体位
D. 该药物应避光保存, 最好 6 个月更换 1 次
E. 硝酸甘油不可嚼碎后继续含服
24. 属于高血压治疗的药物是 ()
- A. 卡托普利 B. 硝苯地平 C. 阿替洛尔 D. 氯沙坦
E. 西咪替丁
25. 心肌梗死的并发症包括 ()
- A. 心室壁瘤 B. 栓塞 C. 心力衰竭 D. 心脏破裂
E. 乳头肌功能失调或断裂

第 II 部分 非选择题(75 分)

得 分	评卷人

三、填空题(本大题共 20 小题,每空 1 分,共 20 分)

26. 急性呼吸窘迫综合征与_____有关。
27. 蛋白酶和_____是保证肺组织正常结构免受损害和破坏的主要因素。
28. 支气管哮喘与_____有关,通常出现广泛多变的可逆性气流受限。
29. 肺炎支原体肺炎抗生素治疗首选_____。
30. 肺结核的化疗分为_____和巩固两个阶段。
31. 肺源性心脏病呼吸衰竭时原则上给低浓度持续吸氧,鼻导管给氧时氧流量_____。
32. 华法林所致的出血可以用_____拮抗。
33. ST 段抬高型心梗患者血压应控制在_____以下。
34. 预激综合征发作频繁,症状明显时首选_____。
35. 凡心房颤动持续时间超过_____,在行转复心律前必须接受 3 周抗凝治疗。
36. 右心衰竭主要临床症状出现的病理基础为_____。
37. 心力衰竭的治疗中减轻心脏负荷的方法为休息、低盐饮食、利尿剂及_____。
38. 结核病的基本病理变化为渗出、增生(结核结节形成)和_____。
39. _____是最常用的病原学检测方法。
40. 心功能 IV 级者需_____卧床休息,自理活动由他人协助。
41. 心衰患者服药期间出现食欲不振,应警惕_____。
42. 心动过速根据异位起搏点的位置,可分为_____和室性心动过速。
43. _____是需要长时间维持人工气道的最适合方法。
44. 冠心病治疗中治疗稳定斑块应首选_____。
45. _____是呼衰诊治中最常用、最可靠的指标。

得 分	评卷人

四、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

46. 呼吸衰竭

诚信承诺：本人在考试中所提供的个人信息真实准确；
自觉遵守考试纪律；
如有违纪情况自愿接受相应处罚。

承诺人：_____

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

考场_____号

考试地点 (考点学校名称) _____

密 封 线 内 不 要 答 题

47. 肺栓塞

48. 心律失常

49. 心肌梗死

50. 高血压急症

得分	评卷人

五、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

51. 简述呼吸系统的防御功能。

52. 简述肺心病患者进行全身活动时的注意事项。

53. 简述洋地黄中毒的处理措施。

(2) 家庭氧疗的给氧方式、时间及氧疗目标。

(3) 呼吸锻炼的两种方法及其目的。

54. 简述心绞痛患者服用硝酸甘油的用药护理。

56. 患者, 男性, 61 岁, 高血压史 10 年, 伴头晕、头痛、心慌、气急, 尤以上楼梯、干活时明显。一个月来因疲劳过度和情绪不佳而感上述症状加剧, 数次夜间因气憋而惊醒坐起, 同时感到视力明显减退, 经常发生无原因的恶心。一天来因情绪激动感剧烈头痛, 伴喷射状呕吐 3 次, 气急加剧不能平卧, 咳嗽, 咯白色泡沫痰。体检: 病人烦躁、气促, 端坐位, 面红, 血压 180/136mmHg, 心率 100 次/分, 心尖搏动向左下扩大、呈抬举性, 主动脉瓣第二心音亢进, 两肺底湿啰音, 腹部尚无异常发现。查体中两次呕吐出胃内容物, 伴轻度肢体抽搐。眼底镜下见视网膜上有出血, 渗出, 眼底动脉痉挛, 视盘水肿。心电图示左心室肥大, 心肌劳损; X 线胸片示心影向左下增大; 尿蛋白(++) , 血尿素氮和肌酐增高。

请写出:

(1) 该患者完整的临床诊断。

(2) 该患者的主要护理措施。

得分	评卷人

六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

55. 患者, 男, 72 岁, 15 年来每遇冬季或受凉后出现咳嗽, 咳痰, 痰为黄白色黏痰, 同时伴喘息, 不伴发热, 诊断为“慢性支气管炎”。近 3 年来自觉呼吸费力较前加重, 平地缓慢步行 100 米或登楼 1 层即感气促, 必须停下休息。3 天前受凉后再次出现咳嗽、咳黄色黏痰, 故来院就诊。查体: T: 37 °C, BP: 120/80 mmHg, R: 25 次/分, P: 92 次/分, 神清, 口唇稍发绀, 桶状胸, 肋间隙增宽, 呼吸运动减弱, 叩诊呈过清音, 双肺呼吸音粗, 双下肺可闻及少量湿啰音。血气分析显示, PaO₂: 62 mmHg, PaCO₂: 40 mmHg, 入院后医生确诊为“慢性阻塞性肺疾病急性发作, 慢性阻塞性肺气肿”。给予抗生素治疗 5 天后症状缓解, 但患者仍有呼吸困难, 医生嘱其进行家庭氧疗。

请写出:

(1) 该患者目前主要的一个护理诊断。

