

全国高等教育自学考试

内科护理学 (一)

单元综合测试(一)

(考试时间:150 分钟)

本单元包括考试大纲第一章至第三章的内容,考查的重点、难点有:护理程序的内容,慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病、支气管哮喘、肺结核、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征、心力衰竭、休克、心律失常、心脏骤停、冠心病、高血压及心瓣膜病的基本理论知识,并能运用整体护理程序对上述疾病的患者进行整体护理。

题 号	一	二	三	四	五	总 分	
题 分	30	15	15	20	20	核分人	
得 分						复查人	

第 I 部分 选择题

得 分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- Maslow 的人类基本需要层次理论将人的基本需要分为了几个层次 ( )  
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
- 提出自理理论的是 ( )  
A. 达尔文 B. Maslow C. Orem D. Selye
- 护理程序的第三步是 ( )  
A. 制定护理计划 B. 护理评估  
C. 护理诊断 D. 评价
- 呼吸道以何为界限分为上、下呼吸道 ( )  
A. 咽 B. 喉 C. 甲状软骨 D. 环状软骨
- 大量痰是 24 小时痰量超过 ( )  
A. 50ml B. 80ml C. 100ml D. 120ml

- 气管插入过深容易误入 ( )  
A. 细支气管 B. 右主支气管  
C. 肺叶 D. 左主支气管
- COPD 的重要危险因素是 ( )  
A. 吸烟 B. 大气污染 C. 感染 D. 化学物质
- 控制哮喘急性发作的首选药物是 ( )  
A. 沙丁胺醇 B. 异丙托溴铵  
C. 氨茶碱 D. 氢化可的松
- 肺结核的主要感染途径是 ( )  
A. 接触传播 B. 消化道传播 C. 呼吸道传播 D. 血液传播
- 控制癌痛首选的给药途径是 ( )  
A. 肌肉注射 B. 口服给药 C. 直肠给药 D. 静脉给药
- 自发性气胸的吸氧浓度 ( )  
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
- 呼吸衰竭最早出现的症状是 ( )  
A. 呼吸困难 B. 发绀 C. 昏迷 D. 头痛
- 右心功能不全的主要表现是 ( )  
A. 胸痛 B. 呼吸困难 C. 晕厥 D. 心源性水肿
- 休克患者宜采取的体位是 ( )  
A. 去枕平卧位 B. 截石位 C. 头低脚高位 D. 侧卧位
- 最常见的心律失常是 ( )  
A. 房室传导阻滞 B. 阵发性心动过速  
C. 早搏 D. 病态窦房结综合征
- 恶性程度最高的肺癌是 ( )  
A. 鳞癌 B. 腺癌  
C. 大细胞癌 D. 小细胞肺癌
- 临床上最常见的继发性肺结核是 ( )  
A. 慢性纤维空洞型肺结核 B. 浸润型肺结核  
C. 结核性胸膜炎 D. 血行播散型肺结核
- 下列首选青霉素治疗的肺炎为 ( )  
A. 肺炎支原体肺炎 B. 军团菌肺炎  
C. 肺炎球菌肺炎 D. 绿脓杆菌肺炎
- 慢支患者在什么情况下提示已发生 COPD ( )  
A. 在慢性咳嗽、咳痰基础上出现逐渐加重的呼吸困难  
B. 在慢性咳嗽、咳痰基础上出现大量咳痰

## 第 II 部分 非选择题

- C. 在慢性咳嗽、咳痰基础上出现疲乏无力、体重减轻  
 D. 在慢性咳嗽、咳痰基础上出现焦虑
20. 大咯血窒息时患者应采取的正确体位是 ( )  
 A. 头高脚低 45° 俯卧位                      B. 头低脚高 45° 仰卧位  
 C. 头低脚高 45° 俯卧位                      D. 头高脚低 45° 仰卧位
21. 服用后能使体液及分泌物呈橘黄色的抗结核药物是 ( )  
 A. 乙胺丁醇              B. 异烟肼              C. 链霉素              D. 利福平
22. 呼吸衰竭时缺氧的表现是 ( )  
 A. 注意力不集中                                  B. 呼吸困难  
 C. 心率增快    D. 紫绀
23. 二尖瓣狭窄患者于上楼时出现呼吸困难, 休息后缓解, 不能提重物, 其心功能状况为 ( )  
 A. IV 级                      B. I 级                      C. II 级                      D. III 级
24. 患者, 男性, 有高血压病史 10 年, 现血压波动在 165/100mmHg, 其高血压属于 ( )  
 A. 高血压一级                                      B. 高血压三级  
 C. 临界高血压                                      D. 高血压二级
25. 咯铁锈色痰提示患有 ( )  
 A. 肺结核                      B. 肺癌                      C. 肺炎球菌肺炎              D. 支气管扩张
26. 训练腹式呼吸时, 不正确的方法是 ( )  
 A. 吸气时腹部鼓起                                  B. 用鼻吸气, 用口呼气  
 C. 吸与呼之比为 2:1 或 3:1                      D. 呼气时腹壁下陷
27. 能引起左房和右心室增大, 最终导致右心衰竭的心脏瓣膜病是 ( )  
 A. 主动脉瓣狭窄                                      B. 主动脉瓣关闭不全  
 C. 二尖瓣狭窄    D. 二尖瓣关闭不全
28. 不属于室上性阵发性心动过速特点的是 ( )  
 A. 频率 150~250 次/分                              B. 节律不齐  
 C. QRS 波群形态正常                              D. P 波不易分辨
29. 慢性肺源性心脏病死亡的首要原因是 ( )  
 A. 酸碱失衡、电解质紊乱                          B. 肺性脑病  
 C. 休克    D. 呼吸衰竭
30. 护士在观察 PPD 结果时, 测得皮肤硬结的直径为 18mm, 局部有水泡, 则该患者 PPD 结果为 ( )  
 A. 有干扰, 需重做                                      B. 强阳性  
 C. 阳性    D. 弱阳性

得分	评卷人


### 二、填空题(本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分)

31. COPD 患者长期家庭氧疗的主要指征是  $\text{PaO}_2 < \underline{\hspace{2cm}}$  mmHg, 一般采用鼻导管吸氧, 氧流量控制在  $\underline{\hspace{2cm}}$  L/min。
32. 居社区获得性肺炎首位的是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
33. 肺癌按解剖学部位分类可分为  $\underline{\hspace{2cm}}$  和  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
34. 结核分枝杆菌最常侵犯的脏器是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
35. 由于心排量突然下降出现的晕厥称为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
36. 急性心肌梗死伴发室性早搏的首选治疗药物为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
37. 导致二尖瓣狭窄患者死亡的主要原因是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
38. 休克按病因分类包括  $\underline{\hspace{2cm}}$ 、感染中毒性休克、 $\underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\underline{\hspace{2cm}}$  和神经源性休克。
39. 小细胞肺癌患者首选的治疗手段是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
40. 心肌病中最常见的类型是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
41. 过多的液体积聚在组织间隙称为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

得分	评卷人

### 三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

42. 慢性支气管炎



号

准考证号

考场

诚信承诺：本人在考试中所提供的个人信息真实准确；  
自愿遵守考试纪律；  
如有违纪情况自愿接受相应处罚。

承诺人：\_\_\_\_\_

考试地点（考点学校名称）\_\_\_\_\_

密 封 线 内 不 要 答 题

43. 呼吸衰竭

44. 社区获得性肺炎

45. 机械通气

46. 中心静脉压

得 分	评卷人

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

47. 简述胸部叩击的注意事项。

48. 简述心力衰竭治疗中“减轻心脏负荷”的具体措施。

49. 简述 COPD 的治疗要点。

50. 简述急性左心衰的抢救措施。

得分	评卷人

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

51. 患者,男性,20 岁。因间断哮喘发作 3 年,近 3 天因天气骤然变凉出现咳嗽、气喘、呼吸困难加重收入院。入院后 2 天哮喘不缓解,且逐渐加重,应用各种止喘药治疗无效。诊断为重症哮喘发作,自发病以来进食少,且尿量减少,24 小时尿量共 700ml。体检:T 37℃,BP 120/70mmg,R 28 次/分,P 130 次/分,端坐呼吸,大汗淋漓,口唇轻度紫绀,两肺叩诊过清音,听诊呼吸音减弱,呼气相延长,并可闻及广泛哮鸣音,心率 130 次/分,律齐,余(一)。

请写出:(1)此患者主要的护理诊断。

(2)简述对患者进行健康教育的内容。

52. 患者,男性,58 岁。患高血压 10 余年,上午因生气后而感头部剧烈疼痛,恶心、视物模糊,测血压 238/140mmHg。经急诊入院。

请写出:(1)该患者已发生了什么?

(2)对该患者应采取哪些抢救措施?

