

第一部分 专项训练3600题



第一篇 消化系统



听听老师怎么讲



试试机考的锋芒

一 A1型题

- 关于壁细胞抗体下列说法正确的是
 - 此抗体的检测对慢性胃炎分型的意义不大
 - 是自身抗体,属于 IgE
 - 在 B 型萎缩性胃炎的阳性率高
 - 在 A 型萎缩性胃炎的阳性率低
 - 其抗原存在于壁细胞分化小管的微绒毛膜上
- 哪项不是十二指肠黏膜分泌的激素
 - 醛固酮
 - 胃泌素
 - 肠抑胃肽
 - 胰泌素
 - 缩胆囊素
- 关于胃食管反流病维持治疗的叙述,错误的是
 - 通常选用 H₂ 受体拮抗剂和质子泵抑制剂
 - 有持续用药和按需治疗两种方法
 - 按需治疗更适宜有并发症者
 - 目前多采用递减策略
 - 以调整至患者无症状的最小剂量为适宜剂量
- 可适用于各种情况的胃十二指肠溃疡的手术方式是
 - 毕 I 式胃大部切除术
 - 选择性迷走神经切断加引流术
 - 选择性胃迷走神经切断加胃窦切除术
 - 毕 II 式胃大部切除术
 - 高选择性迷走神经切断术
- 胃迷走神经切断术的基本要求是术后
 - 神经性胃酸分泌完全消失
 - 胃蛋白酶分泌完全消失
 - 胃相所致的胃酸分泌消失
 - 非壁细胞的分泌完全消失
 - 肠相所致的胃酸分泌消失

关于图书二维码,您要知道——

亲爱的读者,在本书各系统的开篇页,均附有赠送课程(听听老师怎么讲)和机考题库(试试机考的锋芒)。请扫描对应二维码,下载并安装“医学考试电子书APP”,即可拥有以上增值服务。如需更多视频课程,建议选购医学教育网网上辅导课程,详情见本书彩页。

做题随手记

6. 在功能性消化不良的发生和发展中,起重要作用的精神因素不包括
- A. 过度疲劳 B. 情绪紧张
C. 家庭纠纷 D. 工作压力
E. 饮食失调
7. 慢性胃炎发病的病因最重要的是
- A. 急性应激性疾病 B. 沙门菌感染
C. 幽门螺杆菌感染 D. 自身免疫
E. 以上都不是
8. 慢性胃炎的主要表现为
- A. 血清抗壁细胞抗体阳性
B. 血清内因子抗体阴性
C. 胃液酸度正常
D. 血清促胃液素含量低下
E. 约 10% 发生癌变
9. 食管癌患者进食呛咳,提示
- A. 癌侵犯吞咽神经 B. 上段食管癌
C. 食管气管瘘 D. 癌肺转移
E. 伴有气管炎
10. 胃黏膜分泌盐酸的壁细胞主要分布于
- A. 胃底和贲门 B. 胃体和胃窦
C. 胃底和胃体 D. 胃窦和幽门
E. 胃底和胃窦
11. 关于胃酸分泌的描述,错误的是
- A. 胃液分泌分为基础分泌和餐后分泌
B. 基础分泌是指不受食物刺激的胃液分泌
C. 基础分泌量较多
D. 餐后分泌分为三个时相
E. 在胃相的胃酸分泌中,主要为促胃液素介导的胃酸分泌
12. 患者诊断胃食管反流病,目前因胸骨后疼痛就诊,首选的药物是
- A. 奥美拉唑 B. 西咪替丁
C. 铝碳酸镁 D. 多潘立酮
E. 依托必利
13. 以下哪项辅助检查,在内镜检查无果后,有助于确定胃食管反流病酸反流
- A. 活检
B. 食管测压
C. 24h 胃食管 pH 监测
D. 食管滴酸试验
E. 质子泵抑制剂做试验性治疗
14. 对于有典型胃食管反流病症状而内镜检查阴性的患者,以下哪种方法有助于诊断
- A. B 超
B. 胃镜
C. 24h 胃食管 pH 监测
D. 腹部 B 超
E. 质子泵抑制剂做试验性治疗
15. 空腹痛常见于
- A. 胃溃疡
B. 十二指肠球溃疡
C. 胰腺炎
D. 胆囊炎
E. 溃疡性结肠炎
16. 胃溃疡节律性疼痛的特点是
- A. 餐后 1 小时出现疼痛
B. 空腹疼
C. 餐时疼
D. 夜间疼
E. 餐后 3~4 小时出现疼痛
17. 关于消化性溃疡下述哪些情况为手术适应证
- A. 上消化道出血
B. 反复发作的十二指肠球溃疡
C. 胃溃疡疑癌变
D. 并不全幽门梗阻
E. 复合溃疡
18. 十二指肠后壁溃疡大出血,如果病人条件允许,最好的术式为
- A. 高选择性迷走神经切断术
B. 包括溃疡在内的胃大部分切除术
C. 贯穿缝扎出血动脉主干
D. 单纯缝扎出血点
E. 结扎出血点加胃大部分切除术
19. 下列哪项不符合急性胃炎的治疗原则
- A. 停止服用非甾体类抗炎药
B. 止血并补充血容量
C. 阿托品缓解腹痛
D. 应用制酸剂和硫酸铝
E. 对病程持续数年反复发作者行全胃切除

做题随手记

20. 哪项不适合于严重应激导致的急性糜烂出血性胃炎的治疗
- A. 法莫替丁 B. 奥美拉唑
C. 前列腺素 E1 D. 去除应激因素
E. 口服稀释的肾上腺素
21. 慢性胃炎, 有胆汁反流。治疗上最好用
- A. 肾上腺皮质激素 B. 口服庆大霉素
C. 阿托品 D. 多潘立酮
E. 雷尼替丁
22. 不宜用于慢性胃炎治疗的药物是
- A. 消胆胺
B. 解痉药
C. 制酸药
D. 肾上腺糖皮质激素
E. 抗生素
23. 胃癌好发于
- A. 胃小弯 B. 胃大弯
C. 胃窦 D. 胃底
E. 胃体
24. 胃癌最常发生的转移途径为
- A. 直接蔓延 B. 血行转移
C. 种植转移 D. 淋巴转移
E. 沿肠管转移
25. 倾倒综合征多见于
- A. 毕 I 式胃大部切除术
B. 毕 II 式胃大部切除术
C. 选择性迷走神经切断术
D. 高选择性迷走神经切断术
E. 胃空肠吻合术
26. 下述哪种情况应考虑消化性溃疡发生后壁慢性穿孔
- A. 突然剧烈腹痛
B. 全腹肌紧张呈板状
C. 膈下游离气体
D. 病人处于休克状态
E. 腹痛顽固而持续
27. 初次诊断活动期十二指肠溃疡, 下列治疗中最适合的是
- A. 联合应用两种黏膜保护剂
B. 促动力剂+H₂受体拮抗剂
C. 质子泵抑制剂+黏膜保护剂
D. 质子泵抑制剂+铋剂+两种抗生素
E. 抗酸剂
28. 胃大部切除术后并发症中, 不能应用手术治疗的是
- A. 吻合口溃疡
B. 胃排空障碍
C. 早期十二指肠残端破裂
D. 吻合口梗阻
E. 严重碱性反流性胃炎
29. 原发性肝癌早期转移途径为
- A. 肺外转移 B. 淋巴转移
C. 直接浸润转移 D. 肝内进行转移
E. 骨转移
30. 肝硬化患者最严重的并发症是
- A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
B. 肝性脑病
C. 低钾血症
D. 原发性肝癌
E. 自发性腹膜炎
31. 为了防治脂肪肝, 要注意增加食物中的
- A. 蛋白质 B. 粗纤维
C. 卵磷脂 D. 淀粉
E. 糖
32. 最能说明肝硬化患者存在门脉高压的表现是
- A. 腹痛 B. 消化不良
C. 呕吐 D. 痔核形成
E. 食管静脉曲张
33. 下列哪项不属于肝硬化患者肝功能减退的临床表现
- A. 齿龈出血 B. 脾大
C. 黄疸 D. 浮肿
E. 肝掌
34. 血清壁细胞抗体阳性多见于
- A. 慢性萎缩性胃窦胃炎
B. 慢性萎缩性胃体胃炎
C. 胃溃疡
D. 胃癌
E. 急性糜烂性胃炎
35. 发生哪一项, 提示重症急性胰腺炎

做题随手记

- A. 消化道出血 B. 假性囊肿
C. 严重胆道感染 D. 持久高血糖
E. C-反应蛋白升高
36. 采用高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡, 主要依据是
A. 溃疡很少恶变
B. 能够减少胃酸分泌
C. 患者年龄大于 70 岁
D. 能防治幽门螺杆菌感染
E. 溃疡病灶小
37. 消化性溃疡发病机制中最重要的攻击因子是
A. 胃酸、胃蛋白酶 B. 胰酶
C. 胆汁 D. 精神、心理因素
E. 食物的理化刺激
38. 肝硬化腹水患者每日钠盐摄入量及进水量一般分别要控制在
A. 1.5~2g/d, 1000ml/d
B. 1.5~4g/d, 1000ml/d
C. 1.5~2g/d, 600ml/d
D. 1.5~4g/d, 600ml/d
E. <4g/d, 1000ml/d
39. 继发性腹膜炎毒性强主要是因为感染菌为
A. 金黄色葡萄球菌 B. 溶血性链球菌
C. 大肠杆菌 D. 各种细菌混合
E. 绿脓杆菌
40. 下列关于急性梗阻性化脓性胆管炎说法错误的是
A. 发病急骤, 病情进展快
B. 可出现休克、神经中枢抑制
C. 脉搏增快, 血压迅速升高, 呈急性重病容
D. 剑突下及右上腹部有压痛或腹膜刺激征
E. 白细胞计数升高, 中性粒细胞比例升高
41. 胰腺癌时能直接观察十二指肠壁和壶腹有无癌肿浸润, 并可收集胰液做细胞学检查及壶腹部活检做病理检查的影像学检查是
A. CT B. B 超
C. 内镜超声 D. ERCP
E. B 超下经皮细针穿刺
42. 对鉴别上、下消化道出血有帮助的是
A. 大便潜血阳性 B. 血尿素氮升高
C. 血肌酐升高 D. 血色素下降
E. 血氨升高
43. 慢性胃炎的发病机制中, 与幽门螺杆菌感染无关的因素是
A. 产生胃壁细胞抗体
B. 在胃黏液上具有 Hp 靶位
C. 细胞毒素作用
D. 免疫反应
E. 产生多种酶及代谢产物
44. 鉴别腹股沟斜疝和直疝错误的叙述是
A. 斜疝呈椭圆或梨形
B. 直疝呈半球形, 基底较宽
C. 斜疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
D. 直疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
E. 直疝常见老年人
45. 急性化脓性腹膜炎病人术后, 采取半卧位的目的, 哪项是错误的
A. 减少毒素吸收, 防止感染性休克发生
B. 增加肺活量, 减少肺部并发症
C. 渗出物流至盆腔, 吸收快, 避免形成盆腔脓肿
D. 腹肌松弛, 减少切口疼痛
E. 减少膈下脓肿发生的机会
46. B 型超声对哪种结石诊断准确率高
A. 胆囊结石 B. 胆总管结石
C. 肾结石 D. 肝内胆管结石
E. 胰腺结石
47. 关于结肠癌, 下列哪项是错误的
A. 结肠癌可伴有贫血和发热
B. 根据肿瘤形态, 可分为肿块型, 浸润型, 溃疡型
C. 左半结肠癌以全身症状为主
D. 结肠癌的血行转移, 多转移至肝
E. 结肠癌淋巴转移首先转移到结肠旁淋巴结
48. 左半结肠癌急性梗阻时, 下列措施中哪项不恰当
A. 注意纠正水电解质及酸碱失衡
B. 注意腹部情况, 预计病变严重程度, 早插胃管, 进行胃肠减压
C. 稍准备好便手术, 先作横结肠造口术, 二

做题随手记

- 期再作左半结肠切除吻合术
- D. 胃肠减压后，待梗阻解除便作左半结肠切除术
- E. 急诊作心电图，血生化等检查，应初步纠正酸中毒后手术
49. 左侧结肠癌合并急性肠梗阻时，最合理的手术方法应是
- A. 腹腔镜手术
- B. 左半结肠癌根治术
- C. 横结肠癌根治术
- D. 先行横结肠造口术，以后二期再行根治性左半结肠切除术
- E. 先行胃肠减压，后期再做左半结肠癌根治术
50. 关于急性小肠扭转临床表现的描述，错误的是
- A. 多见于老年人
- B. 多发生于饱餐后剧烈活动
- C. 起病急骤，腹痛剧烈
- D. 频繁呕吐
- E. 可出现休克
51. 以下哪项提示急性胰腺炎预后不良
- A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒
- C. 低钾血症 D. 低钙血症
- E. 低镁血症
52. 下列哪项应高度怀疑胃溃疡癌变
- A. 并发上消化道出血
- B. 血清胃泌素下降
- C. 血清抗壁细胞抗体阳性
- D. 五肽胃泌素试验显示胃酸缺乏
- E. X线钡餐显示多发性溃疡
53. 关于胃溃疡，下列说法错误的是
- A. 胃溃疡主要是因为防御、修复因素减弱所致
- B. 胃溃疡多为空腹疼痛，进食后缓解
- C. 胃溃疡主要发生在胃角和胃窦小弯侧
- D. 胃溃疡边缘光整，底部洁净，有肉芽组织构成，表面覆盖有灰色纤维渗出物
- E. 胃溃疡病人存在胃运动障碍，表现为胃排空延迟和十二指肠胃反流
54. 胃十二指肠溃疡外科手术的绝对适应证是
- A. 溃疡病穿孔 B. 应激性溃疡
- C. 瘢痕性幽门梗阻 D. 胃后壁溃疡
- E. 溃疡病出血
55. 恶性肿瘤种植性转移到盆腔，最多见的是
- A. 胃癌 B. 肝癌
- C. 乳腺癌 D. 胆管癌
- E. 食管癌
56. 关于急性胃炎的描述下列哪项不正确
- A. 急性胃炎是胃壁全层性炎症
- B. 幽门螺杆菌感染也可引起
- C. 腐蚀性胃炎的急性期不宜作胃镜检查
- D. Curling 溃疡与烧伤有关
- E. Cushing 溃疡与中枢神经病变有关
57. 下列可协助诊断急性阑尾炎的体征中，哪项正确
- A. 不同患者右下腹压痛点位置一致
- B. 右下腹腹膜刺激征提示阑尾炎症已不是早期阶段
- C. 腰大肌试验阳性提示阑尾位置较浅
- D. 闭孔内肌试验阳性提示阑尾位置较深
- E. 结肠充气试验阴性可排除阑尾炎诊断
58. 老年急性阑尾炎的临床特征是
- A. 显著腹肌紧张 B. 常有寒战、高热
- C. 腹痛、恶心明显 D. 右下腹压痛明显
- E. 阑尾容易缺血、坏死
59. 细菌性肝脓肿，哪项是正确的
- A. 起病急，体温可高达 39~40℃
- B. 70%为血源性
- C. 大部分病例，细菌沿门静脉入肝
- D. 肝区部有剧烈的绞痛
- E. 有左胸腔积液
60. 下列哪项属于股疝的常见特点
- A. 多见于中老年男性
- B. 疝块较大
- C. 疝块呈锥形隆起
- D. 咳嗽冲击感明显
- E. 容易嵌顿、容易绞窄
61. 下列哪项符合继发性腹膜炎腹痛特点
- A. 持续性剧痛

做题随手记

- B. 间断疼痛
 C. 疼痛固定在原发病部位
 D. 变换体位可缓解腹痛
 E. 体温升高发生在腹痛之前
62. 下列哪项不是胃食管反流病并发症
 A. 胃癌 B. 食管狭窄
 C. 食管腺癌 D. 消化道出血
 E. Barrett 食管
63. 下列哪种物质可使下食管括约肌张力增高
 A. 盐酸 B. 内因子
 C. 胃蛋白酶 D. 促胃液素
 E. 钙通道拮抗剂
64. 关于 A 型胃炎, 下列哪项是恰当的
 A. 大多数由幽门螺杆菌感染引起
 B. 较常见
 C. 病变主要累及胃体和胃底
 D. 发病和遗传因素无关
 E. 不易导致贫血
65. 选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡时加作幽门成形术的目的是
 A. 进一步降低胃酸 B. 防止手术后腹泻
 C. 减低溃疡复发率 D. 解除胃滞留
 E. 有利于消化吸收功能
66. 诊断幽门梗阻最有价值的体征是
 A. 振水音阳性 B. 肠鸣音亢进
 C. 上腹部膨隆 D. 明显脱水
 E. 上腹部固定压痛
67. 脂肪性肝病治疗的首要目标是
 A. 逆转肝细胞脂肪变, 减少胆囊炎和胆结石的发生
 B. 纠正代谢紊乱, 防治 2 型糖尿病和心血管事件
 C. 防治 NASH, 阻止肝纤维化进展
 D. 减少肝硬化的发生
 E. 保肝抗炎药物治疗
68. 根除幽门螺杆菌治疗后, 不宜选用的复查方法是
 A. ¹³C 或 ¹⁴C 尿素呼气试验
 B. 血清幽门螺杆菌抗体检查
 C. 组织学检查
 D. 快速尿素酶试验
 E. 幽门螺杆菌培养
69. 右下腹麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张是急性阑尾炎的典型体征, 其发生的主要机制是
 A. 炎症致盲肠痉挛 B. 内脏神经反射
 C. 炎症致阑尾痉挛 D. 阑尾腔压力增高
 E. 炎症刺激壁层腹膜
70. 肝肾综合征最重要的临床表现是
 A. 黄疸加深 B. 腹水加重
 C. 少尿、无尿 D. 意识障碍
 E. 出现恶心、呕吐
71. 胆总管的血液供应主要来自
 A. 肝固有动脉 B. 胆囊动脉
 C. 胃十二指肠动脉 D. 肝右动脉
 E. 肝左动脉
72. 门静脉高压症主要临床表现是
 A. 男性乳房发育 B. 肝掌
 C. 肝病面容 D. 腹水
 E. 蜘蛛痣
73. 治疗肝硬化腹水时提高血浆胶体渗透压的方法是静脉输液
 A. 高渗葡萄糖 B. 等渗葡萄糖
 C. 白蛋白 D. 生理盐水
 E. 复方氨基酸
74. 关于轻症急性胰腺炎的治疗哪项不合理
 A. 限制液体入量 B. 禁食、胃肠减压
 C. 抑酸 D. 喹诺酮抗感染
 E. 维持酸碱平衡
75. 晚期肝硬化最严重的并发症是
 A. 肝肾综合征 B. 肝性脑病
 C. 上消化道出血 D. 原发性肝癌
 E. 电解质紊乱
76. 下列慢性胃炎的病理改变, 属于癌前病变的是
 A. 黏膜重度萎缩, 腺体减少
 B. 假幽门腺化生
 C. 肠上皮化生
 D. 重度不典型增生
 E. 淋巴滤泡增生
77. 肠梗阻非手术治疗中, 下列观察项目哪项最

做题随手记

主要

- A. 腹膜刺激征 B. 脉搏增快
C. 腹胀较前明显 D. 肠鸣音较前减弱
E. 腹痛加重
78. 脂肪性肝病患者需要作出的生活方式改变是
A. 调节能量摄入, 合理减重
B. 减少总脂肪摄入
C. 用不饱和脂肪酸代替饱和脂肪酸
D. 脂肪摄入量低于总能量的 30%
E. 以上都是
79. 关于小儿急性阑尾炎, 错误的是
A. 病情发展快且重
B. 右下腹体征明显
C. 穿孔率达 30%
D. 并发症及死亡率较高
E. 宜早期手术

二 A2 型题

1. 男, 48 岁, 因胃癌而行剖腹探查时, 发现肿块已浸润至横结肠, 但较局限, 该病人宜
A. 禁忌手术
B. 行胃癌根治术+横结肠切除术
C. 行胃大部切除术
D. 行全胃切除术
E. 行横结肠切除术
2. 45 岁, 男性病人, 突然寒战高热, 右上腹胀痛, 体温 39℃~40℃, 呈弛张热型。查体: 右上腹肌紧张, 压痛, 肝脏重大。化验: 白细胞 $21 \times 10^9/L$, 核左移。X 线示: 右膈肌升高, 运动受限。B 超: 提示肝内疑有液平, 同位素扫描提示有肝脏占位性病变, 应首先考虑
A. 肝癌 B. 细菌性肝脓肿
C. 阿米巴肝脓肿 D. 急性肝炎
E. 急性化脓性肝胆管炎
3. 男性, 38 岁, 肝硬化病史 2 年。高蛋白饮食后出现睡眠障碍, 计算力障碍, 脑电图异常。下列治疗措施哪种不合适
A. 限制蛋白饮食 B. 弱酸性溶液灌肠
C. 弱碱性溶液灌肠 D. 乳果糖口服
E. 精氨酸滴注
4. 男, 35 岁。黄疸已 1 个月, 右上腹轻微胀痛, 食欲不振, 经内科治疗无效。查体: 肝大, 胆囊增大, 血胆红素 $17 \mu\text{mol/L}$, 凡登白直接反应阳性, 转氨酶 70 单位, 碱性磷酸酶 155IU/L, AFP>50ng/ml, 可能诊断是
A. 黄疸型肝炎 B. 胆总管结石梗阻
C. 肝癌 D. 肝硬化晚期
E. 壶腹周围癌
5. 男性, 31 岁。左下腹痛伴脓血便 4 年, 加重 3 个月, 应用抗生素治疗效果不佳。近 1 周出现高热、腹胀、排气减少。查体: 消瘦, 全腹膨隆, 全腹压痛, 无反跳痛。最可能的诊断是
A. 溃疡性结肠炎并肠梗阻
B. 克罗恩病并肠梗阻
C. 溃疡性结肠炎并中毒性巨结肠
D. 克罗恩病并中毒性巨结肠
E. 克罗恩病并腹腔脓肿
6. 男, 53 岁, 上腹胀痛 10 余年, 多于饭后约 30 分钟加重。半年来上腹胀加重, 伴反酸, 间断呕吐胃内容物, 吸烟 15 年, 饮白酒 10 年, 每日约半斤。患者的病变最可能位于
A. 十二指肠球部 B. 胃窦
C. 胃体 D. 贲门
E. 胃底
7. 男, 35 岁, 28 小时前饱餐后参加剧烈运动时突发腹痛、腹胀。持续性, 伴阵发性绞痛, 并有频繁呕吐, 无肛门排气病情加重并晕倒。查体: $T35.6^\circ\text{C}$, $P126$ 次/分, $BP80/50\text{mmHg}$, 急性病容, 四肢发绀, 全腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音消失, 腹穿抽出血性液体。该患者所患疾病最主要的病理生理改变是
A. 心输出量低, 外周阻力高
B. 左心室功能不全
C. 短时大量失血
D. 细胞外液容量迅速减少
E. 下腔静脉回流障碍
8. 男, 40 岁, 三年来常发作右上腹痛, 午夜为甚, 疼痛放射至背部, 先后发作三次上消化

做题随手记

- 大出血，曾经做三次胃镜钡餐检查：胃和十二指肠球部均未见异常。体检：肝脾不大，右上腹有压痛，下述哪种病可能性最大
- A. 胃癌 B. 肝硬化伴慢性胃炎
C. 胃溃疡 D. 十二指肠球后溃疡
E. 幽门管溃疡
9. 男，80岁。右腹股沟斜疝6小时来诊，既往有可复性腹股沟肿物病史30年，检查：右侧腹股沟至阴囊10cm×6cm，嵌顿疝，皮肤无红肿，首选的治疗方法是
- A. 试行手法复位
B. 手术复位并行疝囊高位结扎
C. 手术复位并行加强腹股沟管修补术
D. 手术复位并行无张力疝修补
E. 经腹腔镜疝修补术
10. 男，25岁。反复腹痛、腹泻、便血10个月。近日加重伴发热，体温39℃，1天前因腹痛肌注阿托品治疗6小时后腹胀明显。查体：70/50mmHg，心率120次/分。最可能出现的情况是
- A. 肠套叠 B. 肠穿孔
C. 肠梗阻 D. 肠出血
E. 中毒性巨结肠
11. 男，55岁。上腹部不适2个月。进食后饱胀，有时伴疼痛，食欲下降、乏力，症状逐渐加重。为明确诊断首选的检查是
- A. 胃液分析
B. 胃镜
C. 食管24小时pH监测
D. 腹部X线片
E. 腹部CT
12. 男，68岁。排便习惯改变3个月，便中带血1周，查体：浅表淋巴结未触及肿大，腹平软，未触及包块，移动性浊音(-)，肠鸣音正常。直肠指诊：直肠前壁距肛缘4cm菜花型肿物，侵及直肠1/4周径，肿物直径2cm，指套染血。为明确诊断及选择治疗方式，最佳的辅助检查是
- A. 腹部MRI B. 腹部CT
C. 腹部B超 D. 直肠镜
E. 结肠镜
13. 男，7岁。便血10天。大便时见粪便表面附有鲜血，有时在大便后有鲜血滴出，无疼痛，大便次数正常，粪便形状正常。首先考虑的诊断是
- A. 内痔 B. 直肠脱垂
C. 直肠息肉 D. 肛窦炎
E. 肛裂
14. 男，47岁。反酸、烧心2个月，间断胸痛、咳嗽，无吞咽困难。首先考虑的诊断是
- A. 消化性溃疡 B. 胃食管反流病
C. 食管癌 D. 贲门失弛缓症
E. 胸膜炎
15. 男，35岁。左下腹外伤后24小时。入院时有弥漫性腹膜炎，行剖腹探查术。术中见腹腔内有黄色脓液及粪便，降结肠下段有一0.5cm穿孔，有粪便溢出。最合适的术式是
- A. 穿孔处修补，横结肠造口
B. 单纯结肠穿孔修补术
C. 降结肠穿孔处切除，端端吻合术
D. 左半结肠切除术
E. 单纯腹腔引流术
16. 男，40岁。肝区疼痛3个月，无发热。右下触及肝脏，质硬，表面有直径1.5cm结节，无触痛。既往慢性乙型病毒性肝炎病史10年。为确认诊断最有意义的检查是
- A. 腹部CT
B. 穿刺活检
C. 选择性肝动脉造影
D. 腹部B超
E. 腹部MRI
17. 女，36岁。上腹痛伴烧心3年，多在餐后约1小时出现剑突下疼痛，1~2小时后可缓解。内科规范治疗1年，症状反复发作，曾有2次黑便。胃镜及X线钡餐透视均在胃角处见1.5cm大小溃疡，决定手术治疗，首选的术式为
- A. 高选择性迷走神经切断术加引流术
B. Billroth I胃大部切除术
C. Billroth II胃大部切除术

做题随手记

- D. Roux-en-Y 吻合术加迷走神经干切断术
E. 选择性迷走神经切断术加引流术
18. 男, 28 岁。间断腹痛、发热 3 年。结肠镜检查: 回肠末段见 4cm×1cm 纵型溃疡, 周围黏膜铺路石样改变。活检标本可能出现的主要病理改变是
A. 隐窝脓肿 B. 杯状细胞减少
C. 非干酪样肉芽肿 D. 干酪样肉芽肿
E. 可见包涵体
19. 女性, 47 岁, 胆囊结石病史 4 年, 曾先后发作性胆绞痛 4 次, BUS 显示胆囊内充满结石, 首先选择的治疗方法是下列哪一种
A. 口服排石饮液
B. 口服熊去氧胆酸片
C. 口服利胆素片
D. 腹腔镜下胆囊切除术
E. 经皮胆镜取石术
20. 男, 38 岁, 肛周皮下有一深部脓肿, 一端向体表穿破, 另一端向直肠穿孔, 不断有脓、粪液流出, 此管道应称为
A. 空洞 B. 溃疡
C. 蜂窝织炎 D. 窦道
E. 瘘管
21. 女, 30 岁。反复腹痛、腹泻 10 年。排便后腹痛可缓解, 无发热、消瘦。多次查粪常规示软便或黏液便, 镜检(-), 隐血(-)。最可能的诊断是
A. 克罗恩病 B. 肠结核
C. 溃疡性结肠炎 D. 慢性细菌性痢疾
E. 肠易激综合征
22. 女性, 32 岁, 4 个月腹胀, 低热, 盗汗。查体: 全腹压痛, 右上腹可触及不易推动肿块, 边不整。近 3 天频繁呕吐, 考虑诊断可能是
A. 结核性腹膜炎粘连型
B. 结核性腹膜炎并肠梗阻
C. 结核性腹膜炎并胃炎
D. 结核性腹膜炎并神经性呕吐
E. 结核性腹膜炎并消化性溃疡
23. 女, 45 岁。1 天前进高脂餐后出现右上腹剧烈绞痛, 阵发性加剧, 并向右肩背部放射, 伴恶心、呕吐、发热, 体温 38℃。该患者最可能的诊断是
A. 肝脓肿 B. 胃溃疡穿孔
C. 急性肺栓塞 D. 急性胆囊炎
E. 急性胰腺炎
24. 男性, 58 岁, 因原发性肝癌行左半肝切除术后, 定期随访时下列哪项检查可预测肿瘤复发
A. 肝脏 B 超 B. 肝脏 CT
C. 定期复查 AFP D. 选择性肝动脉造影
E. MRI
25. 男性, 32 岁, 阑尾切除术后 1 天出现烦躁、剧烈腹痛, 心率 108 次/分, 血压 90/60mmHg, 腹胀, 全腹压痛, 肠鸣音弱, 为除外腹腔内出血首要的检查是
A. B 超 B. CT
C. MRI D. 直肠指诊
E. 腹腔穿刺
26. 男, 25 岁, 腹部被倒墙压伤, 中腹部剧痛伴呕吐 3 小时。查体: BP120/86mmHg, T38℃, 腹胀, 腹部肌紧张, 腹部压痛、反跳痛阳性, 肠鸣音消失。最可能的诊断是
A. 腹壁挫伤 B. 腹膜后血肿
C. 肝破裂 I 度 D. 小肠破裂
E. 右肾挫伤
27. 女, 30 岁。被汽车撞伤左季肋部 1 小时来诊。查体: T37.5℃, 心率 110 次/分, BP90/70mmHg。腹平坦, 左上腹肌略紧张, 局部压痛, 全腹有反跳痛, 有移动性浊音(+), 听诊未闻肠鸣音。确诊检查是
A. 平卧位 X 线腹部平片
B. 胸部 X 线检查
C. 腹部 CT
D. 上消化道钡餐透视
E. 诊断性腹腔穿刺
28. 男, 74 岁, 左腹股沟可复性包块 10 年, 不能回纳 8 小时, 以左腹股沟斜疝嵌顿急诊手术, 术中见部分嵌顿小肠肠管色暗, 无蠕动, 行部分肠切除, 此时不宜行疝修补术的理由是
A. 术前准备不充分

做题随手记

- B. 术后易出现腹胀
C. 患者年龄大, 伤口愈合能力低
D. 术后易继发手术野感染
E. 术后易发生上呼吸道感染
29. 男, 70岁。右腹股沟区肿块3年, 平卧消失。查体: 右耻骨结节外上方有一半球形肿块, 未进入阴囊, 可用手回纳, 压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是
- A. 股疝 B. 腹股沟斜疝
C. 腹股沟直疝 D. 精索鞘膜积液
E. 交通性鞘膜积液
30. 女, 37岁, 腹胀、腹泻与便秘交替半年。体检: 腹壁柔韧感, 轻度压痛, 肝脾未触及, 腹水征(+). 腹水检验: 草黄色, 比重1.020, 蛋白35g/L。白细胞 $0.7 \times 10^9/L$, 中性0.30, 淋巴0.70, 红细胞 $0.3 \times 10^9/L$, 本例最可能诊断是
- A. 结核性腹膜炎 B. 原发性腹膜炎
C. 癌性腹膜炎 D. 巨大卵巢囊肿
E. 肝静脉阻塞综合征
31. 男, 20岁, 低热、腹痛、腹泻伴腹胀3个月。查体: 腹壁揉面感, 腹部移动性浊音阳性。腹水为草黄色渗出液。为明确诊断, 下列哪项检查最有价值
- A. 血培养
B. 结核菌素试验
C. 腹腔镜检查并活检
D. B超
E. 血沉
32. 腹膜炎病人, 经扩容治疗后血压80/60mmHg, 中心静脉压5cmH₂O, 尿量20ml/h, 应考虑
- A. 急性肾功能衰竭 B. 感染性休克
C. 低血容量性休克 D. 急性心力衰竭
E. 感染未控制
33. 男, 35岁, 诊断为肝炎后肝硬化失代偿期, 一周来出现轻微腹痛, 腹水增多。查体: T38.5℃, 腹水常规, 黄色, 比重为1.016, 蛋白25g/L, 白细胞 $500 \times 10^6/L$, 中性粒细胞0.85, 最可能的并发症是
- A. 原发性肝癌 B. 脾栓塞
C. 自发性腹膜炎 D. 门静脉血栓形成
E. 结核性腹膜炎
34. 男性, 48岁。上腹不规则隐痛2个月, 1小时前呕血1000ml。冠心病史10年。近期有心绞痛发作。不宜应用的药物是
- A. 血管加压素 B. 生长抑素
C. 埃索美拉唑 D. 奥美拉唑
E. 法莫替丁
35. 男性, 60岁, 患有直肠肛管周围脓肿, 做直肠肛管周围脓肿切开引流术后, 最有可能出现
- A. 痔 B. 大便失禁
C. 肛瘘 D. 肛门狭窄
E. 肛裂
36. 男性, 32岁, 患有急性阑尾炎并发阑尾周围脓肿, 下列说法不正确的是
- A. 必须手术治疗 B. 给予抗生素
C. 让患者充分休息 D. 补充水分及电解质
E. 可切开引流
37. 男性, 16岁, 体育课后由于右下腹转移性疼痛伴有发热来诊, 该患者最可能的是
- A. 急性胆囊炎 B. 急性胃炎
C. 急性阑尾炎 D. 急性腹膜炎
E. 急性胰腺炎
38. 男, 27岁。腹痛伴恶心6天。6小时前脐周疼痛伴呕吐, 继而右下腹疼痛逐渐加剧。查体: 右下腹部可触及一直径约5cm肿块, 界不清, 明显触痛, 最可能的诊断是
- A. 结肠癌 B. 克罗恩病
C. 阑尾周围脓肿 D. 溃疡性结肠炎
E. 直肠癌
39. 女性, 58岁。近半年来反复出现腹泻伴低热, 日约3~4次, 便呈糊状, 无脓血, 腹泻与便秘相交替。查体: 腹软, 右下腹轻压痛。辅助检查: 结肠镜可见回盲部黏膜充血、水肿, 溃疡形成, 炎性息肉, 肠腔变窄。最可能的诊断是
- A. 结肠癌 B. 克罗恩病
C. 溃疡性结肠炎 D. 肠结核

做题随手记

- E. 血吸虫性肉芽肿
40. 女, 38岁, 肠易激综合征患者, 常有腹痛, 当患者腹痛时下列药物宜采用的是
- A. 洛哌丁胺 B. 地芬诺酯
C. 聚乙二醇 D. 头孢噻酮
E. 匹维溴铵
41. 男, 42岁, 间断腹痛、腹泻8个月, 无消瘦、乏力、盗汗, 诊断为肠易激综合征, 下列药物其不宜采用的是
- A. 洛哌丁胺 B. 地芬诺酯
C. 聚乙二醇 D. 头孢噻酮
E. 匹维溴铵
42. 26岁女性。1年前因腹泻, 右下腹包块行手术治疗。近期再次出现腹泻, 排黏液便, 无脓血, 钡灌肠检查可见肠痿。为明确诊断首选的化验、检查是
- A. 血常规 B. 血沉
C. 粪便潜血试验 D. 结肠镜检查
E. 胃镜检查
43. 男性, 60岁。进行性黄疸4个月, 伴中上腹持续性胀感, 夜间平卧时加重, 消瘦显著。查体: 慢性消耗性面容, 皮肤、巩膜黄染。腹平坦, 脐左上方深压痛, 未及肿块。Courvoisier征阳性。首先考虑的诊断是
- A. 慢性胆囊炎 B. 结肠癌
C. 胰头癌 D. 胃癌
E. 原发性肝癌
44. 男性, 60岁, 上腹部不适的进行性黄疸、食欲不振, 当其合并肿大而无触痛的胆囊时, 下列诊断最可能的是
- A. 胆总管下段结石
B. 中下段胆管癌
C. 胆囊颈部结石嵌顿
D. 肝癌
E. 急性梗阻性化脓性胆管炎
45. 女, 45岁, 反复腹痛、发热、黄疸1年, 近3天上述症状加重, 精神差, 高热黄疸不退; 入院 T40℃, P120次/分, BP70/50mmHg, 该患者首选的治疗为
- A. 大剂量抗生素治疗感染后择期手术
B. 全胃肠外营养后手术
C. 立即手术
D. 积极抗休克同时及早手术
E. 应用血管收缩剂, 血压升至正常后及早手术
46. 女性40岁, 有胆囊结石病史。4小时前, 无诱因突发上腹剧痛向腰背部放射伴恶心, 呕吐。查体: 体温 37.5℃, 巩膜无黄染, 上腹部压痛; 反跳痛, 以中腹偏左为重, 血淀粉酶 1024U/dL, 尿胆红素(++)。B超显示: 胆囊 3cm×7cm 大小, 多发强回声伴声影, 0.5~0.8cm 大小, 胆总管直径 0.9cm, 胰腺增大, 胰周渗出。入院后非手术治疗3日, 腹痛缓解。复查B超示: 胆总管直径 0.5cm, 尿胆红素(-), 尿淀粉酶 64U/dL 最可能的原因是
- A. 胰腺结石 B. 结石在胆囊颈嵌顿
C. 十二指肠憩室炎 D. 急性胆囊炎
E. 结石一过性通过胆总管下段
47. 女性, 40岁, 右上腹部不适, B超提示: 胆囊结石, 对其行胆囊切除手术, 下列不是胆总管探查指征的是
- A. 胆总管有扩张
B. 胆囊水肿
C. 曾有梗阻性黄疸史
D. 术中胆管造影示胆管结石
E. 胆总管触到结石
48. 男, 55岁, 肥胖, 高脂餐后发作右上腹部阵发性绞痛, 每次发作持续1~2小时, 疼痛向右肩背部放射, 伴有饱胀感。首选的检查方法是
- A. B超 B. CT
C. MRI D. 上消化道钡餐
E. 口服胆囊造影
49. 男性, 48岁。乙型肝炎病史16年。近2个月肝区胀痛不适。CT检查: 肝右叶 6cm 占位性病变。为进一步明确性质应首选检测
- A. CA19-9 B. CEA
C. 癌胚抗原 D. CA15-3
E. AFP

做题随手记

50. 男, 44 岁。3 天前体检时 B 超发现右肝内一肿物, 直径 3cm。血 AFP800mmol/L。其最有效的处理方法是
- 经股动脉插管化疗
 - 经皮肿瘤穿刺注无水酒精
 - 行肝段切除术
 - 放射治疗
 - 全身化疗
51. 男性, 65 岁, 以长期发热、右上腹或右下胸痛、全身消耗及肝脏肿大压痛、血白细胞增多。诊断为阿米巴性肝脓肿, 下列治疗中错误的是
- 氯喹
 - 全身支持治疗
 - 甲硝唑
 - 青霉素
 - 手术治疗
52. 男性, 40 岁, 血吸虫性肝硬化伴严重脾肿大及血小板减少, 有上消化道出血史, 胃镜示食管静脉重度曲张。该患者的最佳治疗方法是
- 选择性门-体静脉分流术
 - 脾-腔静脉分流术
 - 肠-腔静脉分流术
 - 脾切除加贲门周围血管离断术
 - 肝移植
53. 男性, 60 岁, 肝硬化失代偿期, 进行血生化检查不可能出现的是
- A/G 倒置
 - 凝血酶原时间延长
 - 胆红素降低
 - 转氨酶升高
 - 尿素氮、肌酐升高
54. 男性, 52 岁。既往慢性胃炎病史 20 余年, 近日检测幽门螺杆菌阳性, 胃镜检查提示明显胆汁反流。最佳治疗方案应选择
- 阿莫西林
 - 铝碳酸镁
 - 伊托必利+幽门螺杆菌根治
 - 瑞巴派特
 - 奥美拉唑+阿莫西林
55. 男性, 50 岁, 因腹痛、消瘦来诊, 行胃镜检查示胃溃疡。关于患者腹痛以下说法错误的是
- 为压榨性疼痛
 - 位于上腹部正中
 - 服用抑酸药可以缓解
 - 劳累、烟酒可以诱发
 - 疼痛多于餐后约 1 小时发生, 经 1~2 小时缓解
56. 男, 25 岁, 反复上腹痛、进食后缓解、反酸 5 年。X 线钡餐检查示十二指肠球部龛影, 周围黏膜呈放射状向龛影纠集, 龛影壁光滑。可诊断为
- 幽门管溃疡
 - 十二指肠球部溃疡
 - 十二指肠球后溃疡
 - 十二指肠炎
 - 胃黏膜脱垂
57. 男性, 28 岁。间断性上腹痛 5 年, 近日腹痛加重, 伴有腹胀及呕吐, 呕吐物量多, 为隔夜食物。抑酸剂治疗无效。体检上腹部有振水音, 转动体位症状不能缓解。该患者最可能的诊断是
- 食管癌
 - 消化性溃疡合并幽门梗阻
 - 慢性胃炎
 - 胃癌
 - 胃溃疡
58. 女性, 32 岁, 阵发性上腹痛 2 年, 夜间加重, 疼痛有季节性, 冬季明显, 有反酸, 为进一步确诊, 首选的检查方法是
- X 线钡餐检查
 - CT 检查
 - 胃液细胞学检查
 - 胃液分析
 - B 超
59. 男, 52 岁。上腹部疼痛反复发作 5 年, 近 7 天出现腹胀, 呕吐。经 X 线钡餐检查诊断十二指肠溃疡伴幽门梗阻。最适宜的手术方式是
- 毕 I 式胃大部切除术
 - 毕 II 式胃大部切除术
 - 胃空肠吻合术
 - 迷走神经干切断术
 - 选择性胃迷走神经切断术

做题随手记

60. 患者男, 40岁。便秘1年, 近半月来大便时肛门疼痛, 疼痛呈周期性, 粪便表面及便纸上附有鲜血, 其诊断最可能是
- A. 内痔 B. 外痔
C. 直肠癌 D. 肛裂
E. 肛瘘
61. 男, 58岁。进餐后突发性上腹刀割样剧痛2小时。全腹压痛, 板状腹, 肝浊音界及肠鸣音消失。X线显示膈下新月形游离气体。既往有胃溃疡史25年。下列治疗中, 最佳的手术方式是
- A. 胃大部切除术
B. 大网膜覆盖、穿孔缝合术
C. 迷走神经切断加胃窦切除术
D. 高选择性迷走神经切断术
E. 缝合穿孔后行迷走神经切断加胃空肠吻合术
62. 患者男, 62岁。慢性上腹痛、腹胀20余年, 腹痛无规律, 10年前胃镜检查为慢性萎缩性胃炎。2个月来上腹痛加重, 早饱, 偶有呕吐, 体重下降7kg。查体: 贫血貌, 最可能的诊断是
- A. 肝癌
B. 胆囊癌
C. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
D. 胃癌
E. 功能性消化不良
63. 男性, 70岁。胃癌根治术后当天输血2000ml, 病人出现呼吸困难, 咳大量血性泡沫痰, 查体: 两肺可闻及湿性啰音。应立即
- A. 坐位、吸氧、利尿
B. 抗感染治疗
C. 大剂量应用地塞米松
D. 输入血浆或5%白蛋白
E. 输入碳酸氢钠使尿液碱化
64. 男, 60岁, 脑出血昏迷而住院治疗, 入院后2天突然呕吐咖啡色液体约600ml作用, 并排黑便3次。患者消化道出血的原因是
- A. 十二指肠球部溃疡
B. 胃癌
C. 食管静脉曲张
D. 慢性胃炎
E. 急性糜烂性胃炎
65. 男, 27岁, 腹痛伴有呕吐10小时, 起初疼痛在脐周, 继而右下腹疼痛逐渐加重, 既往无腹痛与便血史, 查体: 全腹紧张, 有明显压痛和反跳痛, 麦氏点压痛明显, 肠鸣音减弱, 腹穿抽出脓性液体, 最可能的诊断是
- A. 克罗恩病穿孔 B. 阑尾炎穿孔
C. 肠套叠坏死 D. 肠伤寒穿孔
E. 胃穿孔
66. 男, 43岁。肝炎肝硬化病史15年, 反复少尿、腹胀1年, 1周来腹痛伴低热。腹水常规, 比重1.017, 蛋白28g/L, 细胞总数 $920 \times 10^6/L$, 白细胞 $800 \times 10^6/L$, 多形核细胞0.80。最可能的诊断是
- A. 门静脉血栓形成 B. 结核性腹膜炎
C. 原发性肝癌 D. 自发性腹膜炎
E. 肝肾综合征
67. 男, 42岁。寒战、发热5天, 右季肋部痛2天, 疼痛于深呼吸及咳嗽时加重。查体: 巩膜轻度黄染, 肝肋下2cm, Murphy征阴性, 肝区叩击痛阳性。胸部X线片: 右侧膈肌抬高, 肋脊角消失。肝脏B超: 肝右叶可见6cm \times 5cm低回声区, 边界欠清晰, 中心有液性暗区。首先考虑的诊断是
- A. 肺炎 B. 肝脓肿
C. 肝结核 D. 结核性胸膜炎
E. 肝癌
68. 肝硬化患者, 近1周来发热、腹痛, 腹水明显增加。腹水检查: 淡黄, 比重1.017, 蛋白35g/L, 白细胞 $550 \times 10^6/L$, 中性粒细胞为主。最可能并发
- A. 结核性腹膜炎 B. 原发性肝癌
C. 门静脉血栓形成 D. 自发性腹膜炎
E. 肝肾综合征
69. 女, 31岁, 车祸撞伤右上腹40分钟, 查体: P118次/分, BP70/60mmHg, 痛苦貌, 腹肌紧张, 以右上腹为甚, 有压痛、反跳痛, 右下腹穿刺抽出含胆汁的血液, 术前处理最重

做题随手记

要的环节是

- A. 防治休克 B. 止血
C. 防治感染 D. 止痛
E. 镇静
70. 男性, 60岁, 长期烧心反酸, 胸骨后疼痛, 饮酒后加重, 诊断为胃食管反流病, 关于患者胃食管反流病的一般治疗不正确的是
- A. 避免饱餐及睡前2小时内进食
B. 餐后不要立即卧床
C. 尽量避免使用能降低LES压力的食物和药物
D. 超重者应减轻体重
E. 尽量减少各种运动
71. 女性, 51岁, 间断上腹疼痛2年, 疼痛发作与情绪、饮食有关。查体: 上腹部轻压痛。胃镜: 胃窦皱襞平坦, 黏膜粗糙无光泽, 黏膜下血管透见。此病例考虑诊断为
- A. 消化性溃疡 B. 急性胃炎
C. 慢性浅表性胃炎 D. 胃癌
E. 慢性萎缩性胃炎
72. 男性, 60岁, 肝硬化病史3年, 意识错乱、睡眠障碍, 考虑是并发有肝性脑病, 其脑电图改变最可能为
- A. 节律变快 B. 节律变慢
C. 节律紊乱 D. 无节律
E. 节律骤变
73. 女, 53岁。腹痛、腹胀、低热4周, 表情淡漠、嗜睡1天。腹部B超示: 肝实质弥漫性病变、脾大及腹水。对该患者诊断最有意义的阳性体征是
- A. 肌张力增高 B. Babinski征阳性
C. 扑翼样震颤阳性 D. 腹壁反射消失
E. 腱反射亢进
74. 女性, 66岁。右季肋部胀痛、食欲减退、尿黄4个月。乙肝肝硬化病史6年。查体: 肝肋下4cm、表面不平、质硬、压痛。最可能的诊断是
- A. 肝脓肿 B. 原发性肝癌
C. 继发性肝癌 D. 乙肝活动期
E. 胆囊炎
75. 女, 18岁。低热、腹痛、腹部轻微压痛, 腹泻伴腹胀2个月。有游离腹水, 考虑为结核性腹膜炎, 具有确诊价值的检查为
- A. 血培养 B. 结核菌素试验
C. 腹膜活检 D. 腹水细菌培养
E. 血沉
76. 女性, 30岁。低热, 腹胀3个月, 消瘦, 停经。查体: 全腹膨隆, 未触及肿块, 移动性浊音(+). 腹水检查: 比重1.020, 蛋白37g/L, 白细胞数 $580 \times 10^6/L$, 淋巴细胞0.80, 腹水普通细菌培养阴性。PPD试验成强阳性。最可能的疾病是
- A. 肝炎后肝硬化
B. 结核性腹膜炎
C. 肝癌并腹膜转移
D. 肝硬化并自发性腹膜炎
E. 卵巢癌腹膜转移
77. 男, 30岁, 胃溃疡穿孔行胃大部切术后5天, 出现右上腹钝痛及发热, 最高体温 $38.5^{\circ}C$, 腹部X线透视见右侧膈肌升高, 随呼吸活动受限, 肋膈角模糊, 最可能的诊断是
- A. 胃排空障碍 B. 急性细菌性肝脓肿
C. 吻合口漏 D. 急性胆囊炎
E. 膈下脓肿
78. 男性, 48岁。左上腹部外伤5小时, 急诊留观时出现口渴、烦躁、左上腹疼痛加剧。体温 $38.2^{\circ}C$, 复查血常规提示白细胞计数明显升高, 下一步治疗应选择
- A. 观察 B. 皮下注射吗啡
C. 急诊剖腹探查 D. 腹部CT检查
E. 抗感染治疗后择期手术
79. 女, 54岁, 腹痛、腹胀、乏力3个月。腹痛隐痛阵发性发作。查体: 贫血貌, 浅表淋巴结无肿大, 巩膜无黄染, 腹软, 未见肠型, 右下腹可触及一活动性包块。实验室检查: Hb90g/L, WBC $9.5 \times 10^9/L$, 肝功能正常, CEA $20\mu g/L$ 。粪隐血试验阳性。最可能的诊断是
- A. 回盲部套叠 B. 回盲部结核

做题随手记

- C. 溃疡性结肠炎 D. 回盲部肿瘤
E. 克罗恩病
80. 女, 25 岁。进食生冷饮食后上腹痛, 恶心、剧烈呕吐, 初为胃内容物, 后为少量新鲜血, 引起呕血最可能的原因是
- A. 门静脉高压
B. 十二指肠溃疡合并出血
C. 反流性食管炎合并出血
D. 急性糜烂出血性胃炎
E. 应激性溃疡
81. 男, 50 岁, 上腹痛伴进行性黄疸 1 个月, 感乏力、食欲不振, 症状逐渐加重。查体: 腹部膨隆, 腹软, 未触及包块, 肠鸣音弱, 血 CA19-9 和 CEA 增高, 为诊断和制定手术方案, 最有意义的检查方法是
- A. ERCP B. MRI
C. 上消化道造影 D. 增强 CT
E. 腹部 B 超
82. 男, 52 岁, 乏力、纳差 12 年, 间断丙氨酸氨基转移酶升高。1 个月来尿少, 双下肢水肿, 腹胀逐渐加重, 3 天前腹泻, 黄稀水样便 3 次, 2 天来腹痛、发热, T38.5℃, 该患者最可能的诊断是
- A. 肝硬化并发腹膜炎
B. 胆系感染
C. 结核性腹膜炎
D. 急性细菌性痢疾
E. 肝癌破裂
83. 患者女, 51 岁, 1 小时前因咳嗽突发右下腹疼痛, 右腹股沟出现肿块。查体: 全腹轻压痛, 无腹肌紧张, 肠鸣音亢进。右侧腹股沟韧带下方呈半球形隆起, 不能回纳, 轻压痛, 应采取的正确措施是
- A. 急症手术复位, 行 McVay 法修补术
B. 急症手术复位, 行 Ferguson 法修补术
C. 及时手术复位, 密切观察
D. 密切观察, 病情加重及时手术
E. 应用抗生素、止痛剂观察
84. 男, 60 岁, 寒战伴高热肝区疼痛 15 天, 腹部 CT 提示肝内 2 个脓肿, 最大直径达 6cm, 体温每日高达 39.8℃, 其治疗方法首选
- A. 经皮穿刺置管引流
B. 右半肝切除
C. 脓腔内注入抗生素
D. 全身大剂量应用抗生素
E. 继续支持治疗
85. 患者男性, 50 岁, 胃大部切除术后 3 天出现阵发性腹痛、腹胀, 无肛门排气, 生命体征平稳, 最可能的原因
- A. 吻合口炎
B. 腹腔内血肿形成
C. 肠系膜血管缺血性疾病
D. 肠扭转
E. 手术后肠蠕动功能失调
86. 男, 68 岁, 因胃溃疡出血行毕 I 式胃大部切除术。术后第 6 天, 有肛门排气, 开始进流食, 进食后腹胀并呕吐, 呕吐物含有胆汁。腹部可见胃型, 无蠕动波, X 线平片示残胃内大量胃液潴留。产生此症状最可能的原因是
- A. 远端空肠梗阻 B. 残胃蠕动功能障碍
C. 近端空肠逆流 D. 吻合口水肿
E. 吻合口不全梗阻
87. 女, 31 岁, 腹痛、寒战、高热、黄疸反复发作 3 年。1 天来上腹痛为持续性, 伴阵发性绞痛, 恶心, 无呕吐。查体: T38.6℃, 巩膜黄染, 右上腹压痛(+), 无反跳痛, 胆囊大, Murphy(+), 最佳处理措施是
- A. 胆总管奥狄氏括约肌切开术
B. 胆囊造瘘术
C. 单纯胆囊切除术
D. 胆囊切除+胆总管探查 T 管引流术
E. 胆囊切除术+胆总管十二指肠吻合术
88. 女, 48 岁, 2 天前餐后突然出现右上腹阵发性绞痛, 恶心, 尿色呈浓茶样, 以往有类似发作。查体: 急性病容, 巩膜黄染, 腹部无肌紧张, 右上腹深压痛, 最可能的诊断是
- A. 胆道蛔虫病 B. 胆总管结石
C. 胆总管囊肿 D. 急性胰腺炎
E. 急性胆囊炎
89. 女性, 43 岁, 腹痛 16 小时, 呈持续性, 阵发

做题随手记

- 性加重，伴呕吐，无肛门排气。查体：全腹肌紧张，有压痛及反跳痛。行腹腔穿刺抽出液体呈血性，伴臭味。最可能的诊断是
- A. 绞窄性肠梗阻 B. 胃十二指肠穿孔
C. 急性阑尾炎穿孔 D. 结核性腹膜炎
E. 急性重症胰腺炎
90. 男，32岁，反复发作肛门胀痛伴有畏寒、发热2个月。症状逐渐加重，排尿不适，肛门旁出现局部红肿疼痛，继之破溃流出脓液。确保疗效的关键步骤是
- A. 瘻管切开，形成敞开的创面
B. 抗感染治疗后手术
C. 首先充分扩肛
D. 1:5000高锰酸钾溶液坐浴
E. 明确破溃外口和内口的位置
91. 男，58岁，上腹胀，隐痛2个月，伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体：消瘦，浅表淋巴结无肿大。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱，可见直径3.5cm不规则充盈缺损，胃壁僵直。其最常见的转移途径是
- A. 胃肠道内转移 B. 腹腔镜内种植
C. 直接浸润 D. 血行转移
E. 淋巴转移
92. 男，33岁。急性坏疽性阑尾炎手术后4天，出现尿频、尿急、大便次数增多、里急后重、发热。其最可能的并发症是
- A. 急性肾盂肾炎 B. 盆腔脓肿
C. 肛周脓肿 D. 阑尾残株炎
E. 急性膀胱炎
93. 患者40岁，排便后肛门外剧烈疼痛，并出现一触痛性明显的肿块，最可能的诊断是
- A. 内痔脱出嵌顿 B. 直肠息肉脱出
C. 肛周脓肿 D. 血栓性外痔
E. 肛裂并前哨痔
94. 女，60岁。上腹胀痛伴恶心。呕吐2天，右下腹痛阵发加剧、腹胀半天。查体：T38.3℃，P120次/分，BP150/90mmHg，全腹压痛(+)，右下腹明显，有肌紧张，肝浊音界存在，未闻及肠鸣音。实验室检查：WBC13.0×10⁹/L，N0.88。右下腹穿刺抽出黄色混浊液体2ml，镜检脓细胞(++)。最可能的诊断是
- A. 重症急性胰腺炎
B. 绞窄性肠梗阻
C. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
D. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
E. 伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎
95. 一男性食管癌患者，既往无慢性咳嗽史，放疗中出现咳嗽，喝水呛咳，有发热，应警惕
- A. 放疗气管反映
B. 肺部感染
C. 纵隔穿孔脓肿
D. 气管食管瘘伴肺部感染
E. 放射性肺炎
96. 男，18岁。练双杠时撞击上腹部，突发腹痛4小时。疼痛加重，伴背部疼痛、恶心、呕吐，呕吐物中有胃液和胆汁。既往有胆囊炎病史。腹部X线平片检查：横结肠肝曲胀气，腹膜后有气体征象。粪隐血(-)。最可能的诊断是
- A. 右肾破裂 B. 肝破裂
C. 胆囊破裂 D. 十二指肠破裂
E. 结肠破裂
97. 女，52岁，肥胖。右腹股沟韧带下方卵圆窝处可见3cm×3cm半球状突起，局部有胀痛感。平卧时突起可变小、变软，但有时不完全消失。查体：卵圆窝处咳嗽冲击感不明显。最常用的手术方式是
- A. McVay法 B. Halsted法
C. Bassini法 D. Ferguson法
E. Shouldice法
98. 男，32岁。反复脓血便伴里急后重1年，抗生素治疗无效。下消化道X线钡剂造影检查发现直肠、乙状结肠多发龛影，黏膜粗乱及颗粒样改变。最可能的诊断是
- A. 克罗恩病 B. 溃疡性结肠炎
C. 肠结核 D. 细菌性痢疾
E. 结肠癌
99. 男性，52岁，右下腹痛已半年，近半个月出现黄疸，体重下降，食欲减退。既往患胆囊

做题随手记

结石已经5年。查体：巩膜及全身皮肤黄染，右上腹扪及6cm×6cm肿块，无移动性，B超显示胆囊部位有一实质性占位病变，并可见强光团及声影。此病人最可能的诊断是

- A. 胆囊息肉
B. 高位胆管癌
C. 胆囊癌并胆囊结石
D. 充满型胆囊结石
E. 幽门管癌并肝十二指肠韧带淋巴结转移
100. 男，44岁。肝区疼痛2个月。呈持续性钝痛，放射至右肩背部，消瘦、乏力。查体：巩膜无黄染，肝肋下3cm，质地稍硬，有结节感。AFP800μg/L，B超示肝右叶8cm×6cm占位病变，向外生长，周边血流量增强；门静脉正常，最理想的治疗方法是
- A. 肿瘤切除加放疗 B. 姑息性肝切除术
C. 根治性肝切除术 D. 肝动脉化疗栓塞
E. 局部射频治疗
101. 女性，40岁，因十二指肠溃疡大出血而行手术，术中发现十二指肠溃疡，位置很低，且穿透入胰腺，应采用术式
- A. 毕Ⅱ式胃大部切除术
B. 迷走神经切断加幽门成形术
C. 旷置溃疡的胃大部切除术
D. 结扎十二指肠周围血管，旷置溃疡的胃大部切除术
E. 缝扎出血点，结扎胃十二指肠及胰十二指肠动脉，旷置溃疡的胃大部切除术
102. 女性，60岁，腹痛、呕吐及肛门停止排气排便3天，查体：腹胀可见腹型，全腹有压痛、反跳痛，腹部X线：有孤立、胀大的肠袢，应选何种治疗
- A. 胃肠减压
B. 抗生素治疗
C. 积极进行中药治疗
D. 择期手术
E. 急诊剖腹探查
103. 女，50岁，3个月前被自行车把撞伤上腹部，近3周来上腹隆起，进食后上腹胀满伴恶心、呕吐。查体：上腹部扪及18cm×13cm囊性肿

块，钡餐透视见横结肠下移。最可能的诊断是

- A. 胰腺囊腺瘤 B. 腹膜后血肿
C. 假性胰腺囊肿 D. 肠系膜囊肿
E. 脾包膜下血肿
104. 女性，32岁，1个月腹胀，腹痛，高热。查体：腹饱满，全腹轻压痛，移动性浊音(+)，为明确诊断立即检查
- A. 血肝功
B. 腹腔积液常规
C. 腹腔积液细菌培养
D. 血沉
E. 血常规
105. 女性，20岁，转移性右下腹痛30小时，伴呕吐发热，体温38.5℃，下腹部有压痛，右侧为重，并有反跳痛，肌紧张，腹腔穿刺液应为
- A. 黄色透明液体 B. 带臭味脓性液
C. 黄色浑浊无臭味 D. 浅红色水样液体
E. 暗红色血样液
106. 女性，50岁，既往无胃病史，近半年来，出现上腹痛，食欲减退，体重下降，一般状况较好，内镜发现胃角溃疡，约1.0cm×0.8cm，病理诊断为早期胃癌，首选的治疗方法是
- A. 内镜下切除 B. 手术治疗
C. 介入动脉化疗 D. 内镜下局部化疗
E. 免疫治疗
107. 男，32岁。因十二指肠溃疡行BillrothⅡ式胃大部切除术后6个月。术后出现反酸、烧心症状。应用抑酸剂治疗无效。上述症状逐渐加重，并呕吐胆汁样物，上腹部及胸骨后烧灼样疼痛，体重减轻。查体：贫血貌，消瘦，营养不良，巩膜无黄染。胃液中无游离酸。胃镜检查见黏膜充血、水肿、糜烂。最适当的治疗措施是
- A. 采用少食多餐方式
B. 行Roux-en-Y胃空肠吻合术
C. 长期应用消胆胺治疗
D. 注意餐后勿平卧

做题随手记

- E. 应用 H_2 受体拮抗剂
108. 女性, 26岁, 3个月来全腹胀, 右上腹触及不易推动、边缘不整肿块, 有压痛, 近1个月低热, 盗汗, 最大可能是
- A. 胆囊肿大, 伴炎症
B. 肝结核
C. 结核性腹膜炎
D. 肾结核
E. 肾囊肿
109. 男性, 42岁, 餐后出现突发中上腹剧烈疼痛, 疼痛为持续性进行性加重, 呈束带状, 持续性, 至急诊。需做鉴别诊断检查是
- A. 血淀粉酶
B. 立位腹部平片
C. B超
D. 心电图
E. 以上都是
110. 女, 40岁, 大便次数增多, 带血2个月, 伴便意频繁, 大便变形, 变细, 大便隐血(+ +), 直肠指诊: 距肛门8cm触到一肿物约3cm×3cm大小, 尚可活动, 指套上有血迹, 病理诊断直肠腺癌, 对其最主要的治疗方法为
- A. 放疗
B. 化疗
C. 根治性手术
D. 中药治疗
E. 激光烧灼
111. 女, 35岁。腹胀、便秘、乏力6个月。1周来症状加重伴呕吐。查体: $T37.6^{\circ}\text{C}$, 右腹可触及5cm×3cm大小包块, 质中等, 边界不清, 轻触痛。胸片示右侧胸膜肥厚, 右上肺钙化灶。首先考虑的临床诊断是
- A. 右侧卵巢肿物
B. 肠结核
C. 结肠癌
D. 克罗恩病
E. 阑尾周围脓肿
112. 男, 54岁。呕血、黑便2天, 嗜睡、行为改变1天。实验室检查: $ALT35\text{U/L}$, $AST72\text{U/L}$, $ALB27.3\text{g/L}$ 。腹部B超示脾大。最可能的诊断是
- A. 胃癌
B. 肝硬化失代偿期
C. 急性胃黏膜病变
D. 消化性溃疡
E. 食管贲门黏膜撕裂综合征
113. 患者男性, 43岁。间断上腹部胀满感5年, 进食后明显, 伴有上腹部疼痛和反酸。胃镜检查提示胃窦部黏膜红白相间, 黏膜胆汁黄染, 黏液池内有胆汁混合, 幽门呈开放状态, 可见胆汁反流, 治疗药物最适宜使用
- A. 斯达舒
B. 山莨菪碱
C. 庆大霉素
D. 吗丁啉+法莫替丁
E. 甲氰咪胍
114. 男性, 59岁。散步时突然自觉腹部不适、恶心、头晕、出虚汗、心率加快、心慌, 急诊。查体: 心率106次/分, 血压90/60mmHg, 心律齐, 面色苍白, 腹部广泛压痛, 尤以右侧腹明显, 轻度肌紧张, 既往有肝炎后肝硬化史。化验 $AFP800\mu\text{g/L}$ 。最可能的诊断是
- A. 肝癌破裂
B. 脾破裂
C. 溃疡病穿孔
D. 急性坏死性胰腺炎
E. 肝炎发作
115. 男, 32岁, 上腹部被挤压2小时, 上腹部疼痛、恶心、腹胀, 为排除胰腺损伤, 最有价值的检查为
- A. 腹腔动脉造影
B. 诊断性腹腔灌洗术
C. B超
D. 腹部X线片
E. 血尿淀粉酶
116. 男, 35岁, 3周前上腹部被自行车把撞伤。近5天来上腹持续性胀痛, 餐后加重, 伴恶心、呕吐; 查体: 体温 38.5°C , 上腹偏左明显膨隆, 可扪及边界不清的痛性肿块, 不活动。首选的检查应当是
- A. X线胸腹部透视
B. 胃肠道钡餐透视
C. 纤维十二指肠镜检查
D. 腹部B超检查
E. 腹腔动脉造影
117. 男, 30岁, 由5m高处跌下2小时, 腹痛, 腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音弱; $BP104/70\text{mmHg}$, $P120$ 次/分, $Hb80\text{g/L}$; X线检查: 右侧第9、10肋骨骨折, 右侧膈肌

做题随手记

- 升高。最可能的诊断是
- A. 肝破裂 B. 胃破裂
C. 脾破裂 D. 横结肠破裂
E. 胰腺破裂
118. 男性，68岁。12小时前因咳嗽而突然右下腹剧烈疼痛，右侧阴囊肿胀亦疼痛。右侧腹股沟区呈梨形隆起，不能回纳。行急诊手术治疗，术中发现嵌顿的肠管已坏死，应采取的手术方法是坏死肠段切除和
- A. 疝囊高位结扎术
B. 无张力疝修补术
C. Bassini 修补术
D. Halsted 修补术
E. Ferguson 修补术
119. 男性，30岁，剧咳后出现腹股沟区一突出的肿块，完全回纳后，用手指紧压腹股沟管深环，让病人起立并咳嗽，斜疝疝块并不出现。该患者最可能的诊断为
- A. 易复性斜疝 B. 嵌顿疝
C. 绞窄性疝 D. 难复性疝
E. 急性腹膜炎
120. 男性，60岁。腹股沟三角突出半球形包块，易还纳，未进入阴囊，不透光，主要考虑为
- A. 鞘膜积液 B. 阴囊积液
C. 股疝 D. 直疝
E. 斜疝
121. 女性，31岁，低热，乏力伴腹胀3个月，查体：腹部膨隆，腹壁柔韧感，有压痛和轻度反跳痛，移动性浊音阳性，腹水为渗出液，为明确诊断，最有价值的检查是
- A. 腹部B超
B. 胃肠道钡剂检查
C. 血沉
D. 腹水细菌培养
E. 腹腔镜检查
122. 女，23岁，因低热，腹痛诊断为结核性腹膜炎。近日来呕吐，腹胀，未解大便。最可能的并发症是
- A. 肠梗阻 B. 肠穿孔
C. 中毒性肠麻痹 D. 肠出血
E. 肠坏死
123. 女性，34岁，溃疡病穿孔行修补术后10天，体温39℃，下腹痛明显，拒按；黏液便4~6次/天，伴有里急后重及尿痛、排尿困难，直肠指诊前壁有肿物。此病人应考虑是
- A. 急性附件炎 B. 急性子宫内膜炎
C. 急性膀胱炎 D. 盆腔脓肿
E. 直肠癌
124. 男，41岁，肝炎后肝硬化病史5年，出现腹水1年，1周来低热伴轻度腹痛，腹水明显增多。腹水检查：淡黄色，比重1.017，蛋白26g/L，白细胞数 $500 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞0.80。最可能的诊断是肝硬化合并
- A. 结核性腹膜炎 B. 自发性腹膜炎
C. 原发性肝癌 D. 门静脉血栓形成
E. 肝肾综合征
125. 男性，60岁，今晨突然大量鲜红色血便，既往乙肝病史。为了明确是上消化道出血还是下消化道出血首选
- A. CT B. B超
C. MRI D. 胃镜
E. PET
126. 男，65岁，上腹部无规律性隐痛2个月，因饮酒后呕咖啡样物150ml，柏油便300ml来诊，无肝病史。查体：血压90/60mmHg，脉搏100次/分，血红蛋白90g/L，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未触及，其止血措施最好选择
- A. 维生素K₁静脉滴注
B. 奥美拉唑静脉注射
C. 氨基己酸静脉滴注
D. 三腔二囊管压迫
E. 垂体后叶素静脉滴注
127. 女，50岁，因便血2月来诊；直肠镜检查发现距肛缘4cm直肠前壁有2cm×2cm肿块，取活检病理检查为直肠乳头状腺癌，最佳的手术方式是
- A. 经肛局部切除术
B. 骶后径路局部切除术
C. 经腹会阴联合直肠癌根治术

做题随手记

- D. 经腹直肠癌切除、骶前吻合术
E. 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术
128. 女性, 60岁, 近3个月出现便意频繁, 排便不尽感, 偶有便中带血。直肠指检触及包块。该患者最可能的诊断是
A. 肛裂
B. 肛瘘
C. 直肠肛管周围脓肿
D. 直肠癌
E. 痔
129. 女, 30岁, 肛门周围胀痛, 伴畏寒、发热3天。检查: 肛门周围皮肤发红, 压痛明显。最可能的诊断是
A. 肛门旁皮下脓肿
B. 肛瘘炎
C. 混合痔
D. 内痔
E. 肛瘘
130. 女, 25岁, 妊娠5个月, 因转移性右下腹痛2小时就诊。诊断为急性阑尾炎。不宜采用的治疗措施是
A. 行阑尾切除术
B. 围手术期加用黄体酮
C. 手术切口应偏低
D. 尽量不用腹腔引流
E. 可应用广谱抗生素
131. 男, 34岁。阑尾切除术后1天出现烦躁、剧烈腹痛。P112次/分, BP90/60mmHg, 腹胀, 全腹压痛, 肠鸣音弱, 为除外腹腔内出血首要的检查是
A. B超
B. CT
C. MRI
D. 腹腔穿刺
E. 立位腹平片
132. 女, 54岁, 诊断为急性坏疽性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎入院, 行阑尾切除术。术后第5天腹胀、腹痛、发热, 体温39℃, 大便4~6次/日, 呈水样。肛门有下坠感, 腹部有轻压痛, 未触及肿块。首先应考虑的是
A. 急性肠炎
B. 阑尾残株炎
C. 门静脉炎
D. 肠间隙脓肿
E. 盆腔脓肿
133. 男, 56岁。低热, 右侧腹部疼痛不适半年, 查体: 贫血貌, 右侧中腹部可扪及5cm×3cm质硬肿块, 可推动, 压痛不明显。首选的检查方法是
A. 胃镜
B. 全消化道钡餐造影
C. 结肠镜
D. 静脉肾盂造影
E. 腹部CT
134. 患者男, 25岁, 2天前无明显诱因出现腹痛, 伴有恶心呕吐, 肠鸣音亢进, 排便排气停止, 患者来院就诊, 应首先考虑为
A. 急性胰腺炎
B. 急性肠梗阻
C. 急性胆囊炎
D. 急性阑尾炎
E. 胃溃疡
135. 患者, 男, 因肠梗阻入院治疗, 治疗期间, 出现下述哪项需紧急手术
A. 腹膜刺激征
B. 脉搏增快
C. 腹胀较前明显
D. 肠鸣音较前减弱
E. 腹痛加重

三

A3/A4型题

1. 男, 65岁。大量呕血、黑便1天。既往有胃溃疡病史20年, 曾有多次出血史。查体: P126次/分, BP86/50mmHg, 神情紧张, 烦躁, 手足湿冷, 无力, 上腹部压痛(+), 肠鸣音亢进。血常规: Hb90g/L, 血细胞比容0.30。心电图示窦性心动过速。
1) 对该患者目前首选的重要治疗措施是
A. 输注浓缩红细胞
B. 立即静注止血药物
C. 立即静滴垂体后叶素
D. 冰盐水200ml+去甲肾上腺素8mg胃内灌注
E. 快速静滴平衡盐溶液
2) 经急诊胃镜发现胃角切迹大溃疡, 活动出血明显, 决定行胃大部切除术, 为达到治疗效果, 至少应切除胃的
A. 30%左右
B. 50%左右

做题随手记

- C. 80%左右 D. 40%左右
E. 60%左右
2. 男性, 28岁, 上腹部饭后疼痛1年, 6小时前出现持续性腹痛, 伴有恶心、呕吐, 体温最高38.4℃。查体: 心率98次/分, R30次/分, BP100/60mmHg, 腹部膨隆, 腹肌紧张, 腹部压痛和反跳痛(+)。腹部B超可见腹腔内液体。腹腔穿刺抽出脓性液体。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 急性化脓性腹膜炎
B. 急性胰腺炎
C. 肠梗阻
D. 急性肝炎
E. 克罗恩病
- 2) 下列治疗该患者不宜采用的是
- A. 禁食
B. 胃肠减压
C. 纠正水、电解质紊乱
D. 抗生素治疗
E. 垂体后叶素
3. 男, 45岁。右下腹隐痛4个月, 近2个月来乏力、消瘦, 常有低热, 查体: 结膜苍白, 右侧腹部5cm×3cm肿块。化验: Hb95g/L。
- 1) 为明确诊断, 最有意义的检查方法是
- A. 直肠指检 B. 腹部CT
C. X线钡剂灌肠 D. 纤维结肠镜
E. X线气钡双重对比造影
- 2) 若检查诊断为升结肠癌, 最佳手术方式是
- A. 升结肠造瘘术
B. 右半结肠切除术
C. 全结肠切除术
D. 升结肠及部分横结肠切除术
E. 升结肠及末段回肠切除术
4. 男, 45岁。急性胰腺炎, 静脉应用广谱抗生素非手术治疗1周后, 腹痛、腹胀加重, 体温再度升高。
- 1) 此时应紧急选择最有诊断意义的检查是
- A. 血白细胞计数+分类
B. 腹部平片了解有无肠麻痹
C. CT检查注意是否发生胰腺坏死
D. 肠镜检查有无肠梗阻
E. 检查血脂肪酶了解胰腺炎病情变化
- 2) 若腹腔穿刺涂片查出大肠杆菌, 患者症状加重, 应选择的治疗措施是
- A. 加用甲硝唑静脉点滴
B. 甲硝唑和广谱抗生素腹腔灌洗
C. 急诊手术加充分引流
D. 经皮穿刺引流
E. 西药静脉点滴+中药胃管内滴注
5. 男, 47岁。上腹疼痛7小时。伴发热, T37.8℃, 频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张, 压痛, 无移动性浊音。血WBC $17 \times 10^9/L$, X线检查: 膈下未见游离气体。
- 1) 治疗的基本措施是
- A. 急诊手术 B. 禁食和胃肠减压
C. 腹腔穿刺引流 D. 腹腔镜切除胆囊
E. 应用大量广谱抗生素
- 2) 最可能的诊断是
- A. 急性心肌梗死 B. 急性胰腺炎
C. 胆石症 D. 胃溃疡穿孔
E. 肠梗阻
- 3) 为明确诊断, 急需检查的项目是
- A. 血淀粉酶 B. 血常规
C. 血清脂肪酶 D. 尿淀粉酶
E. 尿常规
- 4) 如果患者治疗期间出现上腹部包块, 首先考虑的诊断是
- A. 腹膜转移癌 B. 粘连肠梗阻
C. 胰腺假性囊肿 D. 胰腺癌
E. 结肠癌
6. 男性, 35岁, 右腹股沟肿块10年, 站立时明显, 平卧后消失, 有时可降入阴囊, 可还纳。查: 右腹股沟肿块, 手拳大小还纳腹腔, 外环容3指, 压迫内环后肿块不再出现
- 1) 该患者最可能的诊断为
- A. 精索鞘膜积液 B. 股疝
C. 腹股沟直疝 D. 腹股沟斜疝
E. 先天性鞘膜积液
- 2) 该患者最佳手术方式为
- A. 疝囊高位结扎 B. 紧缩内环

做题随手记

- C. 疝前壁修补术 D. 疝后壁修补术
E. 疝囊高位结扎+疝后壁修补术
- 3) 如上述病人, 行 Halsted 修补术, 精索的位置是
- A. 腹外斜肌腱膜下, 腹内斜肌外侧
B. 腹内斜肌下, 腹横肌外
C. 皮下, 腹外斜肌腱膜之间
D. 腹内斜肌内侧, 腹膜外
E. 没有改变精索位置
7. 女, 38 岁。呕吐、腹泻 2 天, 烦躁不安半天急诊入院。查体: BP110/80mmHg, 神志恍惚, 巩膜中度黄染, 颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常, 腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下 3cm。双上肢散在出血点, Hb95g/L, WBC 2.2×10^9 /L, 血糖 7.0mmol/L, 尿糖(+), 尿酮(-), 尿镜检(-)。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 肝性脑病
B. 糖尿病酮症酸中毒
C. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
D. 尿毒症
E. 脑血管病
- 2) 对确诊最有价值的辅助检查是
- A. 血气分析 B. 腹部 CT
C. 肾功能 D. 肝功能
E. 血氨
- 3) 对此患者的治疗, 下列各项中不正确的是
- A. 禁食蛋白质 B. 口服乳果糖
C. 静滴精氨酸 D. 肥皂水灌肠
E. 补充支链氨基酸
8. 男, 49 岁。反复不规律上腹部胀痛、胀满、嗝气, 食欲不振, 消瘦、贫血等, 无特异性。胃镜诊断为萎缩性胃炎。
- 1) 下列哪种情况可判断该患者存在活动性胃炎
- A. 胃黏膜肠上皮化生
B. 胃黏膜出血
C. 胃黏膜内中性粒细胞增多
D. 胃黏膜中增多的主要是淋巴细胞
E. 胃黏膜纤维组织增生
- 2) 该患者如考虑为 A 型胃炎, 正确的是
- A. 壁细胞抗体阴性
B. 胃酸升高
C. 不出现厌食, 体重下降
D. 不出现恶性贫血
E. 主要位于胃体部
9. 男性, 26 岁, 因食物中毒导致急性胃炎, 出现上腹痛、恶心、呕吐等临床表现。
- 1) 该患者病情确诊依赖于
- A. X 线胸片 B. 急诊胃镜
C. 食管 pH 检测 D. CT
E. 食管吞钡 X 线检查
- 2) 下列治疗不宜采用的是
- A. 给解痉镇痛药物
B. 给予 H₂受体拮抗剂
C. 给予质子泵抑制剂
D. 给予铝碳酸镁
E. 给予三腔二囊管
10. 男, 46 岁, 乙型病毒肝炎史 10 余年, 因乏力、腹胀、少尿就诊。查体: 巩膜黄染, 肝掌, 胸前区见数个蜘蛛痣, 腹膨隆, 肝右肋下及剑突下未及, 脾肿大, 移动性浊音(+).
- 1) 下列哪项指标不能提示肝功能减退
- A. 肝掌 B. 黄疸
C. 蜘蛛痣 D. 脾肿大
E. 白蛋白明显降低
- 2) 下列哪项治疗措施不适当
- A. 卧床休息
B. 低盐饮食
C. 利尿治疗以每天体重减轻不超过 2kg 为宜
D. 定期补充血浆或白蛋白
E. 合并应用保钾与排钠利尿药
11. 女性, 58 岁, 右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐 16 小时, 急诊入院, 寒战高热, 明显黄疸。检查: 巩膜及全身皮肤黄染, P110 次/分, T39.8℃。BP90/60mmHg, 剑突下压痛, 腹肌紧张。WBC 19×10^9 /L。
- 1) 本例的治疗原则是
- A. 大量使用抗生素
B. 胃肠减压, 维持水电解质平衡
C. 解痉, 镇痛

做题随手记

- D. 服用大量中药利胆
E. 胆道减压引流，解除梗阻
- 2) 此病人应诊断为
- A. 急性胆源性胰腺炎
B. 肝脓肿
C. 急性化脓性胆囊炎
D. 十二指肠溃疡急性穿孔
E. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- 3) 急诊剖腹探查术。术中见胆总管直径为 1.8 cm，穿刺有脓性胆汁。P130 次/分，BP50/30mmHg，此时应采用术式
- A. 胆囊切除并胆总管切开引流减压
B. 胆囊切除术
C. 胆囊空肠改良式 Roux-Y 吻合
D. 胆总管空肠 Roux-Y 吻合
E. 胆总管切开引流减压 T 管引流
12. 男性，40 岁。低热、右下腹痛、腹泻伴黏液便 8 个月。消瘦、贫血。右下腹压痛。血沉 34mm/h，钡餐检查回肠末段有三段肠壁僵硬、狭窄，皱襞粗乱，有卵石样充盈缺损及线样征。
- 1) 该患者最可能的诊断为
- A. 十二指肠溃疡 B. 肠结核
C. Crohn 病 D. 溃疡性结肠炎
E. 结肠癌
- 2) 下列治疗中该患者不宜采用的是
- A. 氨基水杨酸制剂
B. 糖皮质激素
C. 免疫抑制剂
D. 抗菌药物
E. 硫酸镁
13. 女，68 岁，近 3 个月来常有黏液血便，大便次数增多，有肛门坠胀及里急后重感，大便变细，上述症状进行性加重，查体：生命体征平稳，腹部无明显阳性体征。血尿常规均正常。
- 1) 首选的检查应是
- A. 乙状结肠镜 B. 腹部 B 超
C. 腹部 CT D. 钡剂灌肠
E. 直肠指检
- 2) 患者未积极治疗，3 个月后可出现膀胱刺激症状
- A. 膀胱原发肿瘤 B. 淋巴转移
C. 血行转移 D. 种植转移
E. 直接浸润
14. 女，34 岁。反复发作上腹部疼痛 3 年。尤其是进食油腻食物和夜间明显，近 3 天上腹绞痛，伴发热寒战，皮肤巩膜黄染。
- 1) 该患者首选检查方法是
- A. B 超 B. CT
C. MRI D. PTC
E. ERCP
- 2) 该病最可能的原因是
- A. 肿瘤 B. 结石
C. 蛔虫 D. 炎性狭窄
E. 先天畸形
- 3) 若患者出现神志淡漠，嗜睡，BP90/50mmHg，最有效的治疗措施是
- A. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
B. 给予有效足量抗生素
C. 应用肾上腺皮质激素
D. 紧急手术解除胆道梗阻并减压
E. 使用多巴胺等药物维持血压
15. 男性，30 岁。低热，腹痛 3 个月，尿少，腹围增加 2 周。查体：腹部膨隆，腹肌紧张，腹部弥漫压痛和反跳痛(+)，移动性浊音阳性。
- 1) 对该患者诊断最有意义的检查是
- A. 血常规及血沉 B. 肾功能
C. 尿常规 D. 腹腔穿刺
E. MRI
- 2) 如考虑腹腔结核感染，对于确诊最有意义的是
- A. 造影
B. 腹部 B 型超声检查
C. 腹水结核杆菌培养
D. 胸腹部 CT
E. PPD 试验
- 3) 应采用的主要治疗措施是
- A. 抗结核治疗 B. 口服利尿剂
C. 免疫治疗 D. 静脉点滴抗生素

做题随手记

- E. 静脉输注白蛋白
16. 女, 43岁, 右下腹持续性疼痛5天, 伴恶心、呕吐, 呕出物为胃内容物。体温38.5℃。体检发现右下腹5cm×5.5cm大小肿块, 触痛明显。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 粪块所致肠梗阻
B. 盲肠肿瘤
C. 急性化脓性阑尾炎
D. 阑尾周围脓肿
E. 盲肠扭转
- 2) 此时较合适的处理是
- A. 急诊行阑尾切除术
B. 急诊手术脓肿引流
C. 肠道准备后行右半结肠切除术
D. X线钡灌肠
E. 暂不手术, 保守治疗
- 3) 如果急诊手术, 最合适的手术方式是
- A. 脓肿引流 B. 切除肿块
C. 常规切除阑尾 D. 右半结肠切除
E. 一期肠吻合
17. 女, 68岁。突发上腹阵发性绞痛2小时, 短时间内寒战、高热, 小便呈浓茶样, 随后嗜睡。查体: T39.6℃, P128次/分, R30次/分, BP80/50mmHg。神志不清, 躁动, 巩膜黄染, 右上腹肌紧张, 有压痛和反跳痛。
- 1) 导致该患者所患疾病最可能的病因是
- A. 胆管肿瘤 B. 胆管结石
C. 胆管蛔虫 D. 胆管狭窄
E. 胆管畸形
- 2) 以下非手术治疗措施中, 不是必需的是
- A. 持续吸氧
B. 联合使用足量抗生素
C. 纠正水、电解质紊乱
D. 输注2个单位红细胞
E. 必须禁食、胃肠减压
- 3) 急诊手术最有效的手术方式是
- A. 胆总管切开减压术
B. 腹腔镜胆囊切除术
C. 胆囊造瘘术
D. 胆总管空肠吻合术
E. 胆总管十二指肠吻合术
18. 一位45岁男性腹水住院患者, 2天前呕血800ml, 经抢救好转, 早晨躁动不安, 认人不清, 查体: 轻度黄疸, 结膜无苍白, 扑翼样震颤(+), 腹膨隆, 腹部移动性浊音(+), 四肢张力增强。
- 1) 最有助于诊断的辅助检查是
- A. 血氨测定 B. 血清电解质测定
C. 腹水常规 D. 脑CT
E. 脑脊液
- 2) 目前对该患者躁动的治疗, 下列哪项最合适
- A. 巴比妥钠 B. 安定
C. 异丙嗪 D. 乳果糖
E. 水合氯醛
19. 男性, 40岁, 突然呕血300ml, 暗红色, 并解黑便二次, 查体: 蜘蛛痣, 肝肋下1.5cm, 质硬, 脾肋下3.0cm, 少量腹腔积液, 急诊胃镜检查为食管静脉重度曲张伴活动出血。
- 1) 以下哪种抢救措施是错误的
- A. 积极补充新鲜血及快速补液
B. 急诊内镜注射硬化剂
C. 静脉应用垂体加压素
D. 水合氯醛灌肠镇静治疗
E. 三腔二囊管压迫止血
- 2) 最有效药物治疗是
- A. 静脉注射维生素K
B. 输新鲜血浆
C. 静脉注射奥美拉唑(洛赛克)
D. 服用凝血酶
E. 静脉点滴生长抑素
20. 男, 56岁。突发性右侧肢体无力, 伴头痛、呕吐咖啡样物300ml, 排黑便2次。有高血压和糖尿病史5年。
- 1) 为明确呕血、黑便的检查是
- A. X线钡餐透视 B. 大便隐血试验
C. 血常规 D. 胃镜
E. B超
- 2) 黑便原因很可能是

做题随手记

- A. 食管癌 B. 胃癌
C. 胃溃疡 D. 应激性溃疡
E. 胃底静脉曲张破裂出血
21. 男性, 28岁。反复右下腹痛3年, 伴便秘、口腔溃疡、无发热及乏力。否认结核病史及结核密切接触史。查体: 右下腹可触及边界不清的包块, 可移动, 压痛阳性。
- 1) 首先考虑的诊断是
- A. 克罗恩病 B. 肠结核
C. 结肠癌 D. 阑尾炎
E. 胆囊炎
- 2) 为明确诊断, 最重要的检查是
- A. 大便隐血 B. 大便找抗酸杆菌
C. 腹部CT D. MRI
E. 结肠镜检查及活检
22. 患者男, 35岁。饱餐后出现上腹部剧烈疼痛8小时, 向后背放射, 屈曲位腹痛减轻, 伴呕吐。有胆囊结石病史。查体: 腹软, 两侧肋腹部皮肤呈暗灰蓝色, 上腹部有压痛、反跳痛, Murphy征阴性, 肠鸣音弱。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 消化道穿孔 B. 急性胰腺炎
C. 急性胆囊炎 D. 急性阑尾炎
E. 急性肝炎
- 2) 对明确诊断最有意义的检查是
- A. CT B. CEA
C. 血常规 D. ALT
E. 消化道钡餐造影
23. 女, 42岁, 饱餐后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐8小时来诊, 既往无胃病史。查体: $T38^{\circ}\text{C}$, 巩膜无黄染, 上腹偏左有压痛及肌紧张, 肝浊音界正常, Murphy征阴性, 肠鸣音正常。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 急性肠梗阻 B. 急性阑尾炎
C. 急性胆囊炎 D. 急性胰腺炎
E. 消化性溃疡穿孔
- 2) 为明确诊断, 首选的检查是
- A. 尿淀粉酶 B. 血淀粉酶
C. 血脂脂肪酶 D. 肠镜
- E. 腹部平片
24. 女性, 70岁, 进行性无痛性黄疸2个月, 上腹胀痛, 体重减轻。检查: 巩膜及周身皮肤黄染, $P90$ 次/分, $BP140/70\text{mmHg}$, 血清总胆红素为 $70\mu\text{mol/L}$, Courvoisier征阳性。
- 1) 此病人首先考虑诊断为
- A. 中、下段胆管癌 B. 胆囊癌
C. 肝门部胆管癌 D. 胆囊结石
E. 胆总管结石
- 2) 一般首选的检查方式为
- A. ERCP B. PTC
C. CT D. MRI
E. BUS
- 3) 如为胆管下端癌(下段癌), 其治疗是
- A. 胆管局部切除
B. 胆总管空肠 Roux-Y 胆道重建术
C. 胆囊空肠改良式 Roux-Y 吻合术
D. 胰十二指肠切除术
E. 胆囊空肠 Roux-Y 型吻合术
25. 患者, 男性, 38岁, 既往有胆结石病史, 5小时前因少量饮酒突起腹痛, 自服654-2未缓解, 随后出现寒战高热遂来院就诊, 查体: 精神差, 体温 39°C , 脉搏125次/分, 血压 $89/60\text{mmHg}$, 剑突下及右上腹部有压痛, 肝大, 同时可扪及肿大胆囊, 巩膜、皮肤黄染。
- 1) 从患者的临床表现来看, 属于
- A. Charcot三联征 B. Reynolds五联征
C. Whipple三联征 D. Beck三联征
E. 以上均不是
- 2) 作为一线临床医师, 你的初步诊断是
- A. MODS B. IBS
C. AOSC D. 冠心病
E. 感染性休克
26. 男, 45岁。肝炎病史20余年, 近2月来出现右侧季肋部持续胀痛, 伴厌食、乏力和腹胀。查体: 右侧肋缘下可触及肿大的肝脏, 质地坚硬, 边缘不规则; $\text{AFP} > 1000\mu\text{g/L}$ 。
- 1) 首先考虑的疾病是
- A. 肝硬化 B. 慢性肝炎活动期

做题随手记

- C. 原发性肝癌 D. 细菌性肝脓肿
E. 肝脏血管瘤
- 2) 有确定诊断意义的检查是
- A. 肝功能检查
B. CT
C. MRI
D. 肝穿刺针吸细胞学检查
E. 选择性肝动脉造影
27. 女性, 60岁, 既往体健, 最近半年出现右侧腹痛、皮肤发黄、乏力、消瘦、食欲减退、腹胀等。查体: 皮肤巩膜黄染, 肝肋下3cm。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 胃溃疡 B. 胃癌
C. 肠梗阻 D. 肝癌
E. 胰腺炎
- 2) 为明确诊断, 下列检查中最可靠的是
- A. 肝功能检查
B. CT
C. MRI
D. B超下肝穿刺针吸细胞学检查
E. 触诊
28. 男性, 50岁, 患有胆管结石, 今日突发寒战、高热、肝区疼痛, 伴有恶心、呕吐、食欲缺乏和周身乏力, B超可见肝内囊性暗区, 囊壁厚。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 肝癌 B. 肝硬化
C. 脂肪肝 D. 肝性脑病
E. 肝脓肿
- 2) 为了进一步明确诊断及指导治疗, 下一步该做的检查及化验是
- A. 血清细菌培养及血清学阿米巴抗体检测
B. 血清AFP
C. CT检查
D. 脑电图
E. PET
29. 女性, 50岁, 种植水稻, 最近出现恶心、呕吐、偶有呕吐鲜红色血液。查体可见脾大, 内镜下见食管胃底静脉曲张, 多普勒超声见门静脉内径1.6cm。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 食管癌 B. 胃炎
C. 胃溃疡 D. 胃癌
E. 门静脉高压
- 2) 若该患者在就诊时出现食管胃底曲张静脉急性大出血, 则首选的治疗方法为
- A. 垂体后叶素 B. 血管加压素
C. 生长抑素 D. 内镜治疗
E. 三腔管压迫止血
30. 男性, 60岁, 饮酒30余年, 最近1年出现乏力、食欲缺乏, 伴有恶心、腹胀、上腹部不适。肝脏病理发现假小叶形成。
- 1) 该患者的诊断应该是
- A. 胃溃疡 B. 胃癌
C. 肝癌 D. 肝硬化
E. 功能性消化不良
- 2) 下列关于该患者的治疗措施错误的是
- A. 适当运动
B. 食物应选择高热量、维生素丰富、易消化的
C. 戒酒
D. 可以静脉输注高渗葡萄糖液以补充热量
E. 抗病毒治疗
31. 男, 57岁。3月来腹胀、水肿, 1周来加重伴腹痛。20年前曾发现HBsAg(+). 查体: 可见肝掌及蜘蛛痣。蛙状腹, 肝未及, 脾肋下4cm, 全腹压痛, 无明显反跳痛, 移动性浊音阳性。化验: 血清蛋白24g/L, 血球蛋白31g/L, 血钾3.8mmol/L, 血钠136mmol/L, 血氯98mmol/L。
- 1) 该患者最必要的检查是
- A. 腹水常规+细菌培养
B. 尿常规及尿钠检测
C. 腹部B超检查
D. 腹部CT检查
E. 胃镜检查
- 2) 该患者最可能的并发症是
- A. 电解质紊乱 B. 肠梗阻
C. 自发性腹膜炎 D. 代谢性酸中毒
E. 肝肾综合征

做题随手记

- 3) 该患者最可能的基本诊断是
- A. 原发性肝癌 B. 乙型肝炎肝硬化
C. 慢性乙型肝炎 D. 原发性肾病综合征
E. 结核性腹膜炎
32. 患者，男，45岁。原有胃溃疡病史15年，近2个月来上腹疼痛的节律性消失，服用制酸剂疗效不佳。
- 1) 为了明确诊断，应采用下列哪一项最有价值的检查
- A. 胃镜 B. X线钡餐检查
C. 胃液分析 D. 粪潜血检查
E. 幽门螺杆菌检测
- 2) 若患者粪潜血多次阳性，胃镜病理见胃溃疡边缘重度不典型增生，应采取下列哪一种治疗措施
- A. 质子泵抑制剂 B. 中药治疗
C. 化学治疗 D. 手术治疗
E. 胃黏膜保护剂
33. 男性，65岁，既往体健，近期发现左锁骨上淋巴结肿大，无痛，活动较好，活检为转移性腺癌。
- 1) 有确诊意义的检查为
- A. 上消化道造影
B. 便潜血检查
C. 粪便脱落细胞检查
D. 纤维胃镜检查
E. 腹部B超
- 2) 检查确诊为胃小弯侧腺癌，该病人的治疗原则是
- A. 手术+化疗
B. 姑息性胃肠吻合术
C. 放射治疗
D. 根治性胃大部切除，左锁骨上淋巴结清除术
E. 全胃切除
34. 女性，40岁，胃溃疡史4年，2个月来上腹无规律疼痛，进食后加重。钡餐透视：胃黏膜增粗，紊乱，胃窦见1.0cm×1.5cm龛影。
- 1) 该患者的诊断为
- A. 胃溃疡癌变 B. 复合性溃疡
C. 胃溃疡并幽门梗阻
D. 胃溃疡并慢性胃炎
E. 胃溃疡并胃黏膜脱垂
- 2) 若患者出现呕血，血压为80/50mmHg，心率120次/分，并出现面色苍白、烦躁、出汗，则首选的治疗措施是
- A. 输血 B. 口服去甲肾上腺素
C. 肌注止血敏 D. 输白蛋白
E. 输生理盐水
35. 男，72岁，慢性胃炎30年，近2周出现发作性胸痛，伴反酸、胃灼热、呃逆，今日胸痛2分钟来诊。
- 1) 为鉴别是否为心源性胸痛，首先要进行以下哪种检查
- A. 胃镜
B. 心电图
C. 24小时食管pH监测
D. 冠脉造影
E. 食管测压
- 2) 要确诊胃食管反流病，最主要的检查是
- A. 内镜检查+24小时食管PH监测
B. 食管吞钡X线检查+24小时食管pH监测
C. 食管吞钡X线检查
D. 食管测压+内镜检查
E. 内镜检查
36. 男性，65岁，反复发作反酸，胃灼热，胸骨后痛10年余，近日感觉上述症状加重明显，伴进食哽咽感，食欲不振，消瘦。
- 1) 根据上述症状，以下诊断哪一项可能性最大
- A. 心绞痛 B. 胃食管反流病
C. 慢性活动性胃炎 D. 十二指肠球部溃疡
E. 胆囊炎
- 2) 近期症状变化，以下哪种情况可能性最小
- A. 食管癌 B. 反流性食管炎加重
C. 伴发食管狭窄 D. 伴发神经系统损害
E. 伴发Barrett食管
37. 男性，42岁，高血压病史，长期服用硝苯地平，最近出现烧心、反流、胸痛，食用高脂

做题随手记

肪、巧克力等症状明显加重。

1) 该患者最可能的诊断是

- A. 胃溃疡 B. 十二指肠溃疡
C. 胃食管反流病 D. 冠心病
E. 肋间神经炎

2) 该患者首选的检查是

- A. 胃镜 B. 肠镜
C. 食管 X 线 D. 心电图
E. 肌电图

38. 男, 45 岁。进食高脂餐并饮酒后上腹持续疼痛 8 小时, 呕吐 2 次后疼痛无缓解。查体: T37.8℃, 上腹部偏左压痛、反跳痛。

1) 最有诊断意义的辅助检查是

- A. 血清脂肪酶 B. 血常规
C. 血清淀粉酶 D. 立位腹部 X 线平片
E. 心电图

2) 最可能的诊断是

- A. 急性胃炎 B. 急性胆囊炎
C. 肠梗阻 D. 急性胰腺炎
E. 急性心肌梗死

3) 如需使用抗生素治疗, 抗生素选择的最佳配伍是甲硝唑和

- A. 阿奇霉素 B. 克林霉素
C. 环丙沙星 D. 头孢拉啶
E. 青霉素

39. 女性, 65 岁。间断右上腹疼痛 10 余年, 1 小时前突发剧烈腹痛, 阵发性加剧, 现出现烦躁不安, 四肢厥冷, 皮肤呈斑点状。化验见血钙明显下降。

1) 进一步检查可发现下列体征, 除外

- A. Cullen 征 B. 腹肌强直
C. 腹膜刺激征阳性 D. 肠鸣音亢进
E. Grey-Turner 征

2) 最可能诊断为

- A. 急性肠梗阻 B. 急性胰腺炎
C. 急性胃炎 D. 心肌梗死
E. 急性胆囊炎

3) 下列哪项表现提示预后不良

- A. 空腹血糖 8.0mmol/L
B. 高胆红素血症

C. 血清淀粉酶超过正常值 3 倍

D. 高甘油三酯血症

E. 血钙降低

4) 下列治疗措施错误的是

- A. 尽早镇痛
B. 胃肠减压
C. 应用抑制酶活性药物
D. 抗生素
E. 抑酸治疗

40. 男性, 40 岁, 暴饮暴食后, 心窝部突然疼痛, 恶心呕吐。呕吐物为胃内容物, 吐后疼痛不缓解, 查体: T38.4℃, P96 次/分, 脐周压痛, 反跳痛, 肌紧张不明显, 无移动性浊音, 肠鸣音减弱, 麦氏点无压痛。血 WBC $12.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞占比 88%。

1) 诊断怀疑是

- A. 急性胆囊炎 B. 急性胃肠炎
C. 急性胰腺炎 D. 急性单纯性肠梗阻
E. 急性阑尾炎

2) 进一步明确诊断需进行以下哪项检查

- A. 腹部立位平片 B. 心电图
C. 钡餐造影 D. 血、尿淀粉酶测定
E. 动脉造影

3) 该患者应采取以下哪项治疗方法

- A. 流食, 中药治疗
B. 半流食, 针刺疗法
C. 抗生素, 补液治疗
D. 禁食水, 解痉止痛
E. 禁食水, 抗生素注射, 补液, 解痉止痛

4) 该患者最可能发生以下哪种并发症

- A. 胰腺假性囊肿 B. 肠梗阻
C. 肠出血 D. 肠痿
E. 腹腔脓肿

41. 男, 28 岁, 消化性溃疡病史 5 年, 今日饱餐后突感上腹部剧痛。检查: 血压 130/80mmHg, 脉搏 110 次/分, 板状腹, 肠鸣音消失。Hb $120g/L$, WBC $8.0 \times 10^9/L$ 。

1) 首先应采取的检查为

- A. 腹部立位 X 线平片
B. 腹部 B 超 C. 腹腔穿刺

做题随手记

- D. 腹部 MRI E. 腹部 CT
- 2) 该溃疡最常见的位置是
- A. 胃前壁 B. 胃后壁
- C. 胃大弯及胃底 D. 胃小弯近贲门处
- E. 胃窦小弯侧
- 3) 若腹穿抽出较多液体, 应尽早采取的治疗措施是
- A. 胃肠减压、输液
- B. 镇痛镇静治疗
- C. 全量应用抗生素
- D. 输液、纠正水、电解质酸碱失衡
- E. 手术探查
42. 男, 60 岁。上腹部规律性疼痛, 多是饭后痛, 诊断为胃溃疡, 近 1 个月因胃溃疡合并多次大出血, 行胃大部切除术。
- 1) 该患者术后 5 天出现黑便, 最可能的原因是
- A. 小弯侧关闭止血不确切
- B. 吻合口出血
- C. 吻合口部分黏膜坏死脱落
- D. 应激性溃疡
- E. 术后胃内残余血
- 2) 术后 10 天, 可进流食, 突然出现呕吐, 禁食后症状好转。钡餐检查见输出段有较长狭窄, 形似漏斗。该患者可选择的治疗措施不包括
- A. 胃肠减压 B. 输血
- C. 应用皮质激素 D. 肌内注射新斯的明
- E. 即刻手术
- 3) 该患者术后可能出现的营养性并发症不包括
- A. 体重减轻 B. 溶血性贫血
- C. 腹泻 D. 脂肪泻
- E. 骨病
43. 患者, 男性, 40 岁, 中上腹饥饿性隐痛反复发作 10 年, 伴反酸、嗝气, 进食和服用抑酸剂可缓解。
- 1) 该患者最可能的疾病是
- A. 胃癌 B. 胰腺癌
- C. 消化性溃疡 D. 慢性胆囊炎
- E. 慢性胰腺炎
- 2) 患者 4 小时前突然出现中上腹剧痛且腹痛持续存在, 该患者可能发生的并发症是
- A. 急性胰腺炎并发出血坏死
- B. 胰腺癌并发肠梗阻
- C. 胃癌并发幽门梗阻
- D. 消化性溃疡并发急性穿孔
- E. 急性胆囊炎并发胆汁性腹膜炎
- 3) 为确诊应选择的检查手段是
- A. 血清淀粉酶测定
- B. 癌胚抗原测定
- C. 胃镜检查
- D. 立位腹部 X 线平片
- E. 中腹部 B 超
44. 男性, 60 岁, 近三个月出现上腹疼痛、进食后饱胀及体重减轻, 最近半个月上腹痛加重, 出现食欲下降、乏力, 偶有呕血。X 线钡餐检查发现胃内较大而不规则的充盈缺损。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 胃溃疡 B. 胃炎
- C. 胃食管反流病 D. 胃癌
- E. 食管癌
- 2) 为进一步确诊, 该患者首选
- A. X 线钡餐 B. 腹部增强 CT
- C. 超声内镜 D. 胃镜+活检
- E. 胃超声
- 3) 该患者的治疗首选
- A. 质子泵抑制剂 B. 胃黏膜保护药物
- C. 手术治疗 D. 化疗
- E. 放疗
45. 男性, 60 岁, 出现进行性吞咽困难 2 个月, 近期出现吞咽食物不适感及胸骨后烧灼、针刺样疼痛。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 冠心病 B. 胃溃疡
- C. 胃癌 D. 食管癌
- E. 上消化道出血
- 2) 进一步检查首选
- A. 心电图 B. 幽门螺杆菌检测
- C. 胃酸测定 D. 内镜检查

做题随手记

- E. 大便常规
- 3)若检查证实诊断,则该患者的治疗应选择
- A. β 受体阻滞剂 B. 质子泵抑制剂
C. H_2 受体拮抗剂 D. 垂体后叶素
E. 手术治疗+术后放疗或化疗
46. 男,33岁,因急性坏疽性阑尾炎行阑尾切除术,术后第10天出现发热,体温 39.2°C ,腹胀、恶心,肛门有下坠感,里急后重,曾排便4次,为黏液样便。
- 1)此时首先应选用的检查是
- A. 大便培养 B. 腹部X线平片
C. 血常规 D. 腹部B超
E. 直肠指检
- 2)诊断明确后,除抗感染和支持治疗外,以下处理措施应首先选择的是
- A. 经直肠穿刺抽液定位后切开引流
B. 经下腹正中切口进入腹腔引流
C. 经原麦氏切口进入腹腔引流
D. 腹腔热理疗
E. 温盐水加甲硝唑保留灌肠
47. 病人阑尾炎术后,1周出现发热,体温 38.5°C ,伴有里急后重,大便次数 $6\sim 8$ 次/日,内有黏液
- 1)此时,最直接的检查方法是
- A. 血培养 B. 腹腔穿刺之
C. 直肠指诊 D. 腹部X线平片
E. 腹部B超
- 2)此时,病人处理原则是
- A. 开腹探查,清除病灶
B. 经直肠引流
C. 抗生素治疗
D. 局部理疗
E. 口服肠道消炎药
48. 男性,23岁,暴饮暴食后出现脐周腹痛,后转移至右下腹。来院后疼痛转移至右下腹。做闭孔内肌试验阳性。血常规示白细胞升高。
- 1)该患者最可能的诊断是
- A. 急性胆囊炎 B. 急性胃炎
C. 急性阑尾炎 D. 急性腹膜炎
E. 急性胰腺炎
- 2)若该患者出现腹膜刺激征,肠鸣音消失,考虑原疾病并发
- A. 胰腺假性囊肿 B. 腹膜炎
C. 胆囊脓肿 D. 胃溃疡
E. 肿瘤
49. 男,34岁。因急性阑尾炎穿孔伴局限性腹膜炎,行阑尾切除术后5天。仍有腹痛,腹胀,体温 38°C 以上,大便 $3\sim 5$ 次/天,有下坠感。血 $WBC18\times 10^9/L$
- 1)首先考虑为
- A. 切口感染 B. 并发肠炎或菌痢
C. 并发膈下脓肿 D. 盆腔脓肿
E. 化脓性门静脉炎
- 2)为明确诊断,首先应做的检查是
- A. 伤口检查 B. B超
C. 直肠指诊检查 D. X线胸腹部摄片
E. 粪便常规检查
50. 男,54岁,20天内呕血2次,之后大便发黑。乙肝病史30年。贫血貌,浅表性淋巴结未触及,皮肤蜘蛛痣和出血点。腹软,肝未触及,腹水征(+),肾功能正常。胃镜检查见食管胃底静脉曲张。
- 1)最适宜的治疗方法是
- A. 远端脾肾静脉分流术
B. 脾切除、胃底食管下端周围血管离断术
C. 脾切除、脾肾静脉分流术
D. 门腔静脉侧吻合分流术
E. 经颈静脉肝内门体分流术
- 2)如果治疗后又发生大出血,最易发生的并发症是
- A. 肝性脑病 B. 急性左心衰
C. 重度腹水 D. 急性肾衰竭
E. 急性肝坏死
51. 患者女性,36岁。间断右下腹痛6个月,伴腹泻、发热。体温多波动于 $37\sim 38^{\circ}\text{C}$,否认结核病史和肺结核密切接触史。查体右下腹可触及包块,可移动,有压痛,无反跳痛
- 1)下列哪种说法正确
- A. 患者可确诊为肠结核,无需进一步检查

做题随手记

- B. 患者不能除外 Crohn 病应进一步行结肠镜检查
- C. 应立即行剖腹探查
- D. 可使用激素进行试验性治疗
- E. 患者最可能的诊断是急性阑尾炎或结肠癌
- 2) 为明确诊断最重要的检查是
- A. 肿瘤指标 B. 便找结核杆菌
- C. 腹平片 D. 结肠镜检查加活检
- E. 胸部 X 线片
52. 女, 55 岁, 皮肤黄染进行性加重 1 个月, 上腹部不适, 10 天前发现小便呈浓茶样, 近几天来大便呈灰白色, 查体: T36.8℃, 皮肤、巩膜黄染, 腹软, 右上腹可触及肿大的胆囊, 无压痛, 无反跳痛, 体重下降。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 胆总管结石 B. 肝细胞性肝癌
- C. 肝门部胆管癌 D. 胆囊结石
- E. 胰头癌
- 2) 该患者手术治疗后第 4 天发生上腹部剧烈疼痛, 腹腔引流明显增加, 引流液淀粉酶 15000U/L, 患者最有可能发生的并发症是
- A. 胰漏 B. 急性胰腺炎
- C. 肠系膜血栓形成 D. 肠漏
- E. 胆漏
53. 男, 70 岁。饮酒 1 小时后呕咖啡样物 100ml, 后排黑便 100g。既往体健。查体: P110 次/分, BP90/50mmHg。
- 1) 首选的治疗药物是
- A. 多巴胺 B. 硫糖铝
- C. 止血芳酸 D. 纳洛酮
- E. 奥美拉唑
- 2) 对诊断及治疗最有意义的检查是
- A. 胃镜
- B. 腹部 X 线平片
- C. 上消化道 X 线钡餐造影
- D. 腹部 B 超
- E. 腹部 CT
54. 男, 22 岁, 因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病史。查体: 面色稍苍白, 血压 100/60mmHg, 心率 92 次/分, 腹软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 十二指肠溃疡并发出血
- C. 胃癌出血
- D. 佐林格-埃利森 (Zollinger-Ellison) 综合征并发出血
- E. 食管贲门撕裂综合征
- 2) 药物治疗首选
- A. 质子泵抑制剂 B. 硫糖铝
- C. 生长抑素制剂 D. 枸橼酸铋钾
- E. 米索前列醇
- 3) 成人出现大便隐血阳性时, 消化道出血量至少大于
- A. 10ml B. 9ml
- C. 8ml D. 6ml
- E. 5ml
55. 患者男性, 51 岁, 呕血、便血 6 小时量约 1000ml。患者患肝炎后肝硬化 10 年。入院体检: 血压 90/60mmHg, 心率 110 次/分, 巩膜轻度黄染, 腹平、软, 肝未及, 脾肋下 7cm, 移动性浊音阳性, 肠鸣音稍亢进。
- 1) 应给予患者的首要处理
- A. 配血, 等待输血
- B. 行胃镜检查, 明确出血部位
- C. 迅速建立静脉通路, 以平衡液快速扩容, 纠正休克
- D. 准备三腔二囊管压迫止血
- E. 查血常规、肝功能
- 2) 下列处理哪项是正确的
- A. 开腹手术治疗
- B. 以冰盐水和去甲肾上腺素洗胃
- C. 给予止血敏
- D. 给予氢氧化铝抗酸
- E. 给予血管升压素或生长抑素静点
56. 男, 56 岁, 反酸、烧心 5 年, 胃镜检查: 食管下段黏膜多发条形破损, 相互融合。
- 1) 该患者最可能的诊断为
- A. 慢性胃炎 B. 慢性食管炎
- C. 胃食管反流病 D. 消化性溃疡

做题随手记

- E. 贲门失迟缓症
- 2) 该患者首选的治疗药物是
- A. 奥美拉唑 B. 法莫替丁
C. 硫糖铝 D. 枸橼酸铋钾
E. 阿托品
- 3) 该患者的治疗措施不包括
- A. 应用促胃肠动力药
B. 抗酸治疗
C. 高脂肪饮食
D. 戒烟禁酒
E. H₂受体拮抗剂
57. 女, 38岁, 上腹部不适, 纳差3年, 体重减轻, 乏力半年, 查体: 贫血貌, 上腹部轻压痛, Hb88g/L, MCV115fl, 胃镜检查提示胃体皱襞稀疏, 黏膜血管透见。
- 1) 该患者应首先考虑的诊断是
- A. Menetrier病
B. 慢性浅表性胃炎
C. 慢性萎缩性胃炎
D. 慢性淋巴细胞性胃炎
E. 胃癌
- 2) 对诊断最有意义的辅助检查是
- A. 血癌胚抗原 B. 血胃泌素
C. 血胃蛋白酶原 D. 血壁细胞抗体
E. 血抗线粒体抗体 M₂亚型
- 3) 该患者发生贫血最可能的机制是
- A. 维生素C缺乏 B. 慢性消化道失血
C. 铁吸收障碍 D. 蛋白质吸收障碍
E. 内因子缺乏
58. 男性, 60岁, 患有糖尿病20余年, CT平扫可见肝脏密度低于脾脏, 肝内血管显示不清。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 肝癌 B. 肝硬化
C. 脂肪肝 D. 肝性脑病
E. 肝脓肿
- 2) 该患者的治疗不正确的是
- A. 低糖低脂平衡膳食
B. 适当运动
C. 多烯磷脂酰胆碱
D. 水飞蓟素
E. 手术治疗
59. 男, 55岁。肝硬化患者, 有腹水。不规则服用利尿剂治疗, 近日来出现嗜睡。体检: 轻度黄疸, 测血钠 120mmol/L, 血钾 2.6mmol/L, 氯化物 90mmol/L, BUN10mmol/L, 血 pH7.5。
- 1) 患者肝昏迷的诱因是
- A. 黄疸 B. 低血钠
C. 低血钾 D. 酸中毒
E. 氮质血症
- 2) 此时最好的治疗是静脉滴注
- A. 谷氨酸钠
B. 谷氨酸钠+精氨酸
C. 谷氨酸钠+谷氨酸钾
D. 谷氨酸钠+左旋多巴
E. 谷氨酸钠+支链氨基酸+10%氯化钾
- 3) 下列哪项体征对该例诊断有特征性意义
- A. 肌张力增强 B. 腱反射亢进
C. 扑翼震颤阳性 D. 腹壁反射消失
E. 嗜睡
60. 男, 56岁, 乏力、食欲不振、恶心、消瘦1个月, 乙型肝炎病史10年。查体: 皮肤巩膜无黄染, 腹软, 剑突下压痛, 肝肋下3cm, 可触及质硬的结节, Murphy征阴性, 移动性浊音阳性。
- 1) 为了明确肝脏结节性质, 最有诊断价值的肿瘤标志物是
- A. CEA B. CA125
C. CK19 D. AFP
E. CA19-9
- 2) 为进一步检查明确肝脏结节的大小与位置, 首选的检查是
- A. PET-CT检查 B. MRI检查
C. 放射性核素扫描 D. B超检查
E. 肝动脉造影
- 3) 该患者若手术治疗, 其禁忌证是
- A. 合并肝硬化 B. 有消化道出血史
C. 有明显腹水 D. 肿瘤位于肝右叶
E. 肿瘤直径约10cm
61. 男性, 42岁, 丙型肝炎史6年, HCV-RNA阳

做题随手记

性, ALT38U, 球蛋白 28g/L, 白蛋白 38g/L, 肝活检示慢性肝炎。

1) 该病人目前是

- A. 肝癌 B. 急性丙型肝炎
C. 肝硬化 D. 肝癌高危人群
E. 正常人群

2) 对该病人目前的最好处理是

- A. 抗病毒治疗, 定期进行 AFP 和超声检查
B. 定期进行血管造影检查
C. 积极的护肝治疗
D. 定期进行 MRI 检查
E. 积极的预防肝癌治疗

62. 男, 69 岁, 右侧腹股沟区可复性肿块 8 年。查体: 患者直立时, 在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方有一 4cm×4cm 半球形肿物, 未进入阴囊, 平卧后自行消失。

1) 该患者最可能的诊断是

- A. 股疝 B. 隐睾
C. 交通性鞘膜积液 D. 腹股沟斜疝
E. 腹股沟直疝

2) 该患者最有效的治疗方法是

- A. 用棉线束带或绷带压迫内环口
B. 禁烟、控制呼吸道感染
C. 注射硬化剂
D. 疝修补术
E. 疝囊高位结扎术

63. 女, 35 岁。腹胀、腹部隐痛伴低热 3 个月。突发脐周绞痛 6 小时, 呕吐数次, 无排气, 排便。

1) 最可能的诊断是

- A. 消化性溃疡并幽门梗阻
B. 慢性阑尾炎急性发作
C. 结肠癌并肠穿孔
D. 结核性腹膜炎并肠梗阻
E. 缺血性肠病并肠梗阻

2) 首选的检查是

- A. 结肠镜检查
B. 立位腹部 X 线平片
C. 腹部 B 超
D. 腹部 CT

E. 腹部 MRI

64. 患者, 女, 30 岁。腹胀 20 天伴低热、乏力、夜间盗汗前来求诊。体检: 腹部轻度膨隆, 腹壁柔韧感, 肝脾未触及, 腹部移动性浊音 (+)。

1) 最可能的诊断是什么

- A. 腹膜癌变 B. 肝硬化腹腔积液
C. 自发性腹膜炎 D. 结核性腹膜炎
E. 盆腔肿瘤

2) 为明确诊断首选哪项检查

- A. 肝功能检查
B. 结核菌素试验
C. 腹腔积液检查及结核杆菌培养
D. 腹部 B 超
E. 胃肠道钡餐造影

65. 女性患者, 30 岁, 左腰被撞击, 1 小时后就诊。查体: BP120/70mmHg, Hb110g/L, 腹部无肌紧张及压痛, 左侧腹触及包块, 范围局限, 无移动性浊音。

1) 最可能出现的情况有

- A. 对侧肾积水
B. 肝破裂
C. 胃穿孔
D. 肾外伤后肾积水
E. 肾外伤, 肾出血、尿液外渗

2) 上述患者行保守治疗 2 小时后, 查 BP80/50mmHg, Hb70g/L, 左上腹包块增大, 此时应考虑

- A. 继续保守治疗
B. 留置尿管
C. 穿刺引流
D. 探查手术并抗休克治疗
E. 肾切除

66. 女, 35 岁。脾切除、小肠切除吻合术后第 5 天, 已排气, 头痛、恶心、腹胀, 随后出现寒战, 四肢发绀, T39.6℃, P108 次/分, BP135/85mmHg, 近 24 小时尿量 650ml。轻度腹胀, 腹软, 全腹轻压痛, 无反跳痛肌紧张。肠鸣音 3 次/分。

1) 最有可能出现异常的是

做题随手记

- A. 白细胞计数 B. 尿常规检查
C. 立位腹部透视 D. 腹部超声检查
E. 血清钾离子
- 2) 最可能的原因为
A. 小肠吻合口漏 B. 手术后创面出血
C. 急性肾衰竭 D. 革兰阴性杆菌感染
E. 高位肠梗阻
67. 女性, 66岁, 反复右上腹部隐痛并反射至右背部5年, 近期急性发作。口服胆囊造影示: 胆囊胆固醇沉积症。手术行胆囊切除。
1) 手术中胆囊肉眼所见可能为
A. 胆囊壁增厚 B. 胆囊外观正常
C. 胆囊增大 D. 胆囊萎缩
E. 慢性炎症性改变
2) 胆囊胆固醇沉积症的病变主要在
A. 黏膜层 B. 浆膜层
C. 肌层 D. 浆膜层及肌层
E. 肌层及黏膜层
68. 男, 29岁, 腹痛、腹泻、黏液血便2周, 大便10余次/日。静滴左氧氟沙星及甲硝唑10天后症状无好转。T39℃, Hb75g/L, 粪便培养未见致病菌生长, 结肠镜示全结肠弥漫性充血、水肿, 伴糜烂及不规则浅溃疡, 病理为重度慢性炎症, 隐窝脓肿形成。
1) 该患者首先考虑的诊断是
A. 肠结核 B. 溃疡性结肠炎
C. 肠易激综合征 D. 克罗恩病
E. 慢性细菌性痢疾
2) 该患者首选的药物是
A. 泼尼松龙 B. 美沙拉嗪
C. 头孢类抗生素 D. 异烟肼
E. 蒙脱石
69. 男, 58岁。进行性贫血。消瘦、乏力半年。有时右侧腹痛, 无腹泻。查体: 右中腹部扪及肿块, 肠鸣音活跃。
1) 下列各项检查可明确诊断的是
A. 纤维结肠镜 B. CEA
C. CT D. B超
E. X线钡餐检查
2) 如果需要手术治疗, 术前准备最重要的是
A. 纠正营养 B. 肠道准备
C. 心肺功能检查 D. 肝肾功能检查
E. 心理准备
70. 女, 28岁, 间断性下腹痛4年余, 大便2~3次/天, 稀便, 无脓血, 便后下腹痛可缓解, 粪常规检查: 未见细胞, 隐血试验阴性, 查体无异常发现。
1) 该患者可能的诊断是
A. 溃疡性结肠炎 B. 克罗恩病
C. 肠易激综合征 D. 肠结核
E. 慢性细菌性痢疾
2) 最适合的药物治疗为
A. 糖皮质激素 B. 匹维溴铵
C. 柳氮磺吡啶 D. 硫唑嘌呤
E. 喹诺酮药物
71. 男性, 36岁, 上腹胀痛、恶心、呕吐1周。呕吐物量大, 为带酸臭味的隔夜宿食, 不含胆汁。呕吐后症状可暂缓解。既往间断上腹痛6年余, 为空腹痛、夜间痛, 秋季好发。查体上腹部轻压痛, 可见胃型、蠕动波, 振水音阳性。
1) 首先考虑的诊断是
A. 功能性胃潴留 B. 幽门梗阻
C. 急性胃炎 D. 十二指肠壅滞症
E. 功能性消化不良
2) 为明确病因, 检查首选
A. B超 B. 胃镜检查
C. 肛门指诊 D. 肝功能检查
E. 血尿淀粉酶
72. 男, 68岁, 阵发性腹痛1年, 自觉有“气块”在腹中窜动, 起初大便次数增加, 近3个月腹胀、便秘, 近3天无肛门排气、排便, 呕吐物有粪便臭味, 一直感觉乏力和低热。
1) 根据病史考虑肠梗阻为
A. 高位不完全梗阻
B. 绞窄性肠梗阻
C. 高位完全肠梗阻
D. 低位不完全肠梗阻
E. 低位完全肠梗阻
2) 该患者引起梗阻的病因最可能的是

做题随手记

- A. 肿瘤 B. 肠系膜血栓
C. 粪块 D. 炎性狭窄
E. 粘连带
3) 禁忌使用的检查是
A. 腹部 B 超 B. 全消化道钡餐造影
C. 腹部 X 线平片 D. 结肠镜
E. 腹部 CT

四 B 型题

- A. 为一级预防
B. 癌肿仅位于黏膜层
C. 辅助手术治疗, 以抑制癌细胞的扩散和杀伤残存癌细胞, 提高手术效果
D. 目前唯一的可能根治胃癌的手段
E. 可提高患者的免疫力

 - 手术治疗是
 - 内镜下治疗
 - 化学治疗
- A. 直接蔓延 B. 淋巴结转移
C. 血行转移 D. 种植转移
E. 呼吸道转移

 - 胃癌的主要转移途径是
 - 晚期胃癌转移到肝脏、肺、胰、骨骼最可能为
 - 女性胃癌患者出现 Krukenberg 瘤最可能原因为
- A. 男性乳腺发育 B. 食管静脉曲张
C. 氨中毒 D. 凝血因子减少
E. 黄疸

 - 门静脉高压可引起
 - 肝脏解毒功能下降表现为
 - 肝脏激素灭活能力下降导致
 - 肝脏合成功能下降表现为
- A. 回盲部
B. 末端回肠和邻近结肠
C. 直肠、乙状结肠
D. 全结肠
E. 十二指肠

 - 肠结核病变大多位于
 - Crohn 病的病变大多位于
- A. 胆道蛔虫病
B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
C. 肝脓肿
D. 急性水肿性胰腺炎
E. 急性胆囊炎

 - 胆囊结石最常见的并发症
 - 最易引起休克的胆道疾病
- A. 腹泻, 便呈糊样
B. 便秘
C. 便血极常见
D. 钡灌肠透视呈铅管征
E. 易并发中毒性巨结肠

 - 溃疡型肠结核常见
 - 增生型肠结核常见
- A. 疼痛-进食-便后缓解
B. 无明显规律
C. 疼痛-便意-便后缓解
D. 便意-疼痛-便后缓解
E. 进食-疼痛-便后缓解

 - 克罗恩病腹痛的特点是
 - 溃疡性结肠炎腹痛的特点是
- A. 疝囊高位结扎术 B. Bassini 法修补术
C. Halsted 法修补术 D. McVay 法修补术
E. Ferguson 法修补术

 - 绞窄性斜疝局部有感染者, 应选的合理手术方式是
 - 股疝最恰当的手术方式是
- A. 肛裂 B. 直肠癌
C. 肛瘘 D. 内痔
E. 直肠息肉

 - 肛诊检查触及不规则肿物, 质硬、固定, 最可能是
 - 肛诊检查触及黏膜外条索状肿物, 质地稍硬、固定, 最可能是
- A. 原发性腹膜炎 B. 盆腔脓肿
C. 继发性腹膜炎 D. 出血性腹膜炎
E. 慢性腹膜炎

 - 阑尾切除术后 8 天, 下腹坠胀不适, 每天大便 20 次左右, 大便带有黏液直肠指检, 直肠前壁扪及触痛性肿块

做题随手记

- 2)患者男性,25岁,呕吐、腹痛6小时,三天没有大便,没有排气,全腹压痛和反跳痛,腹肌紧张,穿刺液有血性液体
11. A. 排便可加重肛门疼痛,伴大便带鲜血
B. 肛周肿痛伴发热
C. 反复发作的肛周红肿疼痛,窦道外口流出脓性分泌物
D. 肛门疼痛,伴有局部暗紫色肿块
E. 排便时出血、无痛
1)肛裂
2)直肠肛管周围脓肿
 12. A. 急性胆囊炎
B. AOSC
C. 急性出血性坏死性胰腺炎
D. 急性坏死性小肠炎
E. 绞窄性小肠梗阻
1)Murphy征出现在
2)Charcot三联征出现在
 13. A. 胆囊切除术
B. 胆囊造口术
C. Oddi括约肌切开成形术
D. 胆囊切除加胆管空肠 Roux-Y吻合术
E. 胆囊切除加胆总管探查引流术
1)慢性胆囊炎合并胆囊积水宜采用
2)肝内胆管大量泥沙样结石宜采用
3)胆囊积脓穿孔合并感染性休克宜采用
4)胆囊多发性小结石有黄疸史宜采用
 14. A. 胃酸轻度减少 B. 胃酸明显减少
C. 胃酸正常或减少 D. 胃酸轻度升高
E. 胃酸明显增高
1)重度萎缩性胃体胃炎患者是
2)萎缩性胃窦胃炎患者是
 15. A. 胃组织学检查 B. 快速尿素酶试验
C. 幽门螺杆菌培养 D. 尿素呼气试验
E. 血清学检查
1)作为幽门螺杆菌根除治疗后复查的首选方法是
2)侵入性检查幽门螺杆菌的首选方法是
 16. A. 补体结合试验阳性
B. 甲胎蛋白阳性
C. 右上腹绞痛及黄疸
D. 穿刺抽出棕褐色脓液
E. 突发寒战高热,肝区疼痛,肝大
1)阿米巴肝脓肿的特点是
2)细菌性肝脓肿的特点是
 17. A. 麻痹性肠梗阻 B. 单纯性肠梗阻
C. 痉挛性肠梗阻 D. 绞窄性肠梗阻
E. 机械性肠梗阻
1)急性小肠扭转一般应及时手术治疗,因为其易发生
2)外伤性腹膜后巨大血肿易发生
 18. A. 不凝的血性液体
B. 黄绿色透明液体,无臭味
C. 稀脓性液体,略带臭味
D. 淡黄色透明液体
E. 黄绿色稠厚液体,带有粪便样特殊臭味
下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体
1)脾破裂
2)胃十二指肠急性穿孔
3)肛周脓肿
 19. A. Cushing溃疡 B. 胃溃疡
C. Curling溃疡 D. 食管腐蚀性溃疡
E. 十二指肠溃疡
1)最易发生癌变的溃疡是
2)烧伤患者发生的溃疡是
 20. A. 早期胃癌 B. 小胃癌
C. 微小胃癌 D. 进展期胃癌
E. 晚期胃癌
1)局限于黏膜或黏膜下层的胃癌
2)癌灶直径 $\leq 5\text{mm}$
 21. A. 胆囊结石 B. 胆管结石
C. 胆囊癌 D. 胆管癌
E. 胆道蛔虫
1)引起急性化脓性梗阻性胆管炎最常见的原因是
2)具有突发性剑突下钻顶样剧烈疼痛症状的疾病是
 22. A. 减少肠道内氨的形成和吸收
B. 纠正电解质紊乱
C. 降低门静脉压力

做题随手记

- D. 纠正氨基酸不平衡
E. 纠正酸碱平衡紊乱
1) 肝性脑病口服乳果糖的主要作用是
2) 肝性脑病注射支链氨基酸的主要作用是
23. A. 腹水比重 <1.016 , 蛋白 20g/L
B. 腹水比重 >1.018 , 李凡他 (Rivalta) 试验阳性
C. 乳糜样腹水
D. 腹水细胞总数 $>1\times 10^9/\text{L}$ 分类以中性粒细胞为主
E. 腹水细胞总数为 $1\times 10^8/\text{L}$, 分类以间皮细胞为主
1) 最可能为肝硬化腹水的是
2) 最可能为结核性腹水的是
24. A. 胆道蛔虫症
B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
C. 肝脓肿
D. 急性水肿型胰腺炎
E. 急性化脓性胆囊炎
1) 最易引起感染性休克的疾病
2) 胆囊结石最常见的并发症是
25. A. DukeA 期 B. DukeB 期
C. DukeC₁ 期 D. DukeC₂ 期
E. DukeD 期
1) 结肠癌病灶侵犯肌层, 但未穿透浆膜层的是
2) 结肠癌病灶穿透肠壁, 无淋巴结转移的是

做题随手记