

第一部分 专项训练3600题



第一篇 消化系统



听听老师怎么讲



试试机考的锋芒

一 A1型题

- 上消化道出血最常见的病因是
 - 食管贲门黏膜撕裂综合征
 - 食管胃底静脉曲张破裂
 - 胃血管畸形
 - 胃癌
 - 消化性溃疡
- 胰头癌常见的首发症状是
 - 贫血
 - 黄疸
 - 稀便
 - 上腹隐痛
 - 皮肤瘙痒
- 一般不会出现蜘蛛痣的部位是
 - 腹部
 - 上肢
 - 面部
 - 胸部
 - 颈部
- 胃体部癌发生转移时，一般首先受累的淋巴结位于
 - 腹主动脉旁
 - 结肠中动脉旁
 - 肝十二指肠韧带
 - 腹腔
 - 胃大弯
- 急性梗阻性化脓性胆管炎的典型临床表现不包括
 - 黄疸
 - 贫血
 - 休克
 - 寒战高热
 - 腹痛
- 因腹部闭合性损伤行剖腹探查手术时应首先探查的器官是
 - 结肠
 - 盆腔器官
 - 肝、脾等实质性器官

关于图书二维码，您需要知道——

亲爱的读者，在本书各系统的开篇页，均附有赠送课程（听听老师怎么讲）和机考题库（试试机考的锋芒）。请扫描对应二维码，下载并安装“医学考试电子书APP”，即可拥有以上增值服务。如需更多视频课程，建议选购医学教育网网上辅导课程，详情见本书彩页。

做题随手记

- D. 胃、十二指肠第一段
E. 胃后壁及胰腺
7. 胰腺癌常见的首发症状是
A. 上腹疼痛、不适 B. 黄疸
C. 消瘦、乏力 D. 消化道症状
E. 低热
8. 胃大部切除术后病人，发生早期倾倒综合征的最晚时间是餐后
A. 20分钟 B. 50分钟
C. 40分钟 D. 30分钟
E. 10分钟
9. 诊断肝硬化并发自发性腹膜炎具有确诊价值的是
A. 腹部压痛
B. 发热
C. 腹胀
D. 腹水 Rivalta 试验阳性
E. 腹水细菌培养阳性
10. 可作为急性胰腺炎常规初筛检查的影像学方法是
A. 腹部 B 超 B. 腹部 X 片
C. 增强 CT 扫描 D. MRI
E. 腹部透视
11. 腹部闭合伤，确诊有无内脏伤最简便、最可靠的诊断方法为
A. X 线照片 B. CT
C. 白细胞计数 D. B 超
E. 腹腔穿刺
12. 下列哪项构成直疝三角
A. 腹直肌外缘、联合肌腱、腹股沟韧带
B. 腹直肌外缘、腹壁下动脉、腹股沟韧带
C. 陷窝韧带、腹壁下动脉、腹股沟韧带
D. 陷窝韧带、腹壁下动脉、腹横筋膜
E. 凹间韧带、腹直肌外缘、联合肌腱
13. 下列哪项指标对判断肝硬化患者预后意义不大
A. 腹水 B. 白蛋白
C. 血清电解质 D. 凝血酶原时间
E. 肝性脑病
14. 肛裂最常见于膝胸位
A. 12 点处 B. 1 点处和 7 点处
C. 9 点处和 3 点处 D. 2 点处和 8 点处
E. 6 点处
15. 重症急性胰腺炎的治疗，哪项错误
A. 抗生素 B. 止痛
C. 生长抑素 D. 加贝酯
E. 为减轻胰腺水肿，补液宜少
16. 采用高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡，主要依据是
A. 溃疡很少恶变
B. 能够减少胃酸分泌
C. 患者年龄大于 70 岁
D. 能防治幽门螺杆菌感染
E. 溃疡病灶小
17. 支配阑尾的神经是交感神经腹腔丛和
A. 内脏小神经 B. 第 10 胸神经
C. 第 12 胸神经 D. 内脏大神经
E. 第 1 腰神经
18. 消化性溃疡发病机制中最重要的攻击因子是
A. 胃酸、胃蛋白酶 B. 胰酶
C. 胆汁 D. 精神、心理因素
E. 食物的理化刺激
19. 肝硬化最常见的并发症是
A. 门静脉血栓形成 B. 原发性肝癌
C. 肝性脑病 D. 上消化道大出血
E. 自发性腹膜炎
20. 下列选项中，不是 Crohn 病常见并发症的是
A. 瘘管 B. 穿孔
C. 肠梗阻 D. 大量便血
E. 癌变
21. 急性糜烂性胃炎的确诊应依据
A. X 线胃肠钡餐检查
B. 胃液分析
C. 上消化道出血的临床表现
D. 急诊胃镜检查
E. 腹部 B 超
22. 肝硬化腹水患者每日钠盐摄入量及进水量一般分别要控制在
A. 1.5~2g/d, 1000ml/d
B. 1.5~4g/d, 1000ml/d

做题随手记

- C. 1.5~2g/d, 600ml/d
D. 1.5~4g/d, 600ml/d
E. <4g/d, 1000ml/d
23. 继发性腹膜炎毒性强主要是因为感染菌为
A. 金黄色葡萄球菌 B. 溶血性链球菌
C. 大肠杆菌 D. 各种细菌混合
E. 绿脓杆菌
24. 胃大部切除术后发生残胃癌的最短时间是术后
A. 1年 B. 5年
C. 10年 D. 20年
E. 15年
25. 下列哪项不是早期食管癌的临床表现
A. 食管内异物感
B. 食物停滞感
C. 进行性吞咽困难
D. 进食时胸骨后不适或疼痛
E. 进食时胸骨后烧灼感
26. 下列关于急性梗阻性化脓性胆管炎说法错误的是
A. 发病急骤, 病情进展快
B. 可出现休克、神经中枢抑制
C. 脉搏增快, 血压迅速升高, 呈急性重病容
D. 剑突下及右上腹部有压痛或腹膜刺激征
E. 白细胞计数升高, 中性粒细胞比例升高
27. 胰腺癌时能直接观察十二指肠壁和壶腹有无癌肿浸润, 并可收集胰液做细胞学检查及壶腹部活检做病理检查的影像学检查是
A. CT B. B超
C. 内镜超声 D. ERCP
E. B超下经皮细针穿刺
28. 急性化脓性腹膜炎最主要的临床表现是
A. 恶心呕吐 B. 腹痛
C. 体温升高 D. 呼吸急促
E. 便血
29. 最多见的肛管直肠周围脓肿是
A. 肛门周围脓肿 B. 马蹄形脓肿
C. 括约肌间脓肿 D. 肛提肌上脓肿
E. 坐骨直肠窝脓肿
30. B型超声对哪种结石诊断准确率高
A. 胆囊结石 B. 胆总管结石
C. 肾结石 D. 肝内胆管结石
E. 胰腺结石
31. 关于结肠癌, 下列哪项是错误的
A. 结肠癌可伴有贫血和发热
B. 根据肿瘤形态, 可分为肿块型, 浸润型, 溃疡型
C. 左半结肠癌以全身症状为主
D. 结肠癌的血行转移, 多转移至肝
E. 结肠癌淋巴转移首先转移到结肠旁淋巴结
32. 下列有关齿状线解剖意义的描述中错误的是
A. 齿状线以上是黏膜, 以下是皮肤
B. 齿状线以上发生的痔是内痔, 以下的痔是外痔
C. 齿状线以上淋巴引流入髂外淋巴结, 以下入腹股沟淋巴结
D. 齿状线以上由直肠上、下动脉供血, 以下由肛管动脉供应
E. 齿状线以上受自主神经支配, 以下属阴部内神经支配
33. 左半结肠癌急性梗阻时, 下列措施中哪项不恰当
A. 注意纠正水电解质及酸碱失衡
B. 注意腹部情况, 预计病变严重程度, 早插胃管, 进行胃肠减压
C. 稍准备好便手术, 先作横结肠造口术, 二期再作左半结肠切除吻合术
D. 胃肠减压后, 待梗阻解除便作左半结肠切除术
E. 急诊作心电图, 血生化等检查, 应初步纠正酸中毒后手术
34. 左侧结肠癌合并急性肠梗阻时, 最合理的手术方法是
A. 腹腔镜手术
B. 左半结肠癌根治术
C. 横结肠癌根治术
D. 先行横结肠造口术, 以后二期再行根治性左半结肠切除术
E. 先行胃肠减压, 后期再做左半结肠癌根治术
35. 关于急性小肠扭转临床表现的描述, 错误

做题随手记

- 的是
- A. 多见于老年人
B. 多发生于饱餐后剧烈活动
C. 起病急骤，腹痛剧烈
D. 频繁呕吐
E. 可出现休克
36. 以下哪项提示急性胰腺炎预后不良
A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒
C. 低钾血症 D. 低钙血症
E. 低镁血症
37. 病变好发于直肠和乙状结肠的是
A. 肠结核 B. 肠梗阻
C. 克罗恩病 D. 结核性腹膜炎
E. 溃疡性结肠炎
38. 下列可协助诊断急性阑尾炎的体征中，哪项正确
A. 不同患者右下腹压痛点位置一致
B. 右下腹腹膜刺激征提示阑尾炎症已不是早期阶段
C. 腰大肌试验阳性提示阑尾位置较浅
D. 闭孔内肌试验阳性提示阑尾位置较深
E. 结肠充气试验阴性可排除阑尾炎诊断
39. 老年急性阑尾炎的临床特征是
A. 显著腹肌紧张
B. 常有寒战、高热
C. 腹痛、恶心明显
D. 右下腹压痛明显
E. 阑尾容易缺血、坏死
40. 细菌性肝脓肿，哪项是正确的
A. 起病急，体温可高达 39~40℃
B. 70%为血源性
C. 大部分病例，细菌沿门静脉入肝
D. 肝区部有剧烈的绞痛
E. 有左胸腔积液
41. 为了防治脂肪肝，要注意增加食物中的
A. 蛋白质 B. 粗纤维
C. 卵磷脂 D. 淀粉
E. 糖
42. 最能说明肝硬化患者存在门脉高压的表现是
A. 腹痛 B. 消化不良
C. 呕吐 D. 痔核形成
E. 食管静脉曲张
43. 下列哪项属于股疝的常见特点
A. 多见于中老年男性
B. 疝块较大
C. 疝块呈锥形隆起
D. 咳嗽冲击感明显
E. 容易嵌顿、容易绞窄
44. 下列哪项符合继发性腹膜炎腹痛特点
A. 持续性剧痛
B. 间断疼痛
C. 疼痛固定在原发病部位
D. 变换体位可缓解腹痛
E. 体温升高发生在腹痛之前
45. 下列哪项不属于肝硬化患者肝功能减退的临床表现
A. 齿龈出血 B. 脾大
C. 黄疸 D. 浮肿
E. 肝掌
46. 血清壁细胞抗体阳性多见于
A. 慢性萎缩性胃窦胃炎
B. 慢性萎缩性胃体胃炎
C. 胃溃疡
D. 胃癌
E. 急性糜烂性胃炎
47. 关于 A 型胃炎，下列哪项是恰当的
A. 大多数由幽门螺杆菌感染引起
B. 较常见
C. 病变主要累及胃体和胃底
D. 发病和遗传因素无关
E. 不易导致贫血
48. 渗出性结核性腹膜炎最佳的强化治疗方案是
A. 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素
B. 异烟肼、利福平
C. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸、糖皮质激素
D. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸加手术腹腔引流
E. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸
49. 发生哪一项，提示重症急性胰腺炎

做题随手记

- A. 消化道出血 B. 假性囊肿
C. 严重胆道感染 D. 持久高血糖
E. C-反应蛋白升高
50. 诊断幽门梗阻最有价值的体征是
A. 振水音阳性 B. 肠鸣音亢进
C. 上腹部膨隆 D. 明显脱水
E. 上腹部固定压痛
51. 脂肪性肝病治疗的首要目标是
A. 逆转肝细胞脂肪变, 减少胆囊炎和胆结石的发生
B. 纠正代谢紊乱, 防治 2 型糖尿病和心血管事件
C. 防治 NASH, 阻止肝纤维化进展
D. 减少肝硬化的发生
E. 保肝抗炎药物治疗
52. 根除幽门螺杆菌治疗后, 不宜选用的复查方法是
A. ^{13}C 或 ^{14}C 尿素呼气试验
B. 血清幽门螺杆菌抗体检查
C. 组织学检查
D. 快速尿素酶试验
E. 幽门螺杆菌培养
53. 右下腹麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张是急性阑尾炎的典型体征, 其发生的主要机制是
A. 炎症致盲肠痉挛 B. 内脏神经反射
C. 炎症致阑尾痉挛 D. 阑尾腔压力增高
E. 炎症刺激壁层腹膜
54. 肝肾综合征最重要的临床表现是
A. 黄疸加深 B. 腹水加重
C. 少尿、无尿 D. 意识障碍
E. 出现恶心、呕吐
55. 关于十二指肠溃疡的治疗, 哪项是主要治疗措施
A. 少食多餐
B. 休息
C. 抑制胃酸和根除 Hp
D. 早期手术
E. 中枢镇痛
56. 胆总管的血液供应主要来自
A. 肝固有动脉 B. 胆囊动脉
C. 胃十二指肠动脉 D. 肝右动脉
E. 肝左动脉
57. 对鉴别上、下消化道出血有帮助的是
A. 大便潜血阳性 B. 血尿素氮升高
C. 血肌酐升高 D. 血色素下降
E. 血氨升高
58. 门静脉高压症主要临床表现是
A. 男性乳房发育 B. 肝掌
C. 肝病面容 D. 腹水
E. 蜘蛛痣
59. 治疗肝硬化腹水时提高血浆胶体渗透压的方法是静脉输液
A. 高渗葡萄糖 B. 等渗葡萄糖
C. 白蛋白 D. 生理盐水
E. 复方氨基酸
60. 目前应用最多的直肠癌根治术是
A. 局部切除术 B. Miles 手术
C. Dixon 手术 D. Hartmann 手术
E. 毕 II 式手术
61. 慢性胃炎的发病机制中, 与幽门螺杆菌感染无关的因素是
A. 产生胃壁细胞抗体
B. 在胃黏液上具有 Hp 靶位
C. 细胞毒素作用
D. 免疫反应
E. 产生多种酶及代谢产物
62. 关于轻症急性胰腺炎的治疗哪项不合理
A. 限制液体入量 B. 禁食、胃肠减压
C. 抑酸 D. 喹诺酮抗感染
E. 维持酸碱平衡
63. 晚期肝硬化最严重的并发症是
A. 肝肾综合征 B. 肝性脑病
C. 上消化道出血 D. 原发性肝癌
E. 电解质紊乱
64. 鉴别腹股沟斜疝和直疝错误的叙述是
A. 斜疝呈椭圆或梨形
B. 直疝呈半球形, 基底较宽
C. 斜疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
D. 直疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
E. 直疝常见老年人

做题随手记

65. 急性化脓性腹膜炎病人术后, 采取半卧位的目的, 哪项是错误的
- 减少毒素吸收, 防止感染性休克发生
 - 增加肺活量, 减少肺部并发症
 - 渗出物流至盆腔, 吸收快, 避免形成盆腔脓肿
 - 腹肌松弛, 减少切口疼痛
 - 减少膈下脓肿发生的机会
66. 下列慢性胃炎的病理改变, 属于癌前病变的是
- 黏膜重度萎缩, 腺体减少
 - 假幽门腺化生
 - 肠上皮化生
 - 重度不典型增生
 - 淋巴滤泡增生
67. 消化性溃疡慢性穿孔最常见的部位是
- 胃大弯
 - 胃小弯
 - 幽门管
 - 十二指肠后壁
 - 胃角
68. 胆总管结石梗阻后最典型的临床表现是
- Whipple 三联征
 - Charcot 三联征
 - Grey-Turner 征
 - Murphy 征阳性
 - Cullen 征
69. 胃大部切除术后 24 小时以内的胃出血, 最常见的原因是
- 凝血障碍
 - 吻合口张力过高
 - 术中止血不确切
 - 吻合口感染
 - 吻合口黏膜脱落坏死
70. 发生应激性溃疡最常见的部位是
- 十二指肠
 - 空肠
 - 口腔
 - 幽门管
 - 胃
71. 重度萎缩性胃体胃炎患者表现为
- 胃酸明显减少
 - 胃酸明显增高
 - 胃酸轻度增高
 - 胃酸轻度减少
 - 胃酸正常或减少
72. 腹部损伤时作诊断性腹腔穿刺, 抽出不凝固血液, 最可能的诊断为
- 空腔脏器破裂
 - 误穿入腹腔血管
 - 前腹壁血肿
 - 实质性器官破裂
 - 后腹膜间隙血肿
73. 下列关于腹股沟疝的叙述, 错误的是
- 滑疝多见于右侧
 - 嵌顿性疝多发生在股疝
 - 直疝的疝内容物多为小肠和大网膜
 - 难复性疝的主要特点是疝块不能完全还纳
 - 绞窄性痛疼痛减轻, 但肿块仍在, 说明病情好转
74. 下列哪项应高度怀疑胃溃疡癌变
- 并发上消化道出血
 - 血清胃泌素下降
 - 血清抗壁细胞抗体阳性
 - 五肽胃泌素试验显示胃酸缺乏
 - X 线钡餐显示多发性溃疡
75. 关于胃溃疡, 下列说法错误的是
- 胃溃疡主要是因为防御、修复因素减弱所致
 - 胃溃疡多为空腹疼痛, 进食后缓解
 - 胃溃疡主要发生在胃角和胃窦小弯侧
 - 胃溃疡边缘光整, 底部洁净, 有肉芽组织构成, 表面覆盖有灰色纤维渗出物
 - 胃溃疡病人存在胃运动障碍, 表现为胃排空延迟和十二指肠胃反流
76. 急性阑尾炎可发生的并发症不包括下列哪项
- 脓毒症
 - 腹腔内出血
 - 内瘘形成
 - 外瘘形成
 - 门静脉炎
77. 阑尾的神经由交感神经纤维经腹腔丛和以下哪个神经传入
- 内脏大神经
 - 内脏小神经
 - 第 10 胸神经
 - 第 12 胸神经
 - 坐骨神经
78. 胃十二指肠溃疡外科手术的绝对适应证是
- 溃疡病穿孔
 - 应激性溃疡
 - 瘢痕性幽门梗阻
 - 胃后壁溃疡
 - 溃疡病出血
79. 恶性肿瘤种植性转移到盆腔, 最多见的是
- 胃癌
 - 肝癌

做题随手记

- C. 乳腺癌
D. 胆管癌
E. 食管癌
80. 肠结核的治疗中, 下列哪一项不正确
- A. 为使病人早日康复, 防止耐药性的产生, 目前多采用长程抗结核治疗方案
B. 一般用异烟肼与利福平二种杀菌药联合
C. 开始治疗 1~2 周即有症状改善
D. 腹痛可用抗胆碱能药物
E. 伴完全肠梗阻者应手术治疗
81. 关于急性胃炎的描述下列哪项不正确
- A. 急性胃炎是胃壁全层性炎症
B. 幽门螺杆菌感染也可引起
C. 腐蚀性胃炎的急性期不宜作胃镜检查
D. Curling 溃疡与烧伤有关
E. Cushing 溃疡与中枢神经病变有关
82. 下列哪项不是胃食管反流病并发症
- A. 胃癌
B. 食管狭窄
C. 食管腺癌
D. 消化道出血
E. Barrett 食管
83. 下列哪种物质可使下食管括约肌张力增高
- A. 盐酸
B. 内因子
C. 胃蛋白酶
D. 促胃液素
E. 钙通道拮抗剂
84. 肠梗阻非手术治疗中, 下列观察项目哪项最主要
- A. 腹膜刺激征
B. 脉搏增快
C. 腹胀较前明显
D. 肠鸣音较前减弱
E. 腹痛加重
85. 脂肪性肝病需要作出的生活方式改变是
- A. 调节能量摄入, 合理减重
B. 减少总脂肪摄入
C. 用不饱和脂肪酸代替饱和脂肪酸
D. 脂肪摄入量低于总能量的 30%
E. 以上都是
86. 关于小儿急性阑尾炎, 错误的是
- A. 病情发展快且重
B. 右下腹体征明显
C. 穿孔率达 30%
D. 并发症及死亡率较高
E. 宜早期手术
87. 急性胰腺炎外科手术适应, 除外哪项
- A. 血清脂肪酶升高
B. 重症急性胰腺炎并发假性囊肿或脓肿
C. 严重感染药物不能控制
D. 胆总管结石梗阻
E. 麻痹性肠梗阻合并肠坏死
88. 下列哪项不符合腹股沟嵌顿疝手法复位的特点
- A. 块大、腹壁缺损较大、疝环较松者可试行手法复位
B. 年老体弱或伴其他严重疾病的嵌顿疝病人, 估计肠管无绞窄者, 可试行手法复位
C. 嵌顿时间在 3~4 小时以内, 尚无腹膜刺激征者可试行手法复位
D. 手法复位后, 仍需继续观察腹部情况
E. 手法复位方法简便, 避免了手术之苦, 应该大力推荐
89. 渗出性结核性腹膜炎的最佳的强化治疗方案是
- A. 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素
B. 异烟肼、利福平
C. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸、糖皮质激素
D. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸加手术腹腔引流
E. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸
90. 下述关于结核性腹膜炎全身症状的叙述, 错误的是
- A. 主要症状是发热和盗汗
B. 热型以低热和中等热最多
C. 约 1/3 患者呈弛张热
D. 少数可呈稽留热
E. 毒血症状明显者见于粘连型
91. 结核性腹膜炎最常见的并发症是
- A. 急性穿孔
B. 腹腔脓肿
C. 肠痿
D. 肠梗阻
E. 营养不良
92. 肝硬化消化道出血, 伴高血压冠心病患者, 下列止血措施中最不恰当的是
- A. 三腔二囊管压迫

做题随手记

- B. 去甲肾上腺素胃管滴注
C. 垂体后叶素静脉滴注
D. 维生素 K₁ 静脉滴注
E. 冰生理盐水洗胃
93. 由于内痔的动脉供应, 其好发部位多在截石位的
A. 3、5、10点 B. 1、5、9点
C. 3、7、9点 D. 1、6、11点
E. 3、7、11点
94. 关于肠易激综合征临床表现描述错误的是
A. 可有腹泻 B. 腹痛以上腹多见
C. 极少睡眠中痛醒 D. 可有排便不畅
E. 可伴有腹胀
95. 下列描述不符合肠易激综合征罗马Ⅲ诊断标准的是
A. 病程3个月, 无明显的腹痛
B. 可有排便费力
C. 症状可在排便后改善
D. 可有粪便性状异常
E. 每天排便可>3次
96. 适用于胰体尾部癌的手术是
A. 胰头十二指肠切除术
B. 保留幽门的胰头十二指肠切除术
C. 姑息性手术
D. 胰体尾切除术
E. 胰腺全部切除并淋巴结清扫
97. 关于急性胰腺炎时淀粉酶的说法下列错误的是
A. 重症胰腺炎的淀粉酶值可正常或低于正常
B. 部分急腹症的淀粉酶一般不超过正常值的2倍
C. 胆石症不会有血清淀粉酶的升高
D. 尿淀粉酶值受患者尿量的影响
E. 胰源性胸腔积液和腹水中的淀粉酶值亦明显升高
98. 我国急性胰腺炎的主要病因是
A. 胆道系统疾病
B. 慢性酒精中毒
C. 内分泌与代谢障碍
D. 胰管阻塞

E. 手术与创伤

99. 下列有关急性胰腺炎的各项检查中, 最早出现异常的是
A. 血清脂肪酶 B. 血清乳酸脱氢酶
C. 血清淀粉酶 D. 尿淀粉酶
E. 血清正铁血白蛋白

二 A2型题

1. 男, 58岁。左腹股沟区可复性包块7年。2天前感冒后出现咳嗽, 3小时前自觉包块进入阴囊, 不能还纳伴疼痛。疼痛呈持续性胀痛, 伴恶心、呕吐。查体: 体温 36.5℃, 心率 80次/分, 呼吸 18次/分, 血压 120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 左侧阴囊内可触及包块, 触痛明显, 包块透光试验阴性。最可能的诊断是
A. 阴囊急性蜂窝织炎
B. 腹股沟斜疝嵌顿
C. 睾丸恶性肿瘤并内出血
D. 睾丸鞘膜积液并感染
E. 腹股沟直疝嵌顿
2. 男, 70岁, 吞咽困难半个月。查体无明显阳性体征。上消化道钡餐造影示食管中段黏膜紊乱, 管壁僵硬, 管腔狭窄。该患者最可能的初步诊断是
A. 食管憩室 B. 食管平滑肌瘤
C. 食管炎 D. 贲门失弛缓症
E. 食管癌
3. 男, 45岁, 因高脂血症服用阿司匹林2个月, 1个月来反复出现上腹疼痛。查体: 腹软, 中上腹压痛。腹部B超未见异常。下列治疗药物中首选的是
A. 铝碳酸镁 B. 阿莫西林
C. 克拉霉素 D. 多潘立酮
E. 奥美拉唑
4. 女, 23岁。间断低热、腹痛5个月, 伴腹胀、盗汗, 体重下降3kg。查体: 体温 37.5℃, 心率 80次/分, 呼吸 18次/分, 血压 120/

做题随手记

- 80mmHg。巩膜无黄染，颈静脉无怒张。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。全腹有轻压痛，移动性浊音(+)。腹水：比重 1.020，蛋白定量 38g/L，白细胞 $520 \times 10^6/L$ ，单个核细胞 0.85。最可能的诊断是
- A. 原发性腹膜炎 B. 缩窄性心包炎
C. 肝硬化腹水 D. 结核性腹膜炎
E. 化脓性腹膜炎
5. 女，42岁。因胃溃疡穿孔行胃大部切除术后6天，发热，下腹痛3小时。最高体温38.2度，有里急后重感。查体：体温36.5℃，心率80次/分，呼吸18次/分，血压120/80mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，腹软，手术切口愈合良好，最简便又有诊断意义的检查是
- A. 直肠指检
B. 立位腹部X线平片
C. 腹腔诊断性穿刺
D. 腹部B超检查
E. 粪常规
6. 女，62岁。腹痛伴停止排气排便1天，无呕吐。既往便秘史10年。查体：体温36.5℃，心率80次/分，呼吸18次/分，血压135/80mmHg，心肺未见异常，腹部膨隆且不对称，以左下腹为著，有压痛，肠鸣音7次/分，移动性浊音阴性。直肠指检空虚，指套无染血。最可能的诊断是
- A. 结肠癌
B. 肠系膜血管栓塞
C. 乙状结肠扭转
D. 麻痹性肠梗阻
E. 直肠癌
7. 男，58岁。进食高蛋白食物后出现神志不清1天。大量饮酒25年，否认肝炎病史及家族史。查体：体温36.5度，心率80次/分，呼吸18次/分，血压120/80mmHg。面色晦暗，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，腹软，无压痛，扑翼样震颤(+)，该患者意识障碍最可能的原因是
- A. 肝性脑病 B. 酒精戒断反应
C. 慢性酒精中毒 D. 低血糖发作
E. 电解质紊乱
8. 男，73岁。间断左下腹疼痛半年，有时粪便中带有鲜血，肛门下坠感。体重下降5kg。查体：体温36.8℃，心率80次/分，呼吸18次/分。血压140/80mmHg，贫血貌，左下腹有压痛。实验室检查：血红蛋白85g/L，粪便隐血试验(+)。最可能的诊断是
- A. 结肠癌 B. 肠易激综合征
C. 肠结核 D. 痔
E. 炎症性肠病
9. 女，42岁。间断腹泻、脓血便5年，粪便病原体培养阴性，广谱抗生素治疗无效。结肠镜检查：乙状结肠、直肠黏膜广泛弥漫充血、水肿、散在点状糜烂。最可能的诊断是
- A. 阿米巴肠炎 B. 溃疡性结肠炎
C. 肠结核 D. 结肠癌
E. 细菌性痢疾
10. 男，36岁。急性化脓性阑尾炎5天，未行手术治疗。今日出现高热、寒战，右季肋区疼痛。查体：体温39.0℃，皮肤巩膜轻度黄染，肝区叩痛(+)。实验室检查：ALT，AST、总胆红素均轻度升高。腹部B超提示肝脏可见数个液性暗区。最可能的诊断是
- A. 肝转移癌
B. 肝包虫病
C. 肝囊肿继发感染
D. 细菌性肝脓肿
E. 阿米巴肝脓肿
11. 女，50岁。因腹痛入院。初步诊断考虑急性继发性腹膜炎，行内科治疗并观察病情变化，目前已经观察10小时。出现下述情况应考虑手术治疗，除了
- A. 呼吸性碱中毒
B. 腹腔积液增多
C. 出现休克
D. 腹痛进行性加重
E. 病因诊断不明
12. 男，25岁。因大面积烧伤住院治疗1天，上腹痛1天，4小时来排柏油便5次，量约300

做题随手记

- 克。查体：体温 37.5℃，心率 108 次，呼吸 18 次/分，血压 110/70mmHg。实验室检查：血红蛋白 82g/L，白细胞 $11 \times 10^9/L$ 。首先考虑的治疗措施是
- 输血
 - 静脉应用质子泵抑制剂
 - 静脉应用止血药
 - 口服胃黏膜保护剂
 - 静脉应用 H_2 受体拮抗剂
13. 男性，36 岁。1 天前饮酒后出现右上腹疼痛，向右侧肩背部放射，伴有恶心、呕吐、腹胀。查体：体温 38.5℃，心率 88 次/分，呼吸 20 次/分，血压 130/85mmHg，双肺呼吸音清晰，未闻及干湿啰音，心律齐，右上腹肌紧张，压痛(+)，墨菲征(+)。最有可能的诊断是
- 急性胃炎
 - 急性胰腺炎
 - 右肾结石
 - 急性胆囊炎
 - 十二指肠溃疡
14. 男性，36 岁。反复饥饿痛性上腹痛 4 年，加重 10 天。既往体健。查体：体温 36.4℃，心率 80 次/分，呼吸 18 次/分，血压 120/80mmHg，双肺呼吸音清晰，未闻及干湿啰音。心律齐，腹软，上腹部压痛，未触及包块，肝脾肋下未触及，最可能的诊断是
- 胃溃疡
 - 胃癌
 - 右肾结石
 - 慢性胆囊炎
 - 十二指肠溃疡
15. 男，44 岁。腹胀、乏力半年，加重伴尿量减少 3 天。尿量 100~200ml/d。查体：心率 80 次/分，呼吸 19 次/分，慢性病容，口唇无发绀，可见蜘蛛痣，巩膜黄染。腹膨隆，无压痛及反跳痛，肝肋下未触及。脾平脐，移动性浊音(+)、下肢凹陷性水肿，实验室检查：血白细胞 $2.8 \times 10^9/L$ ，NO.62，HbsAg(+)，ALT 52U/L，AST 86U/L，Tbil 46 μ mol/L，BUN18.6mmol/L，SCr 258.3 μ mol/L。最有可能的诊断是
- 自发性腹膜炎
 - 肝肾综合征
 - 肝肺综合征
 - 肝癌
 - 肝性脑病
16. 男，25 岁，反复发作上腹部疼痛 6 个月。胃镜检查见十二指肠球部溃疡，该患者生理变化中不包括
- 迷走神经功能亢进
 - 胃酸分泌增加
 - 促胃液素水平升高
 - 胃蛋白酶分泌增加
 - 内因子分泌减少
17. 女，32 岁。进食油腻食物后剧烈呕吐胃内容物多次，末次吐鲜血约 200ml。既往体健，查体：体温 36.5℃，心率 110 次/分，呼吸 22 次/分，血压 90/60mmHg。皮肤黏膜未见出血点，浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音清晰，未闻及干、湿啰音，心律齐，腹软，无压痛。最有可能的出血原因是
- 急性胃黏膜病变
 - 胃血管异常
 - 胃癌
 - 食管贲门黏膜撕裂综合征
 - 消化性溃疡
18. 男性，36 岁。腹痛、恶心、呕吐。16 小时前右下腹部有局限性压痛，4 小时前疼痛范围扩大。查体：体温 38.9℃，心率 92 次/分。心肺未见明显异常，腹部稍膨隆，全腹肌紧张，压痛和反跳痛(+)，右下腹为重，肠鸣音消失。血常规：血红蛋白 120g/L，白细胞 $18.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.91，血小板 $180 \times 10^9/L$ 。病情加重的主要解剖学原因是
- 阑尾与盲肠相通的开口狭窄易梗阻
 - 阑尾系膜短而阑尾本身长，易坏死
 - 阑尾壁内淋巴组织丰富容易化脓
 - 阑尾运动弱而慢，阻塞的粪便残渣不易排出
 - 阑尾动脉是终末血管，易痉挛缺血
19. 女，62 岁。右侧股疝嵌顿 11 小时。查体：体温 37.1℃，心率 90 次/分，呼吸 18 次/分，血压 130/80mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，腹胀明显，右下腹局限性压痛(+)，有肌紧张，肠鸣音亢进。右侧腹股沟韧带下方隆起肿块，有压痛。手术时发现

做题随手记

- 小肠坏死，行坏死小肠切除后。下一步正确的手术措施是
- A. McVay 法疝修补术
B. Bassini 法疝修补
C. 单纯疝囊高位结扎术
D. Halsted 法疝修补术
E. Ferguson 疝修补术
20. 女，24 岁，肛缘处潮湿瘙痒，有黏液流出 3 个月。查体：截石位 8 点处可见一小孔，挤压时有脓液排出。该患者最可能的诊断是
- A. 肛瘘
B. 肛裂
C. 外痔
D. 内痔脱出
E. 混合痔
21. 女，62 岁。腹胀、纳差、肝区隐痛 5 个月。查体 T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP130/80mmHg。皮肤巩膜黄染可见两枚蜘蛛痒。双肺呼吸音清未闻及干湿性啰音，心律齐，腹膨隆，肝肋下 3cm，剑突下 5cm，移动性浊音(+)。最可能的临床诊断是
- A. 肝脓肿
B. 转移性肝癌
C. 淋巴瘤
D. 肝结核
E. 原发性肝癌
22. 男 36 岁，腹腔镜胆囊切除术后 1 周，腹胀伴皮肤黄染，粪便呈陶土样 1 天。查体：T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP120/80mmHg，皮肤巩膜黄染，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心律齐，右上腹轻度压痛，无反跳痛，移动性音(-)。最可能的原因是
- A. 胃损伤
B. 胆囊管残端漏
C. 胆总管损伤
D. 结肠肝曲损伤
E. 十二指肠损伤
23. 男性，42 岁，餐后出现突发中上腹剧烈疼痛，疼痛为持续性进行性加重，呈束带状，持续性，至急诊。需做鉴别诊断检查是
- A. 血淀粉酶
B. 立位腹部平片
C. B 超
D. 心电图
E. 以上都是
24. 男，38 岁，肛周皮下有一深部脓肿，一端向体表穿破，另一端向直肠穿孔，不断有脓、粪液流出，此管道应称为
- A. 空洞
B. 溃疡
C. 蜂窝织炎
D. 窦道
E. 瘘管
25. 女，40 岁，大便次数增多，带血 2 个月，伴便意频繁，大便变形，变细，大便隐血(++)，直肠指诊：距肛门 8cm 触到一肿物约 3cm×3cm 大小，尚可活动，指套上有血迹，病理诊断直肠腺癌，对其最主要的治疗方法为
- A. 放疗
B. 化疗
C. 根治性手术
D. 中药治疗
E. 激光烧灼
26. 女，35 岁。腹胀、便秘、乏力 6 个月。1 周来症状加重伴呕吐。查体：T 37.6℃，右腹可触及 5cm×3cm 大小包块，质中等，边界不清，轻触痛。胸片示右侧胸膜肥厚，右上肺钙化灶。首先考虑的临床诊断是
- A. 右侧卵巢肿物
B. 肠结核
C. 结肠癌
D. 克罗恩病
E. 阑尾周围脓肿
27. 女，30 岁。反复腹痛、腹泻 10 年。排便后腹痛可缓解，无发热、消瘦。多次查粪常规示软便或黏液便，镜检(-)，隐血(-)。最可能的诊断是
- A. 克罗恩病
B. 肠结核
C. 溃疡性结肠炎
D. 慢性细菌性痢疾
E. 肠易激综合征
28. 女性，32 岁，4 个月腹胀，低热，盗汗。查体：全腹压痛，右上腹可触及不易推动肿块，边不整。近 3 天频繁呕吐，考虑诊断可能是
- A. 结核性腹膜炎粘连型
B. 结核性腹膜炎并肠梗阻
C. 结核性腹膜炎并胃炎
D. 结核性腹膜炎并神经性呕吐
E. 结核性腹膜炎并消化性溃疡
29. 男，54 岁。呕血、黑便 2 天，嗜睡、行为改变 1 天。实验室检查：ALT 35U/L，AST 72U/L，ALB 27.3g/L。腹部 B 超示脾大。最可能的诊断是

做题随手记

- A. 胃癌 B. 肝硬化失代偿期
C. 急性胃黏膜病变 D. 消化性溃疡
E. 食管贲门黏膜撕裂综合征
30. 女, 45岁。1天前进高脂餐后出现右上腹剧烈绞痛, 阵发性加剧, 并向右肩背部放射, 伴恶心、呕吐、发热, 体温 38℃。该患者最可能的诊断是
A. 肝脓肿 B. 胃溃疡穿孔
C. 急性肺栓塞 D. 急性胆囊炎
E. 急性胰腺炎
31. 患者男性, 43岁。间断上腹部胀满感 5年, 进食后明显, 伴有上腹部疼痛和反酸。胃镜检查提示胃窦部黏膜红白相间, 黏膜胆汁黄染, 黏液池内有胆汁混合, 幽门呈开放状态, 可见胆汁反流, 治疗药物最适宜使用
A. 斯达舒 B. 山莨菪碱
C. 庆大霉素 D. 吗丁啉+法莫替丁
E. 甲氧咪胍
32. 男性, 59岁。散步时突然自觉腹部不适、恶心、头晕、出虚汗、心率加快、心慌, 急诊。查体: 心率 106次/分, 血压 90/60mmHg, 心律齐, 面色苍白, 腹部广泛压痛, 尤以右侧腹明显, 轻度肌紧张, 既往有肝炎后肝硬化史。化验 AFP 800μg/L。最可能的诊断是
A. 肝癌破裂 B. 脾破裂
C. 溃疡病穿孔 D. 急性坏死性胰腺炎
E. 肝炎发作
33. 男性, 58岁, 因原发性肝癌行左半肝切除术后, 定期随访时下列哪项检查可预测肿瘤复发
A. 肝脏 B超 B. 肝脏 CT
C. 定期复查 AFP D. 选择性肝动脉造影
E. MRI
34. 男性, 32岁, 阑尾切除术后 1天出现烦躁、剧烈腹痛, 心率 108次/分, 血压 90/60mmHg, 腹胀, 全腹压痛, 肠鸣音弱, 为除外腹腔内出血首要的检查是
A. B超 B. CT
C. MRI D. 直肠指诊
E. 腹腔穿刺
35. 男, 32岁, 上腹部被挤压 2小时, 上腹部痛、恶心、腹胀, 为排除胰腺损伤, 最有价值的检查为
A. 腹腔动脉造影
B. 诊断性腹腔灌洗术
C. B超
D. 腹部 X线片
E. 血尿淀粉酶
36. 男, 35岁, 3周前上腹部被自行车把撞伤。近 5天来上腹持续性胀痛, 餐后加重, 伴恶心、呕吐; 查体: 体温 38.5℃, 上腹偏左明显膨隆, 可扪及边界不清的痛性肿块, 不活动。首选的检查应当是
A. X线胸腹部透视
B. 胃肠道钡餐透视
C. 纤维十二指肠镜检查
D. 腹部 B超检查
E. 腹腔动脉造影
37. 男, 25岁, 腹部被倒墙压伤, 中腹部剧痛伴呕吐 3小时。查体: BP 120/86mmHg, T 38℃, 腹胀, 腹部肌紧张, 腹部压痛、反跳痛阳性, 肠鸣音消失。最可能的诊断是
A. 腹壁挫伤 B. 腹膜后血肿
C. 肝破裂 I度 D. 小肠破裂
E. 右肾挫伤
38. 男, 30岁, 由 5m 高处跌下 2小时, 腹痛, 腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音弱; BP 104/70mmHg, P 120次/分, Hb 80g/L; X线检查: 右侧第 9、10肋骨骨折, 右侧膈肌升高。最可能的诊断是
A. 肝破裂 B. 胃破裂
C. 脾破裂 D. 横结肠破裂
E. 胰腺破裂
39. 女, 30岁。被汽车撞伤左季肋部 1小时来诊。查体: T37.5℃, 心率 110次/分, BP 90/70mmHg。腹平坦, 左上腹肌略紧张, 局部压痛, 全腹有反跳痛, 有移动性浊音(+), 听诊未闻肠鸣音。确诊检查是
A. 平卧位 X线腹部平片
B. 胸部 X线检查

做题随手记

- C. 腹部 CT
D. 上消化道钡餐透视
E. 诊断性腹腔穿刺
40. 男, 74 岁, 左腹股沟可复性包块 10 年, 不能回纳 8 小时, 以左腹股沟斜疝嵌顿急诊手术, 术中见部分嵌顿小肠肠管色暗, 无蠕动, 行部分肠切除, 此时不宜行疝修补术的理由是
- A. 术前准备不充分
B. 术后易出现腹胀
C. 患者年龄大, 伤口愈合能力低
D. 术后易继发手术野感染
E. 术后易发生上呼吸道感染
41. 男性, 68 岁。12 小时前因咳嗽而突然右下腹剧烈疼痛, 右侧阴囊肿胀亦疼痛。右侧腹股沟区呈梨形隆起, 不能回纳。行急诊手术治疗, 术中发现嵌顿的肠管已坏死, 应采取的手术方法是坏死肠段切除和
- A. 疝囊高位结扎术
B. 无张力疝修补术
C. Bassini 修补术
D. Halsted 修补术
E. Ferguson 修补术
42. 男性, 30 岁, 剧咳后出现腹股沟区一突出的肿块, 完全回纳后, 用手指紧压腹股沟管深环, 让病人起立并咳嗽, 斜疝肿块并不出现。该患者最可能的诊断为
- A. 易复性斜疝 B. 嵌顿疝
C. 绞窄性疝 D. 难复性疝
E. 急性腹膜炎
43. 男, 70 岁。右腹股沟区肿块 3 年, 平卧消失。查体: 右耻骨结节外上方有一半球形肿块, 未进入阴囊, 可用手回纳, 压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是
- A. 股疝 B. 腹股沟斜疝
C. 腹股沟直疝 D. 精索鞘膜积液
E. 交通性鞘膜积液
44. 男性, 60 岁。腹股沟三角突出半球形包块, 易还纳, 未进入阴囊, 不透光, 主要考虑为
- A. 鞘膜积液 B. 阴囊积液
C. 股疝 D. 直疝
E. 斜疝
45. 女, 37 岁, 腹胀、腹泻与便秘交替半年。体检: 腹壁柔韧感, 轻度压痛, 肝脾未触及, 腹水征(+). 腹水检验: 草黄色, 比重 1.020, 蛋白 35g/L。白细胞 $0.7 \times 10^9/L$, 中性 0.30, 淋巴 0.70, 红细胞 $0.3 \times 10^9/L$, 本例最可能诊断是
- A. 结核性腹膜炎 B. 原发性腹膜炎
C. 癌性腹膜炎 D. 巨大卵巢囊肿
E. 肝静脉阻塞综合征
46. 女性, 31 岁, 低热, 乏力伴腹胀 3 个月, 查体: 腹部膨隆, 腹壁柔韧感, 有压痛和轻度反跳痛, 移动性浊音阳性, 腹水为渗出液, 为明确诊断, 最有价值的检查是
- A. 腹部 B 超 B. 胃肠道钡剂检查
C. 血沉 D. 腹水细菌培养
E. 腹腔镜检查
47. 男, 20 岁, 低热、腹痛、腹泻伴腹胀 3 个月。查体: 腹壁揉面感, 腹部移动性浊音阳性。腹水为草黄色渗出液。为明确诊断, 下列哪项检查最有价值
- A. 血培养
B. 结核菌素试验
C. 腹腔镜检查并活检
D. B 超
E. 血沉
48. 女, 23 岁, 因低热, 腹痛诊断为结核性腹膜炎。近日来呕吐, 腹胀, 未解大便。最可能的并发症是
- A. 肠梗阻 B. 肠穿孔
C. 中毒性肠麻痹 D. 肠出血
E. 肠坏死
49. 腹膜炎病人, 经扩容治疗后血压 80/60mmHg, 中心静脉压 5cmH₂O, 尿量 20ml/h, 应考虑
- A. 急性肾功能衰竭 B. 感染性休克
C. 低血容量性休克 D. 急性心力衰竭
E. 感染未控制
50. 女性, 34 岁, 溃疡病穿孔行修补术后 10 天, 体温 39℃, 下腹痛明显, 拒按; 黏液便 4~6

做题随手记

- 次/天，伴有里急后重及尿痛、排尿困难，直肠指诊前壁有肿物。此病人应考虑是
- A. 急性附件炎 B. 急性子宫内膜炎
C. 急性膀胱炎 D. 盆腔脓肿
E. 直肠癌
51. 男，35岁，诊断为肝炎后肝硬化失代偿期，一周来出现轻微腹痛，腹水增多。查体：T 38.5℃，腹水常规，黄色，比重为 1.016，蛋白 25g/L，白细胞 $500 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞 0.85，最可能的并发症是
- A. 原发性肝癌 B. 脾栓塞
C. 自发性腹膜炎 D. 门静脉血栓形成
E. 结核性腹膜炎
52. 男，41岁，肝炎后肝硬化病史 5 年，出现腹水 1 年，1 周来低热伴轻度腹痛，腹水明显增多。腹水检查：淡黄色，比重 1.017，蛋白 26g/L，白细胞数 $500 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞 0.80。最可能的诊断是肝硬化合并
- A. 结核性腹膜炎 B. 自发性腹膜炎
C. 原发性肝癌 D. 门静脉血栓形成
E. 肝肾综合征
53. 男性，48岁。上腹不规则隐痛 2 个月，1 小时前呕血 1000ml。冠心病史 10 年。近期有心绞痛发作。不宜应用的药物是
- A. 血管加压素 B. 生长抑素
C. 埃索美拉唑 D. 奥美拉唑
E. 法莫替丁
54. 男性，58岁，诊断为急性胆囊炎。经非手术治疗已 5 天，目前仍疼痛加剧，伴高热，右上腹广泛压痛，反跳痛，腹肌紧张，肠音减弱，体温 39℃，白细胞计数 $18 \times 10^9/L$ ，应做
- A. 胆囊切除术
B. 胆囊切除及胆总管引流
C. 胆囊造瘘及腹腔引流术
D. 胆囊切除及腹腔引流术
E. 胆总管十二指肠引流术
55. 女性，60岁，因突发性右上腹痛 8 小时入院。查体：体温 38.5℃，心率 90 次/分，血压 110/80mmHg，右上腹压痛，肌紧张、反跳痛，WBC $16 \times 10^9/L$ ，B 超提示胆囊增大壁厚，内有结石多个，胆总管直径 1.2cm，拟行急诊手术。此患者应选择的手术方式是
- A. 胆囊切除术
B. 胆囊切除加胆总管探查术
C. 胆囊造瘘术
D. 胆肠吻合术
E. PTCD
56. 男性，60岁，患有直肠肛管周围脓肿，做直肠肛管周围脓肿切开引流术后，最有可能出现
- A. 痔 B. 大便失禁
C. 肛瘘 D. 肛门狭窄
E. 肛裂
57. 男性，52岁。既往慢性胃炎病史 20 余年，近日检测幽门螺杆菌阳性，胃镜检查提示明显胆汁反流。最佳治疗方案应选择
- A. 阿莫西林
B. 铝碳酸镁
C. 伊托必利+幽门螺杆菌根治
D. 瑞巴派特
E. 奥美拉唑+阿莫西林
58. 男性，50岁，因腹痛、消瘦来诊，行胃镜检查示胃溃疡。关于患者腹痛以下说法错误的是
- A. 为压榨性疼痛
B. 位于上腹部正中
C. 服用抑酸药可以缓解
D. 劳累、烟酒可以诱发
E. 疼痛多于餐后约 1 小时发生，经 1~2 小时缓解
59. 男性，60岁，今晨突然大量鲜红色血便，既往乙肝病史。为了明确是上消化道出血还是下消化道出血首选
- A. CT B. B 超
C. MRI D. 胃镜
E. PET
60. 男，70岁。健康体检时 B 超发现胆囊内有一直径约 0.6cm 结石，随体位活动，口服胆囊造影胆囊显影，充盈缺损不明显。既往无胃病史，无胆囊炎发作史，无心脏病、糖尿病

做题随手记

- 史。目前的治疗建议是
- A. 观察、随诊 B. 溶石疗法
C. 中药排石 D. 择期行胆囊切除术
E. 择期行腹腔镜胆囊切除术
61. 男, 65岁, 上腹部无规律性隐痛2个月, 因饮酒后呕咖啡样物150ml, 柏油便300ml来诊, 无肝病史。查体: 血压90/60mmHg, 脉搏100次/分, 血红蛋白90g/L, 上腹部轻度压痛, 肝脾肋下未触及, 其止血措施最好选择
- A. 维生素K₁静脉滴注
B. 奥美拉唑静脉注射
C. 氨基己酸静脉滴注
D. 三腔二囊管压迫
E. 垂体后叶素静脉滴注
62. 男, 25岁, 反复上腹痛、进食后缓解、反酸5年。X线钡餐检查示十二指肠球部龛影, 周围黏膜呈放射状向龛影纠集, 龛影壁光滑。可诊断为
- A. 幽门管溃疡
B. 十二指肠球部溃疡
C. 十二指肠球后溃疡
D. 十二指肠炎
E. 胃黏膜脱垂
63. 女, 45岁, 胆囊结石10年, 曾胆绞痛发作5次, B超示胆囊结石7枚, 直径1~3cm, 首选的治疗方法是
- A. 胆囊切除
B. 溶石治疗
C. 体外震波碎石治疗
D. 抗感染治疗
E. 排石治疗
64. 男性, 38岁。乙肝后肝硬化10余年, 3个月来明显消瘦, 乏力, 经常出现鼻出血, 腹胀进行性加重, 尿少, 考虑最可能的诊断是
- A. 失血性休克 B. DIC
C. 鼻咽癌 D. 肝癌
E. 凝血功能异常
65. 男性, 28岁。间断性上腹痛5年, 近日腹痛加重, 伴有腹胀及呕吐, 呕吐物量多, 为隔夜食物。抑酸剂治疗无效。体检上腹部有振水音, 转动体位症状不能缓解。该患者最可能的诊断是
- A. 食管癌
B. 消化性溃疡合并幽门梗阻
C. 慢性胃炎
D. 胃癌
E. 胃溃疡
66. 女性, 60岁。半年来上腹部不适, 排稀便, 消瘦明显, 胃镜可见红斑、黏膜粗糙不平、出血点, 则可能的诊断是
- A. 胃癌
B. 慢性萎缩性胃炎
C. 十二指肠球部溃疡
D. 浅表性胃炎
E. 胃溃疡
67. 男性, 32岁, 患有急性阑尾炎并发阑尾周围脓肿, 下列说法不正确的是
- A. 必须手术治疗
B. 给予抗生素
C. 让患者充分休息
D. 补充水分及电解质
E. 可切开引流
68. 男, 42岁, 间断腹痛、腹泻8个月, 无消瘦、乏力、盗汗, 诊断为肠易激综合征, 下列药物其不宜采用的是
- A. 洛哌丁胺 B. 地芬诺酯
C. 聚乙二醇 D. 头孢噻酮
E. 匹维溴铵
69. 男, 43岁。肝炎肝硬化病史15年, 反复少尿、腹胀1年, 1周来腹痛伴低热。腹水常规, 比重1.017, 蛋白28g/L, 细胞总数 $920 \times 10^6/L$, 白细胞 $800 \times 10^6/L$, 多形核细胞0.80。最可能的诊断是
- A. 门静脉血栓形成 B. 结核性腹膜炎
C. 原发性肝癌 D. 自发性腹膜炎
E. 肝肾综合征
70. 男, 42岁。寒战、发热5天, 右季肋部痛2天, 疼痛于深呼吸及咳嗽时加重。查体: 巩膜轻度黄染, 肝肋下2cm, Murphy征阴性,

做题随手记

- 肝区叩击痛阳性。胸部 X 线片：右侧膈肌抬高，肋脊角消失。肝脏 B 超：肝右叶可见 6cm×5cm 低回声区，边界欠清晰，中心有液性暗区。首先考虑的诊断是
- A. 肺炎 B. 肝脓肿
C. 肝结核 D. 结核性胸膜炎
E. 肝癌
71. 男性，16 岁，体育课后由于右下腹转移性疼痛伴有发热来诊，该患者最可能的是
- A. 急性胆囊炎 B. 急性胃炎
C. 急性阑尾炎 D. 急性腹膜炎
E. 急性胰腺炎
72. 男，34 岁。阑尾切除术后 1 天出现烦躁、剧烈腹痛。P 112 次/分，BP90/60mmHg，腹胀，全腹压痛，肠鸣音弱，为除外腹腔内出血首要的检查是
- A. B 超 B. CT
C. MRI D. 腹腔穿刺
E. 立位腹平片
73. 患者男，25 岁，2 天前无明显诱因出现腹痛，伴有恶心呕吐，肠鸣音亢进，排便排气停止，患者来院就诊，应首先考虑为
- A. 急性胰腺炎 B. 急性肠梗阻
C. 急性胆囊炎 D. 急性阑尾炎
E. 胃溃疡
74. 女，50 岁，因便血 2 月来诊；直肠镜检查发现距肛缘 4cm 直肠前壁有 2cm×2cm 肿块，取活检病理检查为直肠乳头状腺癌，最佳的手术方式是
- A. 经肛局部切除术
B. 骶后径路局部切除术
C. 经腹会阴联合直肠癌根治术
D. 经腹直肠癌切除、骶前吻合术
E. 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术
75. 男性，60 岁，肝硬化病史 3 年，意识错乱、睡眠障碍，考虑是并发有肝性脑病，其脑电图改变最可能为
- A. 节律变快 B. 节律变慢
C. 节律紊乱 D. 无节律
E. 节律骤变
76. 女，53 岁。腹痛、腹胀、低热 4 周，表情淡漠、嗜睡 1 天。腹部 B 超示：肝实质弥漫性病变、脾大及腹水。对该患者诊断最有意义的阳性体征是
- A. 肌张力增高 B. Babinski 征阳性
C. 扑翼样震颤阳性 D. 腹壁反射消失
E. 腱反射亢进
77. 女性，30 岁。低热，腹胀 3 个月，消瘦，停经。查体：全腹膨隆，未触及肿块，移动性浊音(+)。腹水检查：比重 1.020，蛋白 37g/L，白细胞数 $580 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞 0.80，腹水普通细菌培养阴性。PPD 试验成强阳性。最可能的疾病是
- A. 肝炎后肝硬化
B. 结核性腹膜炎
C. 肝癌并腹膜转移
D. 肝硬化并自发性腹膜炎
E. 卵巢癌腹膜转移
78. 男性，30 岁。反复排黏液血便 3 年，加重 2 个月。抗生素治疗无效。肠镜示直肠至结肠脾曲黏膜弥漫性充血、水肿，较多糜烂及表浅小溃疡。最可能的诊断是
- A. 溃疡性结肠炎 B. 克罗恩病
C. 细菌性痢疾 D. 阿米巴痢疾
E. 结肠癌
79. 男，58 岁。进餐后突发性上腹刀割样剧痛 2 小时。全腹压痛，板状腹，肝浊音界及肠鸣音消失。X 线显示膈下新月形游离气体。既往有胃溃疡史 25 年。下列治疗中，最佳的手术方式是
- A. 胃大部切除术
B. 大网膜覆盖、穿孔缝合术
C. 迷走神经切断加胃窦切除术
D. 高选择性迷走神经切断术
E. 缝合穿孔后行迷走神经切断加胃空肠吻合术
80. 女，54 岁，诊断为急性坏疽性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎入院，行阑尾切除术。术后第 5 天腹胀、腹痛、发热，体温 39℃，大便 4~6 次/

做题随手记

- 日，呈水样。肛门有下坠感，腹部有轻压痛，未触及肿块。首先应考虑的是
- A. 急性肠炎 B. 阑尾残株炎
C. 门静脉炎 D. 肠间质脓肿
E. 盆腔脓肿
81. 女性 40 岁，有胆囊结石病史。4 小时前，无诱因突发上腹剧痛向腰背部放射伴恶心，呕吐。查体：体温 37.5℃，巩膜无黄染，上腹部压痛；反跳痛，以中腹偏左为重，血淀粉酶 1024U/dL，尿胆红素(++)。B 超显示：胆囊 3cm×7cm 大小，多发强回声伴声影，0.5~0.8cm 大小，胆总管直径 0.9cm，胰腺增大，胰周渗出。入院后非手术治疗 3 日，腹痛缓解。复查 B 超示：胆总管直径 0.5cm，尿胆红素(-)，尿淀粉酶 64U/dL 最可能的原因是
- A. 胰腺结石
B. 结石在胆囊颈嵌顿
C. 十二指肠憩室炎
D. 急性胆囊炎
E. 结石一过性通过胆总管下段
82. 女性，60 岁，有肝炎后肝硬化病史，近 1 天呕血后出现嗜睡、定向力障碍，诊断为肝性脑病，为了减少其肠道氨的生成和吸收，可以用
- A. 螺内酯 B. 甘露醇
C. 白蛋白 D. 乳果糖
E. 支链氨基酸
83. 男，42 岁。慢性腹泻 3 年，大便每天 2~3 次，带少量黏液，反复粪便致病菌培养阴性，结肠镜检查见直肠、降结肠和横结肠充血、水肿，有少数散在浅溃疡，拟诊为溃疡性结肠炎。首选的治疗方案是
- A. 泼尼松口服
B. 氟哌酸口服
C. 甲硝唑保留灌肠
D. 氢化可的松保留灌肠
E. 5-氨基水杨酸口服
84. 女性，60 岁，近 3 个月出现便意频繁，排便不尽感，偶有便中带血。直肠指检触及包块。该患者最可能的诊断是
- A. 肛裂
B. 肛瘘
C. 直肠肛管周围脓肿
D. 直肠癌
E. 痔
85. 肝硬化患者，近 1 周来发热、腹痛，腹水明显增加。腹水检查：淡黄，比重 1.017，蛋白 35g/L，白细胞 550×10⁶/L，中性粒细胞为主。最可能并发
- A. 结核性腹膜炎 B. 原发性肝癌
C. 门静脉血栓形成 D. 自发性腹膜炎
E. 肝肾综合征
86. 男，62 岁，间断上腹痛 10 余年，加重伴餐后上腹胀 3 年，胃镜见幽门前区大弯侧直径 1.5cm 范围黏膜不平，活检病理示重度异型增生，最适当的处理方法是
- A. 近期进行胃镜下黏膜切除术
B. 口服质子泵抑制剂治疗
C. 口服胃黏膜保护剂，近期复查
D. 近期行胃大部分切除术
E. 口服 H₂受体拮抗剂，近期复查
87. 男，30 岁，胃溃疡穿孔行胃大部切术后 5 天，出现右上腹钝痛及发热，最高体温 38.5℃，腹部 X 线透视见右侧膈肌升高，随呼吸活动受限，肋膈角模糊，最可能的诊断是
- A. 胃排空障碍 B. 急性细菌性肝脓肿
C. 吻合口漏 D. 急性胆囊炎
E. 膈下脓肿
88. 男性，48 岁。左上腹部外伤 5 小时，急诊留观时出现口渴、烦躁、左上腹疼痛加剧。体温 38.2℃，复查血常规提示白细胞计数明显升高，下一步治疗应选择
- A. 观察 B. 皮下注射吗啡
C. 急诊剖腹探查 D. 腹部 CT 检查
E. 抗感染治疗后择期手术
89. 男，40 岁，饮酒后突发腹痛 24 小时，腹痛剧烈，呈持续性，腹痛从上腹部很快波及全腹，伴恶心、呕吐。查体：腹部膨隆，全腹肌紧张，有压痛、反跳痛，脐周 Cullen 征(+)，血

做题随手记

- 淀粉酶 8500u/L。内科治疗效果不佳，决定手术治疗术中常用处理中最重要的是
- 坏死组织切除
 - 探查并解除胆道梗阻
 - 坏死组织清除加引流
 - 胰腺部分切除
 - 胃造瘘
90. 女，31岁，车祸撞伤右上腹40分钟，查体：P 118次/分，BP 70/60mmHg，痛苦貌，腹肌紧张，以右上腹为甚，有压痛、反跳痛，右下腹穿刺抽出含胆汁的血液，术前处理最重要的环节是
- 防治休克
 - 止血
 - 防治感染
 - 止痛
 - 镇静
91. 男，34岁。间断脓血便4年，大便成形或糊状，每日1~3次，有时里急后重，抗生素治疗无效。最可能的诊断是
- 溃疡性结肠炎
 - Crohn病
 - 肠易激综合征
 - 肠结核
 - 肠道血吸虫病
92. 男，27岁。腹痛伴恶心6天。6小时前脐周疼痛伴呕吐，继而右下腹疼痛逐渐加剧。查体：右下腹部可触及一直径约5cm肿块，界不清，明显触痛，最可能的诊断是
- 结肠癌
 - 克罗恩病
 - 阑尾周围脓肿
 - 溃疡性结肠炎
 - 直肠癌
93. 男性，60岁，上腹部不适的进行性黄疸、食欲不振，当其合并肿大而无触痛的胆囊时，下列诊断最可能的是
- 胆总管下段结石
 - 中下段胆管癌
 - 胆囊颈部结石嵌顿
 - 肝癌
 - 急性梗阻性化脓性胆管炎
94. 女性，40岁，右上腹部不适，B超提示：胆囊结石，对其行胆囊切除手术，下列不是胆总管探查指征的是
- 胆总管有扩张
 - 胆囊水肿
 - 曾有梗阻性黄疸史
 - 术中胆管造影示胆管结石
 - 胆总管触到结石
95. 男，30岁，突发上腹剧痛2小时，怀疑消化道穿孔，无休克表现。针对该患者下一步处理错误的是
- 行胃镜检查
 - 立位腹部X线平片
 - 胃肠减压
 - 抗感染治疗
 - 维持水电解质平衡
96. 女性，58岁。近半年来反复出现腹泻伴低热，日约3~4次，便呈糊状，无脓血，腹泻与便秘相交替。查体：腹软，右下腹轻压痛。辅助检查：结肠镜可见回盲部黏膜充血、水肿，溃疡形成，炎性息肉，肠腔变窄。最可能的诊断是
- 结肠癌
 - 克罗恩病
 - 溃疡性结肠炎
 - 肠结核
 - 血吸虫性肉芽肿
97. 26岁女性。1年前因腹泻，右下腹包块行手术治疗。近期再次出现腹泻，排黏液便，无脓血，钡灌肠检查可见肠痿。为明确诊断首选的化验、检查是
- 血常规
 - 血沉
 - 粪便潜血试验
 - 结肠镜检查
 - 胃镜检查
98. 男，45岁，反复肝功能异常多年，尿少，双下肢水肿2年，加重2周。口服呋塞米20mg/d，1天来昏睡，呼之有反应，患者意识障碍最可能的原因是
- 脑血管意外
 - 肝肺综合征
 - 肝性脑病
 - 肝肾综合征
 - 低血容量性休克
99. 女，54岁，腹痛、腹胀、乏力3个月。腹痛隐痛阵发性发作。查体：贫血貌，浅表淋巴结无肿大，巩膜无黄染，腹软，未见肠型，右下腹可触及一活动性包块。实验室检查：Hb 90g/L，WBC $9.5 \times 10^9/L$ ，肝功能正常，

做题随手记

- CEA 20 μ g/L。粪隐血试验阳性。最可能的诊断是
- A. 回盲部套叠 B. 回盲部结核
C. 溃疡性结肠炎 D. 回盲部肿瘤
E. 克罗恩病
100. 女, 25 岁。进食生冷饮食后上腹痛, 恶心、剧烈呕吐, 初为胃内容物, 后为少量新鲜血, 引起呕血最可能的原因是
- A. 门静脉高压
B. 十二指肠溃疡合并出血
C. 反流性食管炎合并出血
D. 急性糜烂出血性胃炎
E. 应激性溃疡
101. 男, 41 岁, 刀刺伤右上腹 1 小时来诊, 腹腔穿刺抽出不凝血, 急诊手术探查, 正确的腹腔探查顺序是首先探查
- A. 胃十二指肠 B. 膈肌
C. 胃后壁及胰腺 D. 右肾
E. 肝脏
102. 男性, 50 岁。巩膜皮肤黄染进行性加重 3 月余, 中上腹痛并向腰背部放射 1 周。查体: 胆囊肿大呈圆形, 可推动, 无触压痛。首先考虑的疾病是
- A. 胆囊癌 B. 急性胆囊炎
C. 胆囊结石 D. 肝癌
E. 胰头癌
103. 男性, 50 岁, 既往体健, 查体时发现肝在右季肋 2cm, 质硬、无压痛, 脾可触及, 硫酸锌浊度试验 20 单位, ALT 正常范围, 肝穿刺病理有假小叶形成, 应诊断为
- A. 慢性活动性肝炎
B. 慢性持续性肝炎
C. 代偿期肝硬化
D. 肝淤血
E. 多囊肝
104. 女性, 60 岁, 因半年前患脑血栓后一直每日晨起服用阿司匹林, 今晨觉上腹部烧灼样疼痛, 伴有反酸、烧心, 恶心, 呕吐咖啡样物约 400ml, 首选的检查是
- A. 上消化道钡餐检查
B. 胃酸测定
C. 上腹部 B 超
D. 急诊胃镜
E. 血清胃泌素测定
105. 男性, 60 岁, 近 1 月来进食时有哽噎感, 进食流质食品症状缓解, 门诊医师怀疑患有食管癌, 对其影像学诊断首选
- A. PET B. CT
C. MRI D. X 线胸片
E. 食管 X 线稀钡双重对比造影
106. 女, 35 岁。胸痛、反酸、烧心 3 个月, 疑诊 GERD, 经内镜检查, 未发现异常。最有助于明确诊断的检查是
- A. 上消化道气钡双重造影
B. ¹³C 尿素呼气试验
C. 24 小时胃食管 pH 监测
D. 腹部 CT
E. 24 小时心电监测
107. 男, 67 岁, 既往有慢性乙型病毒性肝炎病史 20 余年, 1 个月前出现右上腹隐痛不适。查体: 右腹部膨隆, 可扪及质地坚硬、表面凹凸不平的肿块, 移动性浊音阳性。腹水为血性, 最可能的诊断是
- A. 肝棘球蚴病(肝包虫病)
B. 原发性肝癌
C. 肝囊肿
D. 肝脓肿
E. 肝血管瘤
108. 男, 55 岁, 肥胖, 高脂餐后发作右上腹部阵发性绞痛, 每次发作持续 1~2 小时, 疼痛向右肩背部放射, 伴有饱胀感。首选的检查方法是
- A. B 超 B. CT
C. MRI D. 上消化道钡餐
E. 口服胆囊造影
109. 男, 53 岁, 上腹胀痛 10 余年, 多于饭后约 30 分钟加重。半年来上腹痛加重, 伴反酸, 间断呕吐胃内容物, 吸烟 15 年, 饮白酒 10 年, 每日约半斤。患者的病变最可能位于
- A. 十二指肠球部 B. 胃窦

做题随手记

- C. 胃体 D. 贲门
E. 胃底
110. 男, 50岁, 上腹痛伴进行性黄疸1个月, 感乏力、食欲不振, 症状逐渐加重。查体: 腹部膨隆, 腹软, 未触及包块, 肠鸣音弱, 血CA19-9和CEA增高, 为诊断和制定手术方案, 最有意义的检查方法是
A. ERCP B. MRI
C. 上消化道造影 D. 增强CT
E. 腹部B超
111. 患者男, 62岁。慢性上腹痛、腹胀20余年, 腹痛无规律, 10年前胃镜检查为慢性萎缩性胃炎。2个月来上腹痛加重, 早饱, 偶有呕吐, 体重下降7kg。查体: 贫血貌, 最可能的诊断是
A. 肝癌
B. 胆囊癌
C. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
D. 胃癌
E. 功能性消化不良
112. 男性, 70岁。胃癌根治术后当天输血2000ml, 病人出现呼吸困难, 咳大量血性泡沫痰, 查体: 两肺可闻及湿性啰音。应立即
A. 坐位、吸氧、利尿
B. 抗感染治疗
C. 大剂量应用地塞米松
D. 输入血浆或5%白蛋白
E. 输入碳酸氢钠使尿液碱化
113. 男, 52岁, 乏力、纳差12年, 间断丙氨酸氨基转移酶升高。1个月来尿少, 双下肢水肿, 腹胀逐渐加重, 3天前腹泻, 黄稀水样便3次, 2天来腹痛、发热, T 38.5℃, 该患者最可能的诊断是
A. 肝硬化并发腹膜炎
B. 胆系感染
C. 结核性腹膜炎
D. 急性细菌性痢疾
E. 肝癌破裂
114. 男, 35岁, 28小时前饱餐后参加剧烈运动时突发腹痛、腹胀。持续性, 伴阵发性绞痛, 并有频繁呕吐, 无肛门排气病情加重并晕倒。查体: T 35.6℃, P 126次/分, BP 80/50mmHg, 急性病容, 四肢发绀, 全腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音消失, 腹穿抽出血性液体。该患者所患疾病最主要的病理生理改变是
A. 心输出量低, 外周阻力高
B. 左心室功能不全
C. 短时大量失血
D. 细胞外液容量迅速减少
E. 下腔静脉回流障碍
115. 男性, 48岁。乙型肝炎病史16年。近2个月肝区胀痛不适。CT检查: 肝右叶6cm占位性病变。为进一步明确性质应首选检测
A. CA19-9 B. CEA
C. 癌胚抗原 D. CA15-3
E. AFP
116. 女性, 56岁, 患有细菌性肝脓肿, 下列治疗中错误的是
A. 氯喹治疗
B. 给予充分营养, 纠正水和电解质平衡失衡及低蛋白血症
C. 抗生素治疗
D. 经皮肝穿刺脓肿置管引流术
E. 切开引流
117. 女性, 32岁, 阵发性上腹痛2年, 夜间加重, 疼痛有季节性, 冬季明显, 有反酸, 为进一步确诊, 首选的检查方法是
A. X线钡餐检查
B. CT检查
C. 胃液细胞学检查
D. 胃液分析
E. B超
118. 男, 38岁, 上腹疼痛6年。餐前痛、伴反酸, 胃肠钡餐示: 十二指肠球部变形。近日疼痛加重, 且呈持续性向腰背部放射, 有时低热。查体: 全腹压痛, 反跳痛, 肝浊音界缩小, 移动性浊音(+), 肠鸣音减弱。血白细胞 $11 \times 10^9/L$, 中性0.78。诊断首先考虑为
A. 慢性胃炎

做题随手记

- B. 胃溃疡
C. 胃癌
D. 十二指肠穿透性溃疡
E. 胃黏膜脱垂
119. 男, 58岁, 患肝炎已10余年, 因无力、食欲减退、腹胀20天, 诊断为肝炎后肝硬化(失代偿期)入院。肝功能试验显著异常, 其中白蛋白降低, 球蛋白增高, 白蛋白/球蛋白比率倒置。为治疗低蛋白血症, 首选的血液制品是
- A. 全血 B. 新鲜冰冻血浆
C. 普通冰冻血浆 D. 冷沉淀
E. 白蛋白
120. 女性, 56岁, 肝硬化病史3年, 目前怀疑有慢性肝性脑病, 下列辅助检查该患者不建议做的是
- A. 血氨 B. 脑电图
C. 心理智能测验 D. 头部CT
E. 腹部B超
121. 男性, 40岁, 晚餐后5小时开始上腹疼痛, 向左肩、腰、背部放射及恶心、呕吐、腹胀, 现已37个小时, 曾有胆结石史。体检: R24次/分, T38.9℃, BP90/75mmHg。巩膜可疑黄染, 全腹压痛, 以上腹部显著伴肌紧张和反跳痛, 移动性浊音阳性, 血白细胞 $16 \times 10^9/L$, 中性粒细胞89%。为确定诊断, 最有价值的检查是
- A. 测定血淀粉酶
B. 测定尿淀粉酶
C. 腹腔穿刺液检查并测定淀粉酶
D. 腹部超声检查
E. 腹部X线检查
122. 男, 40岁, 三年来常发作右上腹痛, 午夜为甚, 疼痛放射至背部, 先后发作三次上消化道大出血, 曾经做三次胃镜钡餐检查: 胃和十二指肠球部均未见异常。体检: 肝脾不大, 右上腹有压痛, 下述哪种病可能性最大
- A. 胃癌
B. 肝硬化伴慢性胃炎
C. 胃溃疡
D. 十二指肠球后溃疡
E. 幽门管溃疡
123. 患者女, 51岁, 1小时前因咳嗽突发右下腹疼痛, 右腹股沟出现肿块。查体: 全腹轻压痛, 无腹肌紧张, 肠鸣音亢进。右侧腹股沟韧带下方呈半球形隆起, 不能回纳, 轻压痛, 应采取的正确措施是
- A. 急症手术复位, 行McVay法修补术
B. 急症手术复位, 行Ferguson法修补术
C. 及时手术复位, 密切观察
D. 密切观察, 病情加重及时手术
E. 应用抗生素、止痛剂观察
124. 男, 60岁, 寒战伴高热肝区疼痛15天, 腹部CT提示肝内2个脓肿, 最大直径达6cm, 体温每日高达39.8℃, 其治疗方法首选
- A. 经皮穿刺置管引流
B. 右半肝切除
C. 脓腔内注入抗生素
D. 全身大剂量应用抗生素
E. 继续支持治疗
125. 男, 80岁。右腹股沟斜疝6小时来诊, 既往有可复性腹股沟肿物病史30年, 检查: 右侧腹股沟至阴囊 $10\text{cm} \times 6\text{cm}$, 嵌顿疝, 皮肤无红肿, 首选的治疗方法是
- A. 试行手法复位
B. 手术复位并行疝囊高位结扎
C. 手术复位并行加强腹股沟管疝修补术
D. 手术复位并行无张力疝修补
E. 经腹腔镜疝修补术
126. 男性, 60岁。进行性黄疸4个月, 伴中上腹持续性胀感, 夜间平卧时加重, 消瘦显著。查体: 慢性消耗性面容, 皮肤、巩膜黄染。腹平坦, 脐左上方深压痛, 未及肿块。Courvoisier征阳性。首先考虑的诊断是
- A. 慢性胆囊炎 B. 结肠癌
C. 胰头癌 D. 胃癌
E. 原发性肝癌
127. 女, 30岁, 肛门周围胀痛, 伴畏寒、发热3天。检查: 肛门周围皮肤发红, 压痛明显。最可能的诊断是

做题随手记

- A. 肛门旁皮下脓肿
B. 肛痿炎
C. 混合痔
D. 内痔
E. 肛痿
128. 女, 45岁, 反复腹痛、发热、黄疸1年, 近3天上述症状加重, 精神差, 高热黄疸不退; 入院 T 40℃, P 120次/分, BP 70/50mmHg, 该患者首选的治疗为
A. 大剂量抗生素治疗感染后择期手术
B. 全胃肠外营养后手术
C. 立即手术
D. 积极抗休克同时及早手术
E. 应用血管收缩剂, 血压升至正常后及早手术
129. 女, 40岁, 确诊为急性胰腺炎, 内科正规治疗2周后体温仍在38~39℃, 左上腹部压痛明显。尿淀粉酶256U(Winslow法), 血白细胞 $16 \times 10^9/L$, 可能性最大的是
A. 病情迁延未愈
B. 并发胰腺脓肿
C. 并发胰腺假性囊肿
D. 败血症
E. 合并急性胆囊炎
130. 男, 44岁。3天前体检时B超发现右肝内一肿物, 直径3cm。血AFP 800mmol/L。其最有效的处理方法是
A. 经股动脉插管化疗
B. 经皮肿瘤穿刺注无水酒精
C. 行肝段切除术
D. 放射治疗
E. 全身化疗
131. 女, 25岁, 妊娠5个月, 因转移性右下腹痛2小时就诊。诊断为急性阑尾炎。不宜采用的治疗措施是
A. 行阑尾切除术
B. 围手术期加用黄体酮
C. 手术切口应偏低
D. 尽量不用腹腔引流
E. 可应用广谱抗生素
132. 患者男性, 50岁, 胃大部切除术后3天出现阵发性腹痛、腹胀, 无肛门排气, 生命体征平稳, 最可能的原因
A. 吻合口炎
B. 腹腔内血肿形成
C. 肠系膜血管缺血性疾病
D. 肠扭转
E. 手术后肠蠕动功能失调
133. 男, 25岁。反复腹痛、腹泻、便血10个月。近日加重伴发热, 体温39℃, 1天前因腹痛肌注阿托品治疗6小时后腹胀明显。查体: 70/50mmHg, 心率120次/分。最可能出现的情况是
A. 肠套叠
B. 肠穿孔
C. 肠梗阻
D. 肠出血
E. 中毒性巨结肠
134. 女性, 66岁。右季肋部胀痛、食欲减退、尿黄4个月。乙肝肝硬化病史6年。查体: 肝肋下4cm、表面不平、质硬、压痛。最可能的诊断是
A. 肝脓肿
B. 原发性肝癌
C. 继发性肝癌
D. 乙肝活动期
E. 胆囊炎
135. 男性, 60岁, 长期烧心反酸, 胸骨后疼痛, 饮酒后加重, 诊断为胃食管反流病, 关于患者胃食管反流病的一般治疗不正确的是
A. 避免饱餐及睡前2小时内进食
B. 餐后不要立即卧床
C. 尽量避免使用能降低LES压力的食物和药物
D. 超重者应减轻体重
E. 尽量减少各种运动
136. 女性, 51岁, 间断上腹疼痛2年, 疼痛发作与情绪、饮食有关。查体: 上腹部轻压痛。胃镜: 胃窦皱襞平坦, 黏膜粗糙无光泽, 黏膜下血管透见。此病例考虑诊断为
A. 消化性溃疡
B. 急性胃炎
C. 慢性浅表性胃炎
D. 胃癌
E. 慢性萎缩性胃炎
137. 女, 18岁。低热、腹痛、腹部轻微压痛, 腹

做题随手记

- 泻伴腹胀 2 个月。有游离腹水，考虑为结核性腹膜炎，具有确诊价值的检查为
- A. 血培养 B. 结核菌素试验
C. 腹膜活检 D. 腹水细菌培养
E. 血沉
138. 男，55 岁。上腹部不适 2 个月。进食后饱胀，有时伴疼痛，食欲下降、乏力，症状逐渐加重。为明确诊断首选的检查是
- A. 胃液分析
B. 胃镜
C. 食管 24 小时 pH 监测
D. 腹部 X 线片
E. 腹部 CT
139. 男，68 岁，因胃溃疡出血行毕 I 式胃大部切除术。术后第 6 天，有肛门排气，开始进食，进食后腹胀并呕吐，呕吐物含有胆汁。腹部可见胃型，无蠕动波，X 线平片示残胃内大量胃液潴留。产生此症状最可能的原因是
- A. 远端空肠梗阻
B. 残胃蠕动功能障碍
C. 近端空肠逆流
D. 吻合口水肿
E. 吻合口不全梗阻
140. 男性，65 岁，以长期发热、右上腹或右下胸痛、全身消耗及肝脏肿大压痛、血白细胞增多。诊断为阿米巴性肝脓肿，下列治疗中错误的是
- A. 氯喹 B. 全身支持治疗
C. 甲硝唑 D. 青霉素
E. 手术治疗
141. 男，30 岁，肝区钝痛、低热、乏力 3 个月，有血吸虫疫水接触史，偶饮酒。查体：肝肋下 2cm，质硬。HBsAg(+)，ALT 60U，A/G 3.1/3.0，AFP 先后检测两次，结果分别为 200 μ g/L 和 400 μ g/L。诊断首先应考虑
- A. 慢性活动性肝炎
B. 肝炎后肝硬化
C. 血吸虫病性肝纤维化
D. 酒精性肝硬化
E. 肝炎后肝硬化合并原发性肝癌
142. 男性，47 岁，右上腹痛伴有明显黄疸，BUS 显示肝外胆管及肝内肝管均不扩张，为确定诊断应选择哪一项检查
- A. 核素肝扫描
B. 十二指肠低张造影
C. PTC
D. ERCP
E. MRI
143. 男，56 岁。低热，右侧腹部疼痛不适半年，查体：贫血貌，右侧中腹部可扪及 5cm \times 3cm 质硬肿块，可推动，压痛不明显。首选的检查方法是
- A. 胃镜 B. 全消化道钡餐造影
C. 结肠镜 D. 静脉肾盂造影
E. 腹部 CT
144. 女，31 岁，腹痛、寒战、高热、黄疸反复发作 3 年。1 天来上腹痛为持续性，伴阵发性绞痛，恶心，无呕吐。查体：T 38.6 $^{\circ}$ C，巩膜黄染，右上腹压痛(+)，无反跳痛，胆囊大，Murphy(+)，最佳处理措施是
- A. 胆总管奥狄氏括约肌切开术
B. 胆囊造瘘术
C. 单纯胆囊切除术
D. 胆囊切除+胆总管探查 T 管引流术
E. 胆囊切除术+胆总管十二指肠吻合术
145. 男，68 岁。排便习惯改变 3 个月，便中带血 1 周，查体：浅表淋巴结未触及肿大，腹平软，未触及包块，移动性浊音(-)，肠鸣音正常。直肠指诊：直肠前壁距肛缘 4cm 菜花型肿物，侵及直肠 1/4 周径，肿物直径 2cm，指套染血。为明确诊断及选择治疗方式，最佳的辅助检查是
- A. 腹部 MRI B. 腹部 CT
C. 腹部 B 超 D. 直肠镜
E. 结肠镜
146. 男，60 岁，脑出血昏迷而住院治疗，入院后 2 天突然呕吐咖啡色液体约 600ml 作用，并排黑便 3 次。患者消化道出血的原因是
- A. 十二指肠球部溃疡

做题随手记

- B. 胃癌
C. 食管静脉曲张
D. 慢性胃炎
E. 急性糜烂性胃炎
147. 患者男, 40岁。便秘1年, 近半月来大便时肛门疼痛, 疼痛呈周期性, 粪便表面及便纸上附有鲜血, 其诊断最可能是
- A. 内痔 B. 外痔
C. 直肠癌 D. 肛裂
E. 肛瘘
148. 男, 27岁, 腹痛伴有呕吐10小时, 起初疼痛在脐周, 继而右下腹疼痛逐渐加重, 既往无腹痛与便血史, 查体: 全腹紧张, 有明显压痛和反跳痛, 麦氏点压痛明显, 肠鸣音减弱, 腹穿抽出脓性液体, 最可能的诊断是
- A. 克罗恩病穿孔 B. 阑尾炎穿孔
C. 肠套叠坏死 D. 肠伤寒穿孔
E. 胃穿孔
149. 男, 7岁。便血10天。大便时见粪便表面附有鲜血, 有时在大便后有鲜血滴出, 无疼痛, 大便次数正常, 粪便形状正常。首先考虑的诊断是
- A. 内痔 B. 直肠脱垂
C. 直肠息肉 D. 肛窦炎
E. 肛裂

三 A3/A4型题

1. 男, 65岁。大量呕血、黑便1天。既往有胃溃疡病史20年, 曾有多次出血史。查体: P 126次/分, BP 86/50mmHg, 神情紧张, 烦躁, 手足湿冷, 无力, 上腹部压痛(+), 肠鸣音亢进。血常规: Hb 90g/L, 血细胞比容 0.30。心电图示窦性心动过速。
- 1) 对该患者目前首选的重要治疗措施是
- A. 输注浓缩红细胞
B. 立即静注止血药物
C. 立即静滴垂体后叶素
D. 冰盐水 200ml+去甲肾上腺素 8mg 胃内灌注
E. 快速静滴平衡盐溶液
- 2) 经急诊胃镜发现胃角切迹大溃疡, 活动出血明显, 决定行胃大部切除术, 为达到治疗效果, 至少应切除胃的
- A. 30%左右 B. 50%左右
C. 80%左右 D. 40%左右
E. 60%左右
2. 男性, 28岁, 上腹部饭后疼痛1年, 6小时前出现持续性腹痛, 伴有恶心、呕吐, 体温最高 38.4℃。查体: 心率 98次/分, R 30次/分, BP 100/60mmHg, 腹部膨隆, 腹肌紧张, 腹部压痛和反跳痛(+). 腹部B超可见腹腔内液体。腹腔穿刺抽出脓性液体。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 急性化脓性腹膜炎
B. 急性胰腺炎
C. 肠梗阻
D. 急性肝炎
E. 克罗恩病
- 2) 下列治疗该患者不宜采用的是
- A. 禁食
B. 胃肠减压
C. 纠正水、电解质紊乱
D. 抗生素治疗
E. 垂体后叶素
3. 男, 45岁。右下腹隐痛4个月, 近2个月来乏力、消瘦, 常有低热, 查体: 结膜苍白, 右侧腹部 5cm×3cm 肿块。化验: Hb 95g/L。
- 1) 为明确诊断, 最有意义的检查方法是
- A. 直肠指检 B. 腹部CT
C. X线钡剂灌肠 D. 纤维结肠镜
E. X线气钡双重对比造影
- 2) 若检查诊断为升结肠癌, 最佳手术方式是
- A. 升结肠造瘘术
B. 右半结肠切除术
C. 全结肠切除术
D. 升结肠及部分横结肠切除术
E. 升结肠及末段回肠切除术
4. 男, 45岁。急性胰腺炎, 静脉应用广谱抗生素非手术治疗1周后, 腹痛、腹胀加重, 体温再

做题随手记

- 度升高。
- 此时应紧急选择最有诊断意义的检查是
 - 血白细胞计数+分类
 - 腹部平片了解有无肠麻痹
 - CT 检查注意是否发生胰腺坏死
 - 肠镜检查有无肠梗阻
 - 检查血脂肪酶了解胰腺炎病情变化
 - 若腹腔穿刺涂片查出大肠杆菌，患者症状加重，应选择的治疗措施是
 - 加用甲硝唑静脉点滴
 - 甲硝唑和广谱抗生素腹腔灌洗
 - 急诊手术加充分引流
 - 经皮穿刺引流
 - 西药静脉点滴+中药胃管内滴注
5. 男，47 岁。上腹疼痛 7 小时。伴发热，T 37.8℃，频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张，压痛，无移动性浊音。血 WBC $17 \times 10^9/L$ ，X 线检查：膈下未见游离气体。
- 治疗的基本措施是
 - 急诊手术
 - 禁食和胃肠减压
 - 腹腔穿刺引流
 - 腹腔镜切除胆囊
 - 应用大量广谱抗生素
 - 最可能的诊断是
 - 急性心肌梗死
 - 急性胰腺炎
 - 胆石症
 - 胃溃疡穿孔
 - 肠梗阻
 - 为明确诊断，急需检查的项目是
 - 血淀粉酶
 - 血常规
 - 血清脂肪酶
 - 尿淀粉酶
 - 尿常规
 - 如果患者治疗期间出现上腹部包块，首先考虑的诊断是
 - 腹膜转移癌
 - 粘连肠梗阻
 - 胰腺假性囊肿
 - 胰腺癌
 - 结肠癌
6. 女，42 岁。发热，肝区疼痛 5 天，发热呈弛张热伴寒战、大量出汗、心慌，肝区持续性胀痛，伴恶心、食欲不振。查体：T39.5℃，P100 次/分，R21 次/分，BP120/80mmHg，皮肤无黄染，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，
- 心律齐，肝肋下 4cm，有压痛，右肋弓及腋中线处肋间皮肤水肿，压痛(+)。血常规：Hb120g/L，WBC $18 \times 10^9/L$ ，NO.90，Plt $180 \times 10^9/L$
- 首先考虑的诊断是
 - 肝囊肿并感染
 - 肝癌并发感染
 - 胆石症并发感染
 - 细菌性肝脓肿
 - 急性胆囊炎
 - 引起感染常见的致病菌是
 - 表皮葡萄球菌
 - 白假丝酵母菌
 - 破伤风杆菌
 - 大肠埃希菌
 - 草绿色链球菌
 - 首选的检查方法是
 - 腹部 X 线平片
 - 腹部 B 超
 - 静脉法胆道造影
 - 诊断性肝穿刺
 - 腹部 CT
7. 男性，25 岁。突然晕倒 2 小时，5 天前因车祸撞击左下胸部，曾卧床休息 2 天。查体：心率 140 次，呼吸 30 次，血压 75/60mmHg。神志清，面色苍白，左下胸部有皮肤瘀斑，腹部膨隆，有轻度压痛，反跳痛(+)，移动性浊音(+)，肠鸣音减弱。
- 最可能的诊断是

A. 肠破裂	B. 小肠破裂
C. 结肠破裂	D. 肾破裂
E. 脾破裂	
 - 为尽快明确诊断，首选的检查是

A. 胸部 X 线	B. 腹部 B 超
C. 腹部 CT	D. 腹部 MRI
E. 腹部 X 线	
 - 最佳的处理方法是

A. 胃修补术	B. 结肠修补术
C. 脾切除术	D. 小肠修补术
E. 肾切除术	

做题随手记

8. 男, 49岁。反复不规律上腹部胀痛、胀满、嗝气, 食欲不振, 消瘦、贫血等, 无特异性。胃镜诊断为萎缩性胃炎。
- 下列哪种情况可判断该患者存在活动性胃炎
 - 胃黏膜肠上皮化生
 - 胃黏膜出血
 - 胃黏膜内中性粒细胞增多
 - 胃黏膜中增多的主要是淋巴细胞
 - 胃黏膜纤维组织增生
 - 该患者如考虑为 A 型胃炎, 正确的是
 - 壁细胞抗体阴性
 - 胃酸升高
 - 不出现厌食, 体重下降
 - 不出现恶性贫血
 - 主要位于胃体部
9. 男性, 26岁, 因食物中毒导致急性胃炎, 出现上腹痛、恶心、呕吐等临床表现。
- 该患者病情确诊依赖于
 - X 线胸片
 - 急诊胃镜
 - 食管 pH 检测
 - CT
 - 食管吞钡 X 线检查
 - 下列治疗不宜采用的是
 - 给解痉镇痛药物
 - 给予 H₂受体拮抗剂
 - 给予质子泵抑制剂
 - 给予铝碳酸镁
 - 给予三腔二囊管
10. 男, 46岁, 乙型病毒肝炎史 10 余年, 因乏力、腹胀、少尿就诊。查体: 巩膜黄染, 肝掌, 胸前区见数个蜘蛛痣, 腹膨隆, 肝右肋下及剑突下未及, 脾肿大, 移动性浊音(+).
- 下列哪项指标不能提示肝功能减退
 - 肝掌
 - 黄疸
 - 蜘蛛痣
 - 脾肿大
 - 白蛋白明显降低
 - 下列哪项治疗措施不适当
 - 卧床休息
 - 低盐饮食
 - 利尿治疗以每天体重减轻不超过 2kg 为宜
 - 定期补充血浆或白蛋白
 - 合并应用保钾与排钠利尿药
11. 男, 73岁, 饮酒后呕吐咖啡样胃内容物 2 次, 量约 200ml。有冠心病史, 近一周每天口服阿司匹林 75mg。查体: T36.5℃, P90 次/分, R18 次/分, BP128/68mmHg。神清, 腹软, 剑突下有轻压痛, 未触及包块, 肝脾肋下未触及。
- 最可能的诊断是
 - 十二指肠球炎
 - 反流性食管炎
 - 急性胃黏膜病变
 - 食管贲门黏膜撕裂综合征
 - 胃癌
 - 首选的检查是
 - 血肿瘤标志物
 - 腹部 B 超
 - 腹部 X 线平片
 - 腹部 CT
 - 胃镜
 - 首选的治疗是
 - 静脉应用质子泵抑制剂
 - 静脉用止血环酸
 - 口服云南白药
 - 静脉应用 H₂受体拮抗剂
 - 口服胃黏膜保护剂
12. 男性, 40岁。低热、右下腹痛、腹泻伴黏液便 8 个月。消瘦、贫血。右下腹压痛。血沉 34mm/h, 钡餐检查回肠末段有三段肠壁僵硬、狭窄, 皱襞粗乱, 有卵石样充盈缺损及线样征。
- 该患者最可能的诊断为
 - 十二指肠溃疡
 - 肠结核
 - Crohn 病
 - 溃疡性结肠炎
 - 结肠癌
 - 下列治疗中该患者不宜采用的是
 - 氨基水杨酸制剂
 - 糖皮质激素
 - 免疫抑制剂
 - 抗菌药物
 - 硫酸镁
13. 女, 68岁, 近 3 个月来常有黏液血便, 大便次数增多, 有肛门坠胀及里急后重感, 大便

做题随手记

变细，上述症状进行性加重，查体：生命体征平稳，腹部无明显阳性体征。血尿常规均正常。

1) 首选的检查应是

- A. 乙状结肠镜 B. 腹部 B 超
C. 腹部 CT D. 钡剂灌肠
E. 直肠指检

2) 患者未积极治疗，3 个月后出现膀胱刺激症状

- A. 膀胱原发肿瘤 B. 淋巴转移
C. 血行转移 D. 种植转移
E. 直接浸润

14. 女，34 岁。反复发作上腹部疼痛 3 年。尤其是进食油腻食物和夜间明显，近 3 天上腹绞痛，伴发热寒战，皮肤巩膜黄染。

1) 该患者首选检查方法是

- A. B 超 B. CT
C. MRI D. PTC
E. ERCP

2) 该病最可能的原因是

- A. 肿瘤 B. 结石
C. 蛔虫 D. 炎性狭窄
E. 先天畸形

3) 若患者出现神志淡漠，嗜睡，BP 90/50mmHg，最有效的治疗措施是

- A. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
B. 给予有效足量抗生素
C. 应用肾上腺皮质激素
D. 紧急手术解除胆道梗阻并减压
E. 使用多巴胺等药物维持血压

15. 男性，30 岁。低热，腹痛 3 个月，尿少，腹围增加 2 周。查体：腹部膨隆，腹肌紧张，腹部弥漫压痛和反跳痛(+)，移动性浊音阳性。

1) 对该患者诊断最有意义的检查是

- A. 血常规及血沉 B. 肾功能
C. 尿常规 D. 腹腔穿刺
E. MRI

2) 如考虑腹腔结核感染，对于确诊最有意义的是

- A. 造影

B. 腹部 B 型超声检查

C. 腹水结核杆菌培养

D. 胸腹部 CT

E. PPD 试验

3) 应采用的主要治疗措施是

- A. 抗结核治疗 B. 口服利尿剂
C. 免疫治疗 D. 静脉点滴抗生素
E. 静脉输注白蛋白

16. 女，43 岁，右下腹持续性疼痛 5 天，伴恶心、呕吐，呕出物为胃内容物。体温 38.5℃。体检发现右下腹 5cm×5.5cm 大小肿块，触痛明显。

1) 最可能的诊断是

- A. 粪块所致肠梗阻
B. 盲肠肿瘤
C. 急性化脓性阑尾炎
D. 阑尾周围脓肿
E. 盲肠扭转

2) 此时较合适的处理是

- A. 急诊行阑尾切除术
B. 急诊手术脓肿引流
C. 肠道准备后行右半结肠切除术
D. X 线钡灌肠
E. 暂不手术，保守治疗

3) 如果急诊手术，最合适的手术方式是

- A. 脓肿引流 B. 切除肿块
C. 常规切除阑尾 D. 右半结肠切除
E. 一期肠吻合

17. 女，68 岁。突发上腹阵发性绞痛 2 小时，短时间内寒战、高热，小便呈浓茶样，随后嗜睡。查体：T 39.6℃，P 128 次/分，R 30 次/分，BP 80/50mmHg。神志不清，躁动，巩膜黄染，右上腹肌紧张，有压痛和反跳痛。

1) 导致该患者所患疾病最可能的病因是

- A. 胆管肿瘤 B. 胆管结石
C. 胆管蛔虫 D. 胆管狭窄
E. 胆管畸形

2) 以下非手术治疗措施中，不是必需的是

- A. 持续吸氧
B. 联合使用足量抗生素

做题随手记

- C. 纠正水、电解质紊乱
D. 输注 2 个单位红细胞
E. 必须禁食、胃肠减压
- 3) 急诊手术最有效的手术方式是
- A. 胆总管切开减压术
B. 腹腔镜胆囊切除术
C. 胆囊造瘘术
D. 胆总管空肠吻合术
E. 胆总管十二指肠吻合术
18. 一位 45 岁男性腹水住院患者, 2 天前呕血 800ml, 经抢救好转, 早晨躁动不安, 认人不清, 查体: 轻度黄疸, 结膜无苍白, 扑翼样震颤(+), 腹膨隆, 腹部移动性浊音(+), 四肢张力增强。
- 1) 最有助于诊断的辅助检查是
- A. 血氨测定 B. 血清电解质测定
C. 腹水常规 D. 脑 CT
E. 脑脊液
- 2) 目前对该患者躁动的治疗, 下列哪项最合适
- A. 巴比妥钠 B. 安定
C. 异丙嗪 D. 乳果糖
E. 水合氯醛
19. 男性, 40 岁, 突然呕血 300ml, 暗红色, 并解黑便二次, 查体: 蜘蛛痣, 肝肋下 1.5cm, 质硬, 脾肋下 3.0cm, 少量腹腔积液, 急诊胃镜检查为食管静脉曲张伴活动出血。
- 1) 以下哪种抢救措施是错误的
- A. 积极补充新鲜血及快速补液
B. 急诊内镜注射硬化剂
C. 静脉应用垂体加压素
D. 水合氯醛灌肠镇静治疗
E. 三腔二囊管压迫止血
- 2) 最有效药物治疗是
- A. 静脉注射维生素 K
B. 输新鲜血浆
C. 静脉注射奥美拉唑(洛赛克)
D. 服用凝血酶
E. 静脉点滴生长抑素
20. 男, 56 岁。突发性右侧肢体无力, 伴头痛、呕吐咖啡样物 300ml, 排黑便 2 次。有高血压和糖尿病史 5 年。
- 1) 为明确呕血、黑便的检查是
- A. X 线钡餐透视 B. 大便隐血试验
C. 血常规 D. 胃镜
E. B 超
- 2) 黑便原因很可能是
- A. 食管癌 B. 胃癌
C. 胃溃疡 D. 应激性溃疡
E. 胃底静脉曲张破裂出血
21. 男性, 28 岁。反复右下腹痛 3 年, 伴便秘、口腔溃疡、无发热及乏力。否认结核病史及结核密切接触史。查体: 右下腹可触及边界不清的包块, 可移动, 压痛阳性。
- 1) 首先考虑的诊断是
- A. 克罗恩病 B. 肠结核
C. 结肠癌 D. 阑尾炎
E. 胆囊炎
- 2) 为明确诊断, 最重要的检查是
- A. 大便隐血 B. 大便找抗酸杆菌
C. 腹部 CT D. MRI
E. 结肠镜检查及活检
22. 患者男, 35 岁。饱餐后出现上腹部剧烈疼痛 8 小时, 向后背放射, 屈曲位腹痛减轻, 伴呕吐。有胆囊结石病史。查体: 腹软, 两侧肋肋腹部皮肤呈暗灰蓝色, 上腹部有压痛、反跳痛, Murphy 征阴性, 肠鸣音弱。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 消化道穿孔 B. 急性胰腺炎
C. 急性胆囊炎 D. 急性阑尾炎
E. 急性肝炎
- 2) 对明确诊断最有意义的检查是
- A. CT B. CEA
C. 血常规 D. ALT
E. 消化道钡餐造影
23. 女, 42 岁, 饱餐后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐 8 小时来诊, 既往无胃病史。查体: T38℃, 巩膜无黄染, 上腹偏左有压痛及肌紧张, 肝浊音界正常, Murphy 征阴性, 肠鸣音正常。

做题随手记

- 1)最可能的诊断是
- A. 急性肠梗阻 B. 急性阑尾炎
C. 急性胆囊炎 D. 急性胰腺炎
E. 消化性溃疡穿孔
- 2)为明确诊断,首选的检查是
- A. 尿淀粉酶 B. 血淀粉酶
C. 血脂肪酶 D. 肠镜
E. 腹部平片
24. 女性,70岁,进行性无痛性黄疸2个月,上腹胀痛,体重减轻。检查:巩膜及周身皮肤黄染,P 90次/分,BP 140/70mmHg,血清总胆红素为70 μ mol/L,Courvoisier征阳性。
- 1)此病人首先考虑诊断为
- A. 中、下段胆管癌 B. 胆囊癌
C. 肝门部胆管癌 D. 胆囊结石
E. 胆总管结石
- 2)一般首选的检查方式为
- A. ERCP B. PTC
C. CT D. MRI
E. BUS
- 3)如为胆管下端癌(下段癌),其治疗是
- A. 胆管局部切除
B. 胆总管空肠 Roux-Y 胆道重建术
C. 胆囊空肠改良式 Roux-Y 吻合术
D. 胰十二指肠切除术
E. 胆囊空肠 Roux-Y 型吻合术
25. 患者,男性,38岁,既往有胆结石病史,5小时前因少量饮酒突起腹痛,自服654-2未缓解,随后出现寒战高热遂来院就诊,查体:精神差,体温39 $^{\circ}$ C,脉搏125次/分,血压89/60mmHg,剑突下及右上腹部有压痛,肝大,同时可扪及肿大胆囊,巩膜、皮肤黄染。
- 1)从患者的临床表现来看,属于
- A. Charcot三联征 B. Reynolds五联征
C. Whipple三联征 D. Beck三联征
E. 以上均不是
- 2)作为一线临床医师,你的初步诊断是
- A. MODS B. IBS
C. AOSC D. 冠心病
E. 感染性休克
26. 男,45岁。肝炎病史20余年,近2月来出现右侧季肋部持续胀痛,伴厌食、乏力和腹胀。查体:右侧肋缘下可触及肿大的肝脏,质地坚硬,边缘不规则;AFP>1000 μ g/L。
- 1)首先考虑的疾病是
- A. 肝硬化 B. 慢性肝炎活动期
C. 原发性肝癌 D. 细菌性肝脓肿
E. 肝脏血管瘤
- 2)有确定诊断意义的检查是
- A. 肝功能检查
B. CT
C. MRI
D. 肝穿刺针吸细胞学检查
E. 选择性肝动脉造影
27. 女性,60岁,既往体健,最近半年出现右侧腹痛、皮肤发黄、乏力、消瘦、食欲减退、腹胀等。查体:皮肤巩膜黄染,肝肋下3cm。
- 1)该患者最可能的诊断是
- A. 胃溃疡 B. 胃癌
C. 肠梗阻 D. 肝癌
E. 胰腺炎
- 2)为明确诊断,下列检查中最可靠的是
- A. 肝功能检查
B. CT
C. MRI
D. B超下肝穿刺针吸细胞学检查
E. 触诊
28. 男性,50岁,患有胆管结石,今日突发寒战、高热、肝区疼痛,伴有恶心、呕吐、食欲缺乏和周身乏力,B超可见肝内囊性暗区,囊壁厚。
- 1)该患者最可能的诊断是
- A. 肝癌 B. 肝硬化
C. 脂肪肝 D. 肝性脑病
E. 肝脓肿
- 2)为了进一步明确诊断及指导治疗,下一步该做的检查及化验是
- A. 血清细菌培养及血清学阿米巴抗体检测
B. 血清AFP
C. CT检查

做题随手记

- D. 脑电图
E. PET
29. 女性, 50岁, 种植水稻, 最近出现恶心、呕吐、偶有呕吐鲜红色血液。查体可见脾大, 内镜下见食管胃底静脉曲张, 多普勒超声见门静脉内径1.6cm。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 食管癌 B. 胃炎
C. 胃溃疡 D. 胃癌
E. 门静脉高压
- 2) 若该患者在就诊时出现食管胃底曲张静脉急性大出血, 则首选的治疗方法为
- A. 垂体后叶素 B. 血管加压素
C. 生长抑素 D. 内镜治疗
E. 三腔管压迫止血
30. 男性, 60岁, 饮酒30余年, 最近1年出现乏力、食欲缺乏, 伴有恶心、腹胀、上腹部不适。肝脏病理发现假小叶形成。
- 1) 该患者的诊断应该是
- A. 胃溃疡 B. 胃癌
C. 肝癌 D. 肝硬化
E. 功能性消化不良
- 2) 下列关于该患者的治疗措施错误的是
- A. 适当运动
B. 食物应选择高热量、维生素丰富、易消化的
C. 戒酒
D. 可以静脉输注高渗葡萄糖液以补充热量
E. 抗病毒治疗
31. 男, 57岁。3月来腹胀、水肿, 1周来加重伴腹痛。20年前曾发现HBsAg(+). 查体: 可见肝掌及蜘蛛痣。蛙状腹, 肝未及, 脾肋下4cm, 全腹压痛, 无明显反跳痛, 移动性浊音阳性。化验: 血清蛋白24g/L, 血球蛋白31g/L, 血钾3.8mmol/L, 血钠136mmol/L, 血氯98mmol/L。
- 1) 该患者最必要的检查是
- A. 腹水常规+细菌培养
B. 尿常规及尿钠检测
C. 腹部B超检查
D. 腹部CT检查
- E. 胃镜检查
- 2) 该患者最可能的并发症是
- A. 电解质紊乱 B. 肠梗阻
C. 自发性腹膜炎 D. 代谢性酸中毒
E. 肝肾综合征
- 3) 该患者最可能的基本诊断是
- A. 原发性肝癌
B. 乙型肝炎肝硬化
C. 慢性乙型肝炎
D. 原发性肾病综合征
E. 结核性腹膜炎
32. 患者, 男, 45岁。原有胃溃疡病史15年, 近2个月来上腹疼痛的节律性消失, 服用制酸剂疗效不佳。
- 1) 为了明确诊断, 应采用下列哪一项最有价值的检查
- A. 胃镜 B. X线钡餐检查
C. 胃液分析 D. 粪潜血检查
E. 幽门螺杆菌检测
- 2) 若患者粪潜血多次阳性, 胃镜病理见胃溃疡边缘重度不典型增生, 应采取下列哪一种治疗措施
- A. 质子泵抑制剂 B. 中药治疗
C. 化学治疗 D. 手术治疗
E. 胃黏膜保护剂
33. 男性, 65岁, 既往体健, 近期发现左锁骨上淋巴结肿大, 无痛, 活动较好, 活检为转移性腺癌。
- 1) 有确诊意义的检查为
- A. 上消化道造影
B. 便潜血检查
C. 粪便脱落细胞检查
D. 纤维胃镜检查
E. 腹部B超
- 2) 检查确诊为胃小弯侧腺癌, 该病人的治疗原则是
- A. 手术+化疗
B. 姑息性胃肠吻合术
C. 放射治疗
D. 根治性胃大部切除, 左锁骨上淋巴结清

做题随手记

- 除术
E. 全胃切除
34. 女性, 40岁, 胃溃疡史4年, 2月来上腹无规律疼痛, 进食后加重。钡餐透视: 胃黏膜增粗, 紊乱, 胃窦见1.0cm×1.5cm 龛影。
- 1) 该患者的诊断为
- 胃溃疡癌变
 - 复合性溃疡
 - 胃溃疡并幽门梗阻
 - 胃溃疡并慢性胃炎
 - 胃溃疡并胃黏膜脱垂
- 2) 若患者出现呕血, 血压为80/50mmHg, 心率120次/分, 并出现面色苍白、烦躁、出汗, 则首选的治疗措施是
- 输血
 - 口服去甲肾上腺素
 - 肌注止血敏
 - 输白蛋白
 - 输生理盐水
35. 男, 72岁, 慢性胃炎30年, 近2周出现发作性胸痛, 伴反酸、胃灼热、呃逆, 今日胸痛2分钟来诊。
- 1) 为鉴别是否为心源性胸痛, 首先要进行以下哪种检查
- 胃镜
 - 心电图
 - 24小时食管pH监测
 - 冠脉造影
 - 食管测压
- 2) 要确诊胃食管反流病, 最主要的检查是
- 内镜检查+24小时食管pH监测
 - 食管吞钡X线检查+24小时食管pH监测
 - 食管吞钡X线检查
 - 食管测压+内镜检查
 - 内镜检查
36. 男性, 65岁, 反复发作反酸, 胃灼热, 胸骨后痛10年余, 近日感觉上述症状加重明显, 伴进食哽咽感, 食欲不振, 消瘦。
- 1) 根据上述症状, 以下诊断哪一项可能性最大
- 心绞痛
 - 胃食管反流病
 - 慢性活动性胃炎
 - 十二指肠球部溃疡
 - 胆囊炎
- 2) 近期症状变化, 以下哪种情况可能性最小
- 食管癌
 - 反流性食管炎加重
 - 伴发食管狭窄
 - 伴发神经系统损害
 - 伴发 Barrett 食管
37. 男性, 42岁, 高血压病史, 长期服用硝苯地平, 最近出现烧心、反流、胸痛, 食用高脂肪、巧克力等症状明显加重。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- 胃溃疡
 - 十二指肠溃疡
 - 胃食管反流病
 - 冠心病
 - 肋间神经炎
- 2) 该患者首选的检查是
- 胃镜
 - 肠镜
 - 食管X线
 - 心电图
 - 肌电图
38. 男, 45岁。进食高脂餐并饮酒后上腹持续疼痛8小时, 呕吐2次后疼痛无缓解。查体: T 37.8℃, 上腹部偏左压痛、反跳痛。
- 1) 最有诊断意义的辅助检查是
- 血清脂肪酶
 - 血常规
 - 血清淀粉酶
 - 立位腹部X线平片
 - 心电图
- 2) 最可能的诊断是
- 急性胃炎
 - 急性胆囊炎
 - 肠梗阻
 - 急性胰腺炎
 - 急性心肌梗死
- 3) 如需使用抗生素治疗, 抗生素选择的最佳配伍是甲硝唑和
- 阿奇霉素
 - 克林霉素
 - 环丙沙星
 - 头孢拉啶
 - 青霉素
39. 女性, 65岁。间断右上腹疼痛10余年, 1小时前突发剧烈腹痛, 阵发性加剧, 现出现烦躁不安, 四肢厥冷, 皮肤呈斑点状。化验见血钙明显下降。

做题随手记

- 1) 进一步检查可发现下列体征, 除外
- A. Cullen 征 B. 腹肌强直
C. 腹膜刺激征阳性 D. 肠鸣音亢进
E. Grey-Turner 征
- 2) 最可能诊断为
- A. 急性肠梗阻 B. 急性胰腺炎
C. 急性胃炎 D. 心肌梗死
E. 急性胆囊炎
- 3) 下列哪项表现提示预后不良
- A. 空腹血糖 8.0mmol/L
B. 高胆红素血症
C. 血清淀粉酶超过正常值 3 倍
D. 高甘油三酯血症
E. 血钙降低
- 4) 下列治疗措施错误的是
- A. 尽早镇痛
B. 胃肠减压
C. 应用抑制酶活性药物
D. 抗生素
E. 抑酸治疗
40. 男性, 40 岁, 暴饮暴食后, 心窝部突然疼痛, 恶心呕吐。呕吐物为胃内容物, 吐后疼痛不缓解, 查体: T 38.4℃, P 96 次/分, 脐周压痛, 反跳痛, 肌紧张不明显, 无移动性浊音, 肠鸣音减弱, 麦氏点无压痛。血 WBC $12.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞占比 88%。
- 1) 诊断怀疑是
- A. 急性胆囊炎
B. 急性胃肠炎
C. 急性胰腺炎
D. 急性单纯性肠梗阻
E. 急性阑尾炎
- 2) 进一步明确诊断需进行以下哪项检查
- A. 腹部立位平片 B. 心电图
C. 钡餐造影 D. 血、尿淀粉酶测定
E. 动脉造影
- 3) 该患者应采取以下哪项治疗方法
- A. 流食, 中药治疗
B. 半流食, 针刺疗法
C. 抗生素, 补液治疗
D. 禁食水, 解痉止痛
E. 禁食水, 抗生素注射, 补液, 解痉止痛
- 4) 该患者最可能发生以下哪种并发症
- A. 胰腺假性囊肿 B. 肠梗阻
C. 肠出血 D. 肠痿
E. 腹腔脓肿
41. 男, 28 岁, 消化性溃疡病史 5 年, 今日饱餐后突感上腹部剧痛。检查: 血压 130/80mmHg, 脉搏 110 次/分, 板状腹, 肠鸣音消失。Hb 120g/L, WBC $8.0 \times 10^9/L$ 。
- 1) 首先应采取的检查为
- A. 腹部立位 X 线平片
B. 腹部 B 超
C. 腹腔穿刺
D. 腹部 MRI
E. 腹部 CT
- 2) 该溃疡最常见的位置是
- A. 胃前壁 B. 胃后壁
C. 胃大弯及胃底 D. 胃小弯近贲门处
E. 胃窦小弯侧
- 3) 若腹穿抽出较多液体, 应尽早采取的治疗措施是
- A. 胃肠减压、输液
B. 镇痛镇静治疗
C. 全量应用抗生素
D. 输液、纠正水、电解质酸碱失衡
E. 手术探查
42. 男, 60 岁。上腹部规律性疼痛, 多是饭后疼, 诊断为胃溃疡, 近 1 个月因胃溃疡合并多次大出血, 行胃大部切除术。
- 1) 该患者术后 5 天出现黑便, 最可能的原因是
- A. 小弯侧关闭止血不确切
B. 吻合口出血
C. 吻合口部分黏膜坏死脱落
D. 应激性溃疡
E. 术后胃内残余血
- 2) 术后 10 天, 可进流食, 突然出现呕吐, 禁食后症状好转。钡餐检查见输出段有较长狭窄, 形似漏斗。该患者可选择的治疗措施不

做题随手记

- 包括
- A. 胃肠减压 B. 输血
C. 应用皮质激素 D. 肌内注射新斯的明
E. 即刻手术
- 3) 该患者术后可能出现的营养性并发症不包括
- A. 体重减轻 B. 溶血性贫血
C. 腹泻 D. 脂肪泻
E. 骨病
43. 患者, 男性, 40 岁, 中上腹饥饿性隐痛反复发作 10 年, 伴反酸、嗝气, 进食和服用抑酸剂可缓解。
- 1) 该患者最可能的疾病是
- A. 胃癌 B. 胰腺癌
C. 消化性溃疡 D. 慢性胆囊炎
E. 慢性胰腺炎
- 2) 患者 4 小时前突然出现中上腹剧痛且腹痛持续存在, 该患者可能发生的并发症是
- A. 急性胰腺炎并发出血坏死
B. 胰腺癌并发肠梗阻
C. 胃癌并发幽门梗阻
D. 消化性溃疡并发急性穿孔
E. 急性胆囊炎并发胆汁性腹膜炎
- 3) 为确诊应选择的检查手段是
- A. 血清淀粉酶测定
B. 癌胚抗原测定
C. 胃镜检查
D. 立位腹部 X 线平片
E. 中腹部 B 超
44. 男性, 60 岁, 近三个月出现上腹疼痛、进食后饱胀及体重减轻, 最近半个月上腹痛加重, 出现食欲下降、乏力, 偶有呕血。X 线钡餐检查发现胃内较大而不规则的充盈缺损。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 胃溃疡 B. 胃炎
C. 胃食管反流病 D. 胃癌
E. 食管癌
- 2) 为进一步确诊, 该患者首选
- A. X 线钡餐 B. 腹部增强 CT
C. 超声内镜 D. 胃镜+活检
E. 胃超声
- 3) 该患者的治疗首选
- A. 质子泵抑制剂
B. 胃黏膜保护药物
C. 手术治疗
D. 化疗
E. 放疗
45. 男性, 60 岁, 出现进行性吞咽困难 2 个月, 近期出现吞咽食物不适感及胸骨后烧灼、针刺样疼痛。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 冠心病 B. 胃溃疡
C. 胃癌 D. 食管癌
E. 上消化道出血
- 2) 进一步检查首选
- A. 心电图 B. 幽门螺杆菌检测
C. 胃酸测定 D. 内镜检查
E. 大便常规
- 3) 若检查证实诊断, 则该患者的治疗应选择
- A. β 受体阻滞剂 B. 质子泵抑制剂
C. H_2 受体拮抗剂 D. 垂体后叶素
E. 手术治疗+术后放疗或化疗
46. 男, 33 岁, 因急性坏疽性阑尾炎行阑尾切除术, 术后第 10 天出现发热, 体温 39.2°C , 腹胀、恶心, 肛门有下坠感, 里急后重, 曾排便 4 次, 为黏液样便。
- 1) 此时首先应选用的检查是
- A. 大便培养 B. 腹部 X 线平片
C. 血常规 D. 腹部 B 超
E. 直肠指检
- 2) 诊断明确后, 除抗感染和支持治疗外, 以下处理措施应首先选择的是
- A. 经直肠穿刺抽液定位后切开引流
B. 经下腹正中切口进入腹腔引流
C. 经原麦氏切口进入腹腔引流
D. 腹腔热理疗
E. 温盐水加甲硝唑保留灌肠
47. 病人阑尾炎术后, 1 周出现发热, 体温 38.5°C , 伴有里急后重, 大便次数 6~8 次/日, 内有黏液

做题随手记

- 1) 此时, 最直接的检查方法是
- A. 血培养 B. 腹腔穿刺之
C. 直肠指诊 D. 腹部 X 线平片
E. 腹部 B 超
- 2) 此时, 病人处理原则是
- A. 开腹探查, 清除病灶
B. 经直肠引流
C. 抗生素治疗
D. 局部理疗
E. 口服肠道消炎药
48. 男性, 23 岁, 暴饮暴食后出现脐周腹痛, 后转移至右下腹。来院后疼痛转移至右下腹。做闭孔内肌试验阳性。血常规示白细胞升高。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 急性胆囊炎 B. 急性胃炎
C. 急性阑尾炎 D. 急性腹膜炎
E. 急性胰腺炎
- 2) 若该患者出现腹膜刺激征, 肠鸣音消失, 考虑原疾病并发
- A. 胰腺假性囊肿 B. 腹膜炎
C. 胆囊脓肿 D. 胃溃疡
E. 肿瘤
49. 男, 34 岁。因急性阑尾炎穿孔伴局限性腹膜炎, 行阑尾切除术后 5 天。仍有腹痛, 腹胀, 体温 38℃ 以上, 大便 3~5 次/天, 有下坠感。血 WBC $18 \times 10^9/L$
- 1) 首先考虑为
- A. 切口感染 B. 并发肠炎或菌痢
C. 并发膈下脓肿 D. 盆腔脓肿
E. 化脓性门静脉炎
- 2) 为明确诊断, 首先应做的检查是
- A. 伤口检查 B. B 超
C. 直肠指诊检查 D. X 线胸腹部摄片
E. 粪便常规检查
50. 男, 54 岁, 20 天内呕血 2 次, 之后大便发黑。乙肝病史 30 年。贫血貌, 浅表性淋巴结未触及, 皮肤蜘蛛痣和出血点。腹软, 肝未触及, 腹水征(+), 肾功能正常。胃镜检查见食管胃底静脉曲张。
- 1) 最适宜的治疗方法是
- A. 远端脾肾静脉分流术
B. 脾切除、胃底食管下端周围血管离断术
C. 脾切除、脾肾静脉分流术
D. 门腔静脉侧吻合分流术
E. 经颈静脉肝内门体分流术
- 2) 如果治疗后又发生大出血, 最易发生的并发症是
- A. 肝性脑病 B. 急性左心衰
C. 重度腹水 D. 急性肾衰竭
E. 急性肝坏死
51. 患者女性, 36 岁。间断右下腹痛 6 个月, 伴腹泻、发热。体温多波动于 37~38℃, 否认结核病史和肺结核密切接触史。查体右下腹可触及包块, 可移动, 有压痛, 无反跳痛
- 1) 下列哪种说法正确
- A. 患者可确诊为肠结核, 无需进一步检查
B. 患者不能除外 Crohn 病应进一步行结肠镜检查
C. 应立即行剖腹探查
D. 可使用激素进行试验性治疗
E. 患者最可能的诊断是急性阑尾炎或结肠癌
- 2) 为明确诊断最重要的检查是
- A. 肿瘤指标 B. 便找结核杆菌
C. 腹平片 D. 结肠镜检查加活检
E. 胸部 X 线片
52. 女, 55 岁, 皮肤黄染进行性加重 1 个月, 上腹部不适, 10 天前发现小便呈浓茶样, 近几天来大便呈灰白色, 查体: T 36.8℃, 皮肤、巩膜黄染, 腹软, 右上腹可触及肿大的胆囊, 无压痛, 无反跳痛, 体重下降。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 胆总管结石 B. 肝细胞性肝癌
C. 肝门部胆管癌 D. 胆囊结石
E. 胰头癌
- 2) 该患者手术治疗后第 4 天发生上腹部剧烈疼痛, 腹腔引流明显增加, 引流液淀粉酶 15000U/L, 患者最有可能发生的并发症是
- A. 胰漏
B. 急性胰腺炎
C. 肠系膜血栓形成

做题随手记

- D. 肠漏
E. 胆漏
53. 男, 70 岁。饮酒 1 小时后呕咖啡样物 100ml, 后排黑便 100g。既往体健。查体: P 110 次/分, BP 90/50mmHg。
- 1) 首选的治疗药物是
- A. 多巴胺 B. 硫糖铝
C. 止血芳酸 D. 纳洛酮
E. 奥美拉唑
- 2) 对诊断及治疗最有意义的检查是
- A. 胃镜
B. 腹部 X 线平片
C. 上消化道 X 线钡餐造影
D. 腹部 B 超
E. 腹部 CT
54. 男, 22 岁, 因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病史。查体: 面色稍苍白, 血压 100/60mmHg, 心率 92 次/分, 腹软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃。
- 1) 最可能的诊断是
- A. 食管静脉曲张破裂出血
B. 十二指肠溃疡并发出血
C. 胃癌出血
D. 佐林格-埃利森 (Zollinger-Ellison) 综合征并发出血
E. 食管贲门撕裂综合征
- 2) 药物治疗首选
- A. 质子泵阻滞剂 B. 硫糖铝 C. 生长抑素制剂
D. 枸橼酸铋钾 E. 米索前列醇
- 3) 成人出现大便隐血阳性时, 消化道出血量至少大于
- A. 10ml B. 9ml
C. 8ml D. 6ml
E. 5ml
55. 患者男性, 51 岁, 呕血、便血 6 小时量约 1000ml。患者患肝炎后肝硬化 10 年。入院体检: 血压 90/60mmHg, 心率 110 次/分, 巩膜轻度黄染, 腹平、软, 肝未及, 脾肋下 7cm, 移动性浊音阳性, 肠鸣音稍亢进。
- 1) 应给予患者的首要处理
- A. 配血, 等待输血
B. 行胃镜检查, 明确出血部位
C. 迅速建立静脉通路, 以平衡液快速扩容, 纠正休克
D. 准备三腔二囊管压迫止血
E. 查血常规、肝功能
- 2) 下列处理哪项是正确的
- A. 开腹手术治疗
B. 以冰盐水和去甲肾上腺素洗胃
C. 给予止血敏
D. 给予氢氧化铝抗酸
E. 给予血管升压素或生长抑素静点
56. 男, 56 岁, 反酸、烧心 5 年, 胃镜检查: 食管下段黏膜多发条形破损, 相互融合。
- 1) 该患者最可能的诊断为
- A. 慢性胃炎 B. 慢性食管炎
C. 胃食管反流病 D. 消化性溃疡
E. 贲门失迟缓症
- 2) 该患者首选的治疗药物是
- A. 奥美拉唑 B. 法莫替丁
C. 硫糖铝 D. 枸橼酸铋钾
E. 阿托品
- 3) 该患者的治疗措施不包括
- A. 应用促胃肠动力药
B. 抗酸治疗
C. 高脂肪饮食
D. 戒烟禁酒
E. H₂受体拮抗剂
57. 女, 38 岁, 上腹部不适, 纳差 3 年, 体重减轻, 乏力半年, 查体: 贫血貌, 上腹部轻压痛, Hb 88g/L, MCV 115fl, 胃镜检查提示胃体皱襞稀疏, 黏膜血管透见。
- 1) 该患者应首先考虑的诊断是
- A. Menetrier 病
B. 慢性浅表性胃炎
C. 慢性萎缩性胃炎
D. 慢性淋巴细胞性胃炎
E. 胃癌
- 2) 对诊断最有意义的辅助检查是

做题随手记

- A. 血癌胚抗原 B. 血胃泌素
C. 血胃蛋白酶原 D. 血壁细胞抗体
E. 血抗线粒体抗体 M₂亚型
- 3) 该患者发生贫血最可能的机制是
- A. 维生素 C 缺乏
B. 慢性消化道失血
C. 铁吸收障碍
D. 蛋白质吸收障碍
E. 内因子缺乏
58. 男性, 60 岁, 患有糖尿病 20 余年, CT 平扫可见肝脏密度低于脾脏, 肝内血管显示不清。
- 1) 该患者最可能的诊断是
- A. 肝癌 B. 肝硬化
C. 脂肪肝 D. 肝性脑病
E. 肝脓肿
- 2) 该患者的治疗不正确的是
- A. 低糖低脂平衡膳食
B. 适当运动
C. 多烯磷脂酰胆碱
D. 水飞蓟素
E. 手术治疗
59. 男, 55 岁。肝硬化患者, 有腹水。不规则服用利尿剂治疗, 近日来出现嗜睡。体检: 轻度黄疸, 测血钠 120 mmol/L, 血钾 2.6 mmol/L, 氯化物 90 mmol/L, BUN 10 mmol/L, 血 pH 7.5。
- 1) 患者肝昏迷的诱因是
- A. 黄疸 B. 低血钠
C. 低血钾 D. 酸中毒
E. 氮质血症
- 2) 此时最好的治疗是静脉滴注
- A. 谷氨酸钠
B. 谷氨酸钠+精支链氨基酸
C. 谷氨酸钠+谷氨酸钾
D. 谷氨酸钠+左旋多巴
E. 谷氨酸钠+支链氨基酸+10%氯化钾
- 3) 下列哪项体征对该例诊断有特征性意义
- A. 肌张力增强 B. 腱反射亢进
C. 扑翼震颤阳性 D. 腹壁反射消失
E. 嗜睡
60. 男, 56 岁, 乏力、食欲不振、恶心、消瘦 1

个月, 乙型肝炎病史 10 年。查体: 皮肤巩膜无黄染, 腹软, 剑突下压痛, 肝肋下 3cm, 可触及质硬的结节, Murphy 征阴性, 移动性浊音阳性。

1) 为了明确肝脏结节性质, 最有诊断价值的肿瘤标志物是

- A. CEA B. CA125
C. CK19 D. AFP
E. CA19-9

2) 为进一步检查明确肝脏结节的大小与位置, 首选的检查是

- A. PET-CT 检查 B. MRI 检查
C. 放射性核素扫描 D. B 超检查
E. 肝动脉造影

3) 该患者若手术治疗, 其禁忌证是

- A. 合并肝硬化 B. 有消化道出血史
C. 有明显腹水 D. 肿瘤位于肝右叶
E. 肿瘤直径约 10cm

61. 男性, 42 岁, 丙型肝炎史 6 年, HCV-RNA 阳性, ALT 38U, 球蛋白 28g/L, 白蛋白 38g/L, 肝活检示慢性肝炎。

1) 该病人目前是

- A. 肝癌 B. 急性丙型肝炎
C. 肝硬化 D. 肝癌高危人群
E. 正常人群

2) 对该病人目前的最好处理是

- A. 抗病毒治疗, 定期进行 AFP 和超声检查
B. 定期进行血管造影检查
C. 积极的护肝治疗
D. 定期进行 MRI 检查
E. 积极的预防肝癌治疗

62. 男, 69 岁, 右侧腹股沟区可复性肿块 8 年。查体: 患者直立时, 在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方有一 4cm×4cm 半球形肿物, 未进入阴囊, 平卧后自行消失。

1) 该患者最可能的诊断是

- A. 股疝
B. 隐睾
C. 交通性鞘膜积液
D. 腹股沟斜疝

做题随手记

- E. 腹股沟直疝
- 2) 该患者最有效的治疗方法是
- 用棉线束带或绷带压迫内环口
 - 禁烟、控制呼吸道感染
 - 注射硬化剂
 - 疝修补术
 - 疝囊高位结扎术
63. 女, 35 岁。腹胀、腹部隐痛伴低热 3 个月。突发脐周绞痛 6 小时, 呕吐数次, 无排气, 排便。
- 1) 最可能的诊断是
- 消化性溃疡并幽门梗阻
 - 慢性阑尾炎急性发作
 - 结肠癌并肠穿孔
 - 结核性腹膜炎并肠梗阻
 - 缺血性肠病并肠梗阻
- 2) 首选的检查是
- 结肠镜检查
 - 立位腹部 X 线平片
 - 腹部 B 超
 - 腹部 CT
 - 腹部 MRI
64. 患者, 女, 30 岁。腹胀 20 天伴低热、乏力、夜间盗汗前来求诊。体检: 腹部轻度膨隆, 腹壁柔韧感, 肝脾未触及, 腹部移动性浊音(+)
- 1) 最可能的诊断是什么
- 腹膜癌变
 - 肝硬化腹腔积液
 - 自发性腹膜炎
 - 结核性腹膜炎
 - 盆腔肿瘤
- 2) 为明确诊断首选哪项检查
- 肝功能检查
 - 结核菌素试验
 - 腹腔积液检查及结核杆菌培养
 - 腹部 B 超
 - 胃肠道钡餐造影
65. 女性患者, 30 岁, 左腰被撞击, 1 小时后就诊。查体: BP 120/70mmHg, Hb 110g/L, 腹部无肌紧张及压痛, 左侧腹触及包块, 范围局限, 无移动性浊音。
- 1) 最可能出现的情况有
- 对侧肾积水
 - 肝破裂
 - 胃穿孔
 - 肾外伤后肾积水
 - 肾外伤, 肾出血、尿液外渗
- 2) 上述患者行保守治疗 2 小时后, 查 BP 80/50mmHg, Hb 70g/L, 左上腹包块增大, 此时应考虑
- 继续保守治疗
 - 留置尿管
 - 穿刺引流
 - 探查手术并抗休克治疗
 - 肾切除
66. 女, 35 岁。脾切除、小肠切除吻合术后第 5 天, 已排气, 头痛、恶心、腹胀, 随后出现寒战, 四肢发绀, T39.6℃, P108 次/分, BP135/85mmHg, 近 24 小时尿量 650ml。轻度腹胀, 腹软, 全腹轻压痛, 无反跳痛肌紧张。肠鸣音 3 次/分。
- 1) 最有可能出现异常的是
- 白细胞计数
 - 尿常规检查
 - 立位腹部透视
 - 腹部超声检查
 - 血清钾离子
- 2) 最可能的原因为
- 小肠吻合口漏
 - 手术后创面出血
 - 急性肾衰竭
 - 革兰阴性杆菌感染
 - 高位肠梗阻
67. 女性, 66 岁, 反复右上腹部隐痛并反射至右背部 5 年, 近期急性发作。口服胆囊造影示: 胆囊胆固醇沉积症。手术行胆囊切除。
- 1) 手术中胆囊肉眼所见可能为
- 胆囊壁增厚
 - 胆囊外观正常
 - 胆囊增大
 - 胆囊萎缩
 - 慢性炎症性改变
- 2) 胆囊胆固醇沉积症的病变主要在
- 黏膜层
 - 浆膜层
 - 肌层
 - 浆膜层及肌层
 - 肌层及黏膜层
68. 男, 29 岁, 腹痛、腹泻、黏液血便 2 周, 大便 10 余次/日。静滴左氧氟沙星及甲硝唑 10 天后症状无好转。T 39℃, Hb 75g/L, 粪便培养未见致病菌生长, 结肠镜示全结肠弥漫性

做题随手记

充血、水肿，伴糜烂及不规则浅溃疡，病理为重度慢性炎症，隐窝脓肿形成。

1) 该患者首先考虑的诊断是

- A. 肠结核 B. 溃疡性结肠炎
C. 肠易激综合征 D. 克罗恩病
E. 慢性细菌性痢疾

2) 该患者首选的药物是

- A. 泼尼松龙 B. 美沙拉嗪
C. 头孢类抗生素 D. 异烟肼
E. 蒙脱石

69. 男，58岁。进行性贫血。消瘦、乏力半年。有时右侧腹痛，无腹泻。查体：右中腹部扪及肿块，肠鸣音活跃。

1) 下列各项检查可明确诊断的是

- A. 纤维结肠镜 B. CEA
C. CT D. B超
E. X线钡餐检查

2) 如果需要手术治疗，术前准备最重要的是

- A. 纠正营养 B. 肠道准备
C. 心肺功能检查 D. 肝肾功能检查
E. 心理准备

70. 女，28岁，间断性下腹痛4年余，大便2~3次/天，稀便，无脓血，便后下腹痛可缓解，粪常规检查：未见细胞，隐血试验阴性，查体无异常发现。

1) 该患者可能的诊断是

- A. 溃疡性结肠炎 B. 克罗恩病
C. 肠易激综合征 D. 肠结核
E. 慢性细菌性痢疾

2) 最适合的药物治疗为

- A. 糖皮质激素 B. 匹维溴铵
C. 柳氮磺吡啶 D. 硫唑嘌呤
E. 喹诺酮药物

71. 男性，36岁，上腹胀痛、恶心、呕吐1周。呕吐物量大，为带酸臭味的隔日宿食，不含胆汁。呕吐后症状可暂缓解。既往间断上腹痛6年余，为空腹痛、夜间痛，秋季好发。查体上腹部轻压痛，可见胃型、蠕动波，振水音阳性。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 功能性胃潴留 B. 幽门梗阻
C. 急性胃炎 D. 十二指肠壅滞症
E. 功能性消化不良

2) 为明确病因，检查首选

- A. B超 B. 胃镜检查
C. 肛门指诊 D. 肝功能检查
E. 血尿淀粉酶

72. 男，68岁，阵发性腹痛1年，自觉有“气块”在腹中窜动，起初大便次数增加，近3个月腹胀、便秘，近3天无肛门排气、排便，呕吐物有粪便臭味，一直感觉乏力和低热。

1) 根据病史考虑肠梗阻为

- A. 高位不完全梗阻
B. 绞窄性肠梗阻
C. 高位完全肠梗阻
D. 低位不完全肠梗阻
E. 低位完全肠梗阻

2) 该患者引起梗阻的病因最可能的是

- A. 肿瘤 B. 肠系膜血栓
C. 粪块 D. 炎性狭窄
E. 粘连带

3) 禁忌使用的检查是

- A. 腹部B超
B. 全消化道钡餐造影
C. 腹部X线平片
D. 结肠镜
E. 腹部CT

四 B型题

1. A. 为一级预防
B. 癌肿仅位于黏膜层
C. 辅助手术治疗，以抑制癌细胞的扩散和杀伤残存癌细胞，提高手术效果
D. 目前唯一的可能根治胃癌的手段
E. 可提高患者的免疫力
- 1) 手术治疗是
2) 内镜下治疗
3) 化学治疗

做题随手记

2. A. 直接蔓延
B. 淋巴结转移
C. 血行转移
D. 种植转移
E. 呼吸道转移
- 1) 胃癌的主要转移途径是
2) 晚期胃癌转移到肝脏、肺、胰、骨骼最可能为
3) 女性胃癌患者出现 Krukenberg 瘤最可能原因为
3. A. 男性乳腺发育
B. 食管静脉曲张
C. 氨中毒
D. 凝血因子减少
E. 黄疸
- 1) 门静脉高压可引起
2) 肝脏解毒功能下降表现为
3) 肝脏激素灭活能力下降导致
4) 肝脏合成功能下降表现为
4. A. 回盲部
B. 末端回肠和邻近结肠
C. 直肠、乙状结肠
D. 全结肠
E. 十二指肠
- 1) 肠结核病变大多位于
2) Crohn 病的病变大多位于
5. A. 胆道蛔虫病
B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
C. 肝脓肿
D. 急性水肿性胰腺炎
E. 急性胆囊炎
- 1) 胆囊结石最常见的并发症
2) 最易引起休克的胆道疾病
6. A. 腹泻, 便呈糊样
B. 便秘
C. 便血极常见
D. 钡灌肠透视呈铅管征
E. 易并发中毒性巨结肠
- 1) 溃疡型肠结核常见
2) 增生型肠结核常见
7. A. 疼痛-进食-便后缓解
B. 无明显规律
C. 疼痛-便意-便后缓解
D. 便意-疼痛-便后缓解
E. 进食-疼痛-便后缓解
- 1) 克罗恩病腹痛的特点是
2) 溃疡性结肠炎腹痛的特点是
8. A. 疝囊高位结扎术
B. Bassini 法修补术
C. Halsted 法修补术
D. McVay 法修补术
E. Ferguson 法修补术
- 1) 绞窄性斜疝局部有感染者, 应选的合理手术方式是
2) 股疝最恰当的手术方式是
9. A. 肛裂
B. 直肠癌
C. 肛瘘
D. 内痔
E. 直肠息肉
- 1) 肛诊检查触及不规则肿物, 质硬、固定, 最可能是
2) 肛诊检查触及黏膜外条索状肿物, 质地稍硬、固定, 最可能是
10. A. 原发性腹膜炎
B. 盆腔脓肿
C. 继发性腹膜炎
D. 出血性腹膜炎
E. 慢性腹膜炎
- 1) 阑尾切除术后 8 天, 下腹坠胀不适, 每天大便 20 次左右, 大便带有黏液直肠指检, 直肠前壁扪及触痛性肿块
2) 患者男性, 25 岁, 呕吐、腹痛 6 小时, 三天没有大便, 没有排气, 全腹压痛和反跳痛, 腹肌紧张, 穿刺液有血性液体
11. A. 排便可加重肛门疼痛, 伴大便带鲜血
B. 肛周肿痛伴发热
C. 反复发作的肛周红肿疼痛, 窦道外口流出脓性分泌物
D. 肛门疼痛, 伴有局部暗紫色肿块

做题随手记

- E. 排便时出血、无痛
1) 肛裂
2) 直肠肛管周围脓肿
12. A. 外痔
B. 内痔
C. 混合痔
D. 直肠脱垂
E. 环形痔
1) 排便时脱出肛门，需手推才能还纳的圆形肿物是
2) 肿物呈梅花瓣样脱出肛门，同时肛门不松弛的是
13. A. 胆囊切除术
B. 胆囊造口术
C. Oddi 括约肌切开成形术
D. 胆囊切除加胆管空肠 Roux-Y 吻合术
E. 胆囊切除加胆总管探查引流术
1) 慢性胆囊炎合并胆囊积水宜采用
2) 肝内胆管大量泥沙样结石宜采用
3) 胆囊积脓穿孔合并感染性休克宜采用
4) 胆囊多发性小结石有黄疸史宜采用
14. A. 胃酸轻度减少
B. 胃酸明显减少
C. 胃酸正常或减少
D. 胃酸轻度升高
E. 胃酸明显增高
1) 重度萎缩性胃炎胃炎患者是
2) 萎缩性胃窦胃炎患者是
15. A. 胃组织学检查
B. 快速尿素酶试验
C. 幽门螺杆菌培养
D. 尿素呼气试验
E. 血清学检查
1) 作为幽门螺杆菌根除治疗后复查的首选方法是
2) 侵入性检查幽门螺杆菌的首选方法是
16. A. 补体结合试验阳性
B. 甲胎蛋白阳性
C. 右上腹绞痛及黄疸
D. 穿刺抽出棕褐色脓液
E. 突发寒战高热，肝区疼痛，肝大
1) 阿米巴肝脓肿的特点是
2) 细菌性肝脓肿的特点是
17. A. 麻痹性肠梗阻
B. 单纯性肠梗阻
C. 痉挛性肠梗阻
D. 绞窄性肠梗阻
E. 机械性肠梗阻
1) 急性小肠扭转一般应及时手术治疗，因为其易发生
2) 外伤性腹膜后巨大血肿易发生
18. A. 不凝的血性液体
B. 黄绿色透明液体，无臭味
C. 稀脓性液体，略带臭味
D. 淡黄色透明液体
E. 黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味
下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体
1) 脾破裂
2) 胃十二指肠急性穿孔
3) 肛周脓肿
19. A. 渐进加重的上腹部疼痛，向后背放射
B. 周期性空腹及夜间上腹部疼痛，进餐后可缓解
C. 反复上腹部胀痛，餐后加重伴嗝气，饮食不洁时加重
D. 周期性餐后上腹部疼痛，至下餐前缓解
E. 持续性上腹部疼痛，阵发性加重
1) 符合慢性胃炎临床表现的是
2) 典型的胃溃疡疼痛特点是
20. A. 早期胃癌
B. 小胃癌
C. 微小胃癌
D. 进展期胃癌
E. 晚期胃癌
1) 局限于黏膜或黏膜下层的胃癌
2) 癌灶直径 $\leq 5\text{mm}$
21. A. 胆囊结石
B. 胆管结石
C. 胆囊癌
D. 胆管癌

做题随手记

- E. 胆道蛔虫
- 1) 引起急性化脓性梗阻性胆管炎最常见的原因是
 - 2) 具有突发性剑突下钻顶样剧烈疼痛症状的疾病是
22. A. 减少肠道内氨的形成和吸收
B. 纠正电解质紊乱
C. 降低门静脉压力
D. 纠正氨基酸不平衡
E. 纠正酸碱平衡紊乱
- 1) 肝性脑病口服乳果糖的主要作用是
 - 2) 肝性脑病注射支链氨基酸的主要作用是
23. A. 腹水比重 <1.016 , 蛋白 20g/L
B. 腹水比重 >1.018 , 李凡他(Rivalta)试验阳性
C. 乳糜样腹水
D. 腹水细胞总数 $>1\times 10^9/\text{L}$ 分类以中性粒细胞为主
E. 腹水细胞总数为 $1\times 10^8/\text{L}$, 分类以间皮细胞为主
- 胞为主
- 1) 最可能为肝硬化腹水的是
 - 2) 最可能为结核性腹水的是
24. A. 胆道蛔虫症
B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
C. 肝脓肿
D. 急性水肿型胰腺炎
E. 急性化脓性胆囊炎
- 1) 最易引起感染性休克的疾病
 - 2) 胆囊结石最常见的并发症是
25. A. Duke A 期
B. Duke B 期
C. Duke C₁期
D. Duke C₂期
E. Duke D 期
- 1) 结肠癌病灶侵犯肌层, 但未穿透浆膜层的是
 - 2) 结肠癌病灶穿透肠壁, 无淋巴结转移的是

做题随手记