

第一部分 专项训练3600题



第一篇 消化系统



听听老师怎么讲



试试机考的锋芒

一 A1型题

- 腹部闭合性损伤中最易损伤的实质性器官是
 - 肝脏
 - 胰腺
 - 脾脏
 - 肾脏
 - 结肠
- 小胃癌的癌灶直径小于
 - 5mm
 - 8mm
 - 10mm
 - 12mm
 - 20mm
- 构成腹股沟管前壁的组织结构有
 - 腹横肌
 - 腹外斜肌腱膜
 - 腹膜
 - 腔隙韧带
 - 腹横筋膜
- 进展期胃癌，最常见的是
 - 息肉型
 - 溃疡型
 - 弥漫浸润型
 - 溃疡浸润型
 - 浅表扩散型
- 绞窄性肠梗阻是指肠梗阻并伴有
 - 肠袢两端均完全阻塞
 - 肠壁血运障碍
 - 肠壁穿孔、坏死
 - 肠系膜扭转
 - 肠腔高度扩张
- 胆囊动脉多源于
 - 肝左动脉
 - 肝固有动脉
 - 胃十二指肠动脉
 - 肝右动脉
 - 胃右动脉
- 胰腺癌常见的首发症状是
 - 上腹疼痛、不适
 - 黄疸
 - 消瘦、乏力
 - 消化道症状

关于图书二维码，您需要知道——

亲爱的读者，在本书各系统的开篇页，均附有赠送课程（听听老师怎么讲）和机考题库（试试机考的锋芒）。请扫描对应二维码，下载并安装“医学考试电子书APP”，即可拥有以上增值服务。如需更多视频课程，建议选购医学教育网网上辅导课程，详情见本书彩页。

做题随手记

- E. 低热
8. 胃大部切除术后病人, 发生早期倾倒综合征的最晚时间是餐后
A. 20 分钟 B. 50 分钟
C. 40 分钟 D. 30 分钟
E. 10 分钟
9. 诊断肝硬化并发自发性腹膜炎具有确诊价值的是
A. 腹部压痛
B. 发热
C. 腹胀
D. 腹水 Rivalta 试验阳性
E. 腹水细菌培养阳性
10. 可作为急性胰腺炎常规初筛检查的影像学方法是
A. 腹部 B 超 B. 腹部 X 片
C. 增强 CT 扫描 D. MRI
E. 腹部透视
11. 腹部闭合伤, 确诊有无内脏伤最简便、最可靠的诊断方法为
A. X 线照片 B. CT
C. 白细胞计数 D. B 超
E. 腹腔穿刺
12. 下列哪项构成直疝三角
A. 腹直肌外缘、联合肌腱、腹股沟韧带
B. 腹直肌外缘、腹壁下动脉、腹股沟韧带
C. 陷窝韧带、腹壁下动脉、腹股沟韧带
D. 陷窝韧带、腹壁下动脉、腹横筋膜
E. 凹间韧带、腹直肌外缘、联合肌腱
13. 下列哪项指标对判断肝硬化患者预后意义不大
A. 腹水 B. 白蛋白
C. 血清电解质 D. 凝血酶原时间
E. 肝性脑病
14. 肛裂最常见于膝胸位
A. 12 点处 B. 1 点处和 7 点处
C. 9 点处和 3 点处 D. 2 点处和 8 点处
E. 6 点处
15. 重症急性胰腺炎的治疗, 哪项错误
A. 抗生素 B. 止痛
C. 生长抑素 D. 加贝酯
E. 为减轻胰腺水肿, 补液宜少
16. 采用高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡, 主要依据是
A. 溃疡很少恶变
B. 能够减少胃酸分泌
C. 患者年龄大于 70 岁
D. 能防治幽门螺杆菌感染
E. 溃疡病灶小
17. 支配阑尾的神经是交感神经腹腔丛和
A. 内脏小神经 B. 第 10 胸神经
C. 第 12 胸神经 D. 内脏大神经
E. 第 1 腰神经
18. 消化性溃疡发病机制中最重要的攻击因子是
A. 胃酸、胃蛋白酶 B. 胰酶
C. 胆汁 D. 精神、心理因素
E. 食物的理化刺激
19. 肝硬化最常见的并发症是
A. 门静脉血栓形成 B. 原发性肝癌
C. 肝性脑病 D. 上消化道大出血
E. 自发性腹膜炎
20. 下列选项中, 不是 Crohn 病常见并发症的是
A. 瘘管 B. 穿孔
C. 肠梗阻 D. 大量便血
E. 癌变
21. 急性糜烂性胃炎的确诊应依据
A. X 线胃肠钡餐检查
B. 胃液分析
C. 上消化道出血的临床表现
D. 急诊胃镜检查
E. 腹部 B 超
22. 肝硬化腹水患者每日钠盐摄入量及进水量一般分别要控制在
A. 1.5~2g/d, 1000ml/d
B. 1.5~4g/d, 1000ml/d
C. 1.5~2g/d, 600ml/d
D. 1.5~4g/d, 600ml/d
E. <4g/d, 1000ml/d
23. 继发性腹膜炎毒性强主要是因为感染菌为

做题随手记

- A. 金黄色葡萄球菌 B. 溶血性链球菌
C. 大肠杆菌 D. 各种细菌混合
E. 绿脓杆菌
24. 胃大部切除术后发生残胃癌的最短时间是术后
A. 1年 B. 5年
C. 10年 D. 20年
E. 15年
25. 下列哪项不是早期食管癌的临床表现
A. 食管内异物感
B. 食物停滞感
C. 进行性吞咽困难
D. 进食时胸骨后不适或疼痛
E. 进食时胸骨后烧灼感
26. 下列关于急性梗阻性化脓性胆管炎说法错误的是
A. 发病急骤，病情进展快
B. 可出现休克、神经中枢抑制
C. 脉搏增快，血压迅速升高，呈急性重病容
D. 剑突下及右上腹部有压痛或腹膜刺激征
E. 白细胞计数升高，中性粒细胞比例升高
27. 胰腺癌时能直接观察十二指肠壁和壶腹有无癌肿浸润，并可收集胰液做细胞学检查及壶腹部活检做病理检查的影像学检查是
A. CT B. B超
C. 内镜超声 D. ERCP
E. B超下经皮细针穿刺
28. 急性化脓性腹膜炎最主要的临床表现是
A. 恶心呕吐 B. 腹痛
C. 体温升高 D. 呼吸急促
E. 便血
29. 最多见的肛管直肠周围脓肿是
A. 肛门周围脓肿 B. 马蹄形脓肿
C. 括约肌间脓肿 D. 肛提肌上脓肿
E. 坐骨直肠窝脓肿
30. B型超声对哪种结石诊断准确率高
A. 胆囊结石 B. 胆总管结石
C. 肾结石 D. 肝内胆管结石
E. 胰腺结石
31. 关于结肠癌，下列哪项是错误的
A. 结肠癌可伴有贫血和发热
B. 根据肿瘤形态，可分为肿块型，浸润型，溃疡型
C. 左半结肠癌以全身症状为主
D. 结肠癌的血行转移，多转移至肝
E. 结肠癌淋巴转移首先转移到结肠旁淋巴结
32. 下列有关齿状线解剖意义的描述中错误的是
A. 齿状线以上是黏膜，以下是皮肤
B. 齿状线以上发生的痔是内痔，以下的痔是外痔
C. 齿状线以上淋巴引流入髂外淋巴结，以下入腹股沟淋巴结
D. 齿状线以上由直肠上、下动脉供血，以下由肛管动脉供应
E. 齿状线以上受自主神经支配，以下属阴部内神经支配
33. 左半结肠癌急性梗阻时，下列措施中哪项不恰当
A. 注意纠正水电解质及酸碱失衡
B. 注意腹部情况，预计病变严重程度，早插胃管，进行胃肠减压
C. 稍准备好便手术，先作横结肠造口术，二期再作左半结肠切除吻合术
D. 胃肠减压后，待梗阻解除便作左半结肠切除术
E. 急诊作心电图，血生化等检查，应初步纠正酸中毒后手术
34. 左侧结肠癌合并急性肠梗阻时，最合理的手术方法应是
A. 腹腔镜手术
B. 左半结肠癌根治术
C. 横结肠癌根治术
D. 先行横结肠造口术，以后二期再行根治性左半结肠切除术
E. 先行胃肠减压，后期再做左半结肠癌根治术
35. 关于急性小肠扭转临床表现的描述，错误的是
A. 多见于老年人
B. 多发生于饱餐后剧烈活动
C. 起病急骤，腹痛剧烈

做题随手记

- D. 频繁呕吐
E. 可出现休克
36. 以下哪项提示急性胰腺炎预后不良
A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒
C. 低钾血症 D. 低钙血症
E. 低镁血症
37. 病变好发于直肠和乙状结肠的是
A. 肠结核 B. 肠梗阻
C. 克罗恩病 D. 结核性腹膜炎
E. 溃疡性结肠炎
38. 下列可协助诊断急性阑尾炎的体征中, 哪项正确
A. 不同患者右下腹压痛点位置一致
B. 右下腹腹膜刺激征提示阑尾炎症已不是早期阶段
C. 腰大肌试验阳性提示阑尾位置较浅
D. 闭孔内肌试验阳性提示阑尾位置较深
E. 结肠充气试验阴性可排除阑尾炎诊断
39. 老年急性阑尾炎的临床特征是
A. 显著腹肌紧张
B. 常有寒战、高热
C. 腹痛、恶心明显
D. 右下腹压痛明显
E. 阑尾容易缺血、坏死
40. 细菌性肝脓肿, 哪项是正确的
A. 起病急, 体温可高达 39~40℃
B. 70%为血源性
C. 大部分病例, 细菌沿门静脉入肝
D. 肝区部有剧烈的绞痛
E. 有左胸腔积液
41. 为了防治脂肪肝, 要注意增加食物中的
A. 蛋白质 B. 粗纤维
C. 卵磷脂 D. 淀粉
E. 糖
42. 最能说明肝硬化患者存在门脉高压的表现是
A. 腹痛 B. 消化不良
C. 呕吐 D. 痔核形成
E. 食管静脉曲张
43. 下列哪项属于股疝的常见特点
A. 多见于中老年男性
B. 疝块较大
C. 疝块呈锥形隆起
D. 咳嗽冲击感明显
E. 容易嵌顿、容易绞窄
44. 下列哪项符合继发性腹膜炎腹痛特点
A. 持续性剧痛
B. 间断疼痛
C. 疼痛固定在原发病部位
D. 变换体位可缓解腹痛
E. 体温升高发生在腹痛之前
45. 下列哪项不属于肝硬化患者肝功能减退的临床表现
A. 齿龈出血 B. 脾大
C. 黄疸 D. 浮肿
E. 肝掌
46. 血清壁细胞抗体阳性多见于
A. 慢性萎缩性胃窦胃炎
B. 慢性萎缩性胃体胃炎
C. 胃溃疡
D. 胃癌
E. 急性糜烂性胃炎
47. 关于 A 型胃炎, 下列哪项是恰当的
A. 大多数由幽门螺杆菌感染引起
B. 较常见
C. 病变主要累及胃体和胃底
D. 发病和遗传因素无关
E. 不易导致贫血
48. 渗出性结核性腹膜炎最佳的强化治疗方案是
A. 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素
B. 异烟肼、利福平
C. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸、糖皮质激素
D. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸加手术腹腔引流
E. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸
49. 发生哪一项, 提示重症急性胰腺炎
A. 消化道出血 B. 假性囊肿
C. 严重胆道感染 D. 持久高血糖
E. C-反应蛋白升高
50. 诊断幽门梗阻最有价值的体征是

做题随手记

- A. 振水音阳性 B. 肠鸣音亢进
C. 上腹部膨隆 D. 明显脱水
E. 上腹部固定压痛
51. 脂肪性肝病治疗的首要目标是
A. 逆转肝细胞脂肪变, 减少胆囊炎和胆结石的发生
B. 纠正代谢紊乱, 防治 2 型糖尿病和心血管事件
C. 防治 NASH, 阻止肝纤维化进展
D. 减少肝硬化的发生
E. 保肝抗炎药物治疗
52. 根除幽门螺杆菌治疗后, 不宜选用的复查方法是
A. ^{13}C 或 ^{14}C 尿素呼气试验
B. 血清幽门螺杆菌抗体检查
C. 组织学检查
D. 快速尿素酶试验
E. 幽门螺杆菌培养
53. 右下腹麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张是急性阑尾炎的典型体征, 其发生的主要机制是
A. 炎症致盲肠痉挛 B. 内脏神经反射
C. 炎症致阑尾痉挛 D. 阑尾腔压力增高
E. 炎症刺激壁层腹膜
54. 肝肾综合征最重要的临床表现是
A. 黄疸加深 B. 腹水加重
C. 少尿、无尿 D. 意识障碍
E. 出现恶心、呕吐
55. 关于十二指肠溃疡的治疗, 哪项是主要治疗措施
A. 少食多餐
B. 休息
C. 抑制胃酸和根除 Hp
D. 早期手术
E. 中枢镇痛
56. 胆总管的血液供应主要来自
A. 肝固有动脉 B. 胆囊动脉
C. 胃十二指肠动脉 D. 肝右动脉
E. 肝左动脉
57. 对鉴别上、下消化道出血有帮助的是
A. 大便潜血阳性 B. 血尿素氮升高
C. 血肌酐升高 D. 血色素下降
E. 血氨升高
58. 门静脉高压症主要临床表现是
A. 男性乳房发育 B. 肝掌
C. 肝病面容 D. 腹水
E. 蜘蛛痣
59. 治疗肝硬化腹水时提高血浆胶体渗透压的方法是静脉输液
A. 高渗葡萄糖 B. 等渗葡萄糖
C. 白蛋白 D. 生理盐水
E. 复方氨基酸
60. 目前应用最多的直肠癌根治术是
A. 局部切除术 B. Miles 手术
C. Dixon 手术 D. Hartmann 手术
E. 毕 II 式手术
61. 慢性胃炎的发病机制中, 与幽门螺杆菌感染无关的因素是
A. 产生胃壁细胞抗体
B. 在胃黏液上具有 Hp 靶位
C. 细胞毒素作用
D. 免疫反应
E. 产生多种酶及代谢产物
62. 关于轻症急性胰腺炎的治疗哪项不合理
A. 限制液体入量 B. 禁食、胃肠减压
C. 抑酸 D. 喹诺酮抗感染
E. 维持酸碱平衡
63. 晚期肝硬化最严重的并发症是
A. 肝肾综合征 B. 肝性脑病
C. 上消化道出血 D. 原发性肝癌
E. 电解质紊乱
64. 鉴别腹股沟斜疝和直疝错误的叙述是
A. 斜疝呈椭圆或梨形
B. 直疝呈半球形, 基底较宽
C. 斜疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
D. 直疝疝囊颈在腹壁下动脉内侧
E. 直疝常见老年人
65. 急性化脓性腹膜炎病人术后, 采取半卧位的目的, 哪项是错误的
A. 减少毒素吸收, 防止感染性休克发生
B. 增加肺活量, 减少肺部并发症

做题随手记

- C. 渗出物流至盆腔, 吸收快, 避免形成盆腔脓肿
 D. 腹肌松弛, 减少切口疼痛
 E. 减少膈下脓肿发生的机会
66. 下列慢性胃炎的病理改变, 属于癌前病变的是
 A. 粘膜重度萎缩, 腺体减少
 B. 假幽门腺化生
 C. 肠上皮化生
 D. 重度不典型增生
 E. 淋巴滤泡增生
67. 消化性溃疡慢性穿孔最常见的部位是
 A. 胃大弯 B. 胃小弯
 C. 幽门管 D. 十二指肠后壁
 E. 胃角
68. 胆总管结石梗阻后最典型的临床表现是
 A. Whipple 三联征 B. Charcot 三联征
 C. Grey-Turner 征 D. Murphy 征阳性
 E. Cullen 征
69. 胃大部切除术后 24 小时以内的胃出血, 最常见的原因是
 A. 凝血障碍 B. 吻合口张力过高
 C. 术中止血不确切 D. 吻合口感染
 E. 吻合口粘膜脱落坏死
70. 发生应激性溃疡最常见的部位是
 A. 十二指肠 B. 空肠
 C. 口腔 D. 幽门管
 E. 胃
71. 重度萎缩性胃体胃炎患者表现为
 A. 胃酸明显减少 B. 胃酸明显增高
 C. 胃酸轻度增高 D. 胃酸轻度减少
 E. 胃酸正常或减少
72. 腹部损伤时作诊断性腹腔穿刺, 抽出不凝固血液, 最可能的诊断为
 A. 空腔脏器破裂
 B. 误穿入腹腔血管
 C. 前腹壁血肿
 D. 实质性器官破裂
 E. 后腹膜间隙血肿
73. 下列关于腹股沟疝的叙述, 错误的是
 A. 滑疝多见于右侧
 B. 嵌顿性疝多发生在股疝
 C. 直疝的疝内容物多为小肠和大网膜
 D. 难复性疝的主要特点是疝块不能完全还纳
 E. 绞窄性痛疼痛减轻, 但肿块仍在, 说明病情好转
74. 下列哪项应高度怀疑胃溃疡癌变
 A. 并发上消化道出血
 B. 血清胃泌素下降
 C. 血清抗壁细胞抗体阳性
 D. 五肽胃泌素试验显示胃酸缺乏
 E. X 线钡餐显示多发性溃疡
75. 关于胃溃疡, 下列说法错误的是
 A. 胃溃疡主要是因为防御、修复因素减弱所致
 B. 胃溃疡多为空腹疼痛, 进食后缓解
 C. 胃溃疡主要发生在胃角和胃窦小弯侧
 D. 胃溃疡边缘光整, 底部洁净, 有肉芽组织构成, 表面覆盖有灰色纤维渗出物
 E. 胃溃疡病人存在胃运动障碍, 表现为胃排空延迟和十二指肠胃反流
76. 急性阑尾炎可发生的并发症不包括下列哪项
 A. 脓毒症 B. 腹腔内出血
 C. 内瘘形成 D. 外瘘形成
 E. 门静脉炎
77. 阑尾的神经由交感神经纤维经腹腔丛和以下哪个神经传入
 A. 内脏大神经 B. 内脏小神经
 C. 第 10 胸神经 D. 第 12 胸神经
 E. 坐骨神经
78. 胃十二指肠溃疡外科手术的绝对适应证是
 A. 溃疡病穿孔 B. 应激性溃疡
 C. 瘢痕性幽门梗阻 D. 胃后壁溃疡
 E. 溃疡病出血
79. 恶性肿瘤种植性转移到盆腔, 最多见的是
 A. 胃癌 B. 肝癌
 C. 乳腺癌 D. 胆管癌
 E. 食管癌
80. 肠结核的治疗中, 下列哪一项不正确
 A. 为使病人早日康复, 防止耐药性的产生,

做题随手记