



扫我看视频

一、最佳选择题

1. 药学服务具有很强的社会属性，其中的含义是指药学服务的对象是
 - A. 住院患者
 - B. 门诊患者
 - C. 家庭患者
 - D. 社区患者
 - E. 所有用药的人员
2. 药学服务的最基本要素是
 - A. 用药教育
 - B. 用药咨询
 - C. 调配处方
 - D. 药物信息的提供
 - E. 与药物有关的服务
3. 药师必须遵守的基本准则是
 - A. 尊重患者隐私
 - B. 遵循社会伦理规范
 - C. 有良好的人文道德素养
 - D. 尽力为患者提供专业、真实、准确的信息
 - E. 以对药品质量负责、保证用药安全有效为基本准则
4. 有关药学服务的概念，叙述错误的是
 - A. 提供与用药有关的服务

关于“扫我看视频”，你需要知道——

亲爱的读者，本书中各章节均有赠送课程——扫我看视频。下载并安装“医学教育网”APP，扫描对应二维码，即可观看学习（前10次试听免费）。

若想获取更多的视频课程，建议选购正保医学教育网上辅导课程，详情参见正保医学教育网（<http://www.med66.com>）招生方案。

- B. 既有直接服务，也有间接服务
C. 既有实物形式，也有信息形式服务
D. 服务于治疗性药物和预防性药物，不服务于保健用药
E. 涵盖了用药相关的全部需求
5. 以下不属于药学服务新进展的是
- A. 药物重整
B. 药物治疗管理
C. 个体化药物治疗
D. 药物警戒
E. 药品不良反应
6. 药物评价不包括以下哪项
- A. 质量
B. 有效性
C. 安全性
D. 经济性
E. 适宜性
7. 药师应具备的专业技能不包括
- A. 审核处方
B. 调配处方
C. 药品管理
D. 发药与用药教育
E. 药物治疗方案的制定
8. 下列关于药学服务的最终目的说法最正确的是
- A. 提高患者用药的安全性
B. 提高患者用药的有效性
C. 提高患者用药的实用性
D. 提高患者用药的经济性
E. 改善和提高人类生活质量
9. 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为，不包括
- A. 严格审核处方
B. 仔细核对药品
C. 进行用药指导
D. 修改错误处方
E. 用药咨询
10. 他汀类在治疗剂量下与环孢素合用容易导致肌痛或肌无力，用药期间应注意监测
- A. 肌酸激酶
B. 凝血酶原时间
C. 肌红蛋白
D. 嗜酸性粒细胞
E. 尿酸
11. 对慢性病患者进行长期管理与服务，以达到优化药物治疗和提高患者治疗效果的目的，这种新发展起来的药学服务形式称为
- A. 药学干预
B. 药物重整
C. 药物治疗管理
D. 药物警戒
E. 不良反应监测

12. 不宜选用葡萄糖注射液作为溶剂的是
- A. 青霉素
B. 红霉素
C. 磷霉素
D. 环丙沙星
E. 甲硝唑
13. 药师参与临床药物治疗提供药学服务的重要方式和途径的是
- A. 处方调剂
B. 治疗药物监测
C. 静脉药物配置
D. 药品管理
E. 药物不良反应监测和报告
14. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。在药学信息服务中，三级信息源资料的最突出的优势是
- A. 内容全面、细致
B. 内容广泛、使用方便
C. 提供的信息丰富、详实
D. 能看到研究细节如试验设计、数据处理等
E. 很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选
15. 药师应告知医师“合理用药信息”的事例是
- A. 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症
B. 培氟沙星引起跟腱炎、合用糖皮质激素可致跟腱断裂
C. 长时间、大剂量应用头孢菌素类引起牙龈出血、手术创面渗血等反应
D. 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5-羟色胺综合征
E. 治疗剂量的他汀类药物与环孢素、酮康唑等 CYP3A4 抑制剂合用显著增高血浆水平
16. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是
- A. 6 小时以上
B. 4 小时以上
C. 2 小时以上
D. 1 小时以上
E. 0.5 小时以上
17. 静脉滴注氯化钾注射液的适宜浓度是
- A. 0.1%~0.2%
B. 0.1%~0.3%
C. 0.2%~0.4%
D. 0.2%~0.5%
E. 0.3%~0.5%
18. 可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于
- A. 一级信息
B. 二级信息
C. 三级信息
D. 四级信息
E. 五级信息

19. 药品说明书属于
- A. 一级信息
B. 二级信息
C. 三级信息
D. 四级信息
E. 五级信息
20. 不属于护士用药咨询的内容的是
- A. 口服药物的剂量
B. 注射药物的配制溶剂
C. 稀释容积与浓度
D. 静滴速度
E. 新药临床评价
21. 以下药物不需要治疗药物监测的是
- A. 地高辛
B. 氨基糖苷类抗生素
C. 环孢素
D. 呋塞米
E. 吗替麦考酚酯
22. 以下文献中，主要提供药品标准相关信息的是
- A. 《中国国家处方集》
B. 《中华人民共和国药典》
C. 《新编药物学》
D. 《梅氏药物副作用》
E. 《马丁代尔药物大典》
23. 细菌性脑膜炎患者应用万古霉素治疗，快速大剂量静脉滴注后可能会产生
- A. 瑞夷综合征
B. 灰婴综合征
C. 药源性流感样综合征
D. 5-羟色胺综合征
E. 红人综合征
24. 应用酚妥拉明 20mg+多巴胺 20mg+呋塞米 20mg，加入 5% 葡萄糖注射液 250ml，静脉滴注过程中可出现黑色沉淀，原因是
- A. 呋塞米氧化变黑
B. 多巴胺氧化变黑
C. 酚妥拉明氧化变黑
D. 葡萄糖氧化变黑
E. 酚妥拉明与葡萄糖发生反应，产物为黑色
25. 下列与用药有关的内容中，属于患者用药咨询的主要内容是
- A. 自我保健
B. 新药信息
C. 药品适应证
D. 治疗药物监测
E. 注射剂配制溶媒、浓度
26. 与二、三级信息相比，一级信息的特点是
- A. 内容更新
B. 内容广泛，使用方便
C. 阅读大量的一级文献要花费的时间较短
D. 对一个具体的问题提供的信息简明扼要

- E. 每一个索引或文摘服务所提供数据库中的杂志量都是有限的
27. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是
- 合理用药信息
 - 射剂配制溶媒、浓度
 - 用药后预计起效时间、维持时间及疗效
 - 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
 - 所用的药品近期发现不良反应或药品说明书有相关修改
28. 药师应告知医师“血药浓度监测是提高治疗效果的重要措施”的事例是
- 替加色罗存在心绞痛
 - 利巴韦林致畸与肿瘤
 - 阿昔洛韦致急性肾衰竭
 - 地高辛用于肾功能不全者需监测血药浓度
 - 含钆造影剂用于肾功能不全者致肾源性纤维化和皮肤纤维化
29. 与头孢曲松钠注射液混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的注射液是
- 氯化钠注射液
 - 葡萄糖注射液
 - 葡萄糖氯化钠注射液
 - 乳酸钠林格注射液
 - 氯化钾注射液
30. 可增加患者出现高血糖症或低血糖症隐患的药品是
- 培氟沙星
 - 拉氧头孢
 - 利巴韦林
 - 加替沙星
 - 尼美舒利
31. 应用氯化钾注射液必须切记的注意事项是
- 一般静脉滴注氯化钾溶液不宜超过 0.1%
 - 不宜鞘内注射/小壶冲入给药
 - 不宜稀释后静脉滴注
 - 不宜直接肌内注射
 - 禁止直接静脉注射
32. 三级信息的特点不包括
- 内容广泛，使用方便
 - 含有疾病与药物治疗的基础知识
 - 提供的内容是该领域最新的
 - 内容不够细致
 - 可能存在作者的理解错误
33. 发表在《中国药理学学报》上有关紫杉醇的综述文章，属于
- 五级信息
 - 四级信息
 - 三级信息
 - 二级信息
 - 一级信息
34. 《中国 2 型糖尿病防治指南》属于几级信息

- A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
E. 五级
35. 下列药物信息资源中，归属一级文献资料的是
A. 新编药理学
B. 药物不良反应杂志
C. 中国药学文摘
D. 中国药学年鉴
E. 中国药典临床用药须知
36. 有关一级信息的特点描述，错误的是
A. 内容比二、三级信息更新
B. 含有研究的具体细节
C. 对读者专业水平要求高
D. 结论正确
E. 阅读起来花费时间长
37. 下列药物信息中属于一级信息的是
A. 杂志
B. 药典
C. 摘要
D. 参考书
E. 数据库
38. 三级信息的缺点是
A. 有些内容的论述不够全面细致
B. 内容准确，没有偏倚
C. 内容更新，快速准确
D. 作者转录数据准确
E. 提供内容全面细致
39. 欲了解更多的药物不良反应信息，优先查阅的文献是
A. 《中国国家处方集》
B. 《中华人民共和国药典》
C. 《新编药理学》
D. 《梅氏药物副作用》
E. 《马丁代尔药物大典》

二、配伍选择题

1~2

- A. 认真聆听
B. 关注特殊人群
C. 注意掌握时间
D. 注意语言的表达
E. 双向交流的作用

以下描述分别说明沟通技能的何种作用

1. 老年人的视力、听力和用药依从性差，记忆力减退，应反复交代药品的用法用量

和禁忌证直至患者完全明白

2. 药师的回答可使患者获得有关用药的指导，同时，药师也可从沟通中获取患者的用药感受、问题及用药规律

3~5

- A. 摘要
 - B. 前言
 - C. 结果
 - D. 讨论
 - E. 材料与方法
3. “是否基于试验结果”是评价
4. “描述是否充分、详细、准确”是评价
5. “方法与研究对象是否科学与规范”是评价

6~7

- A. 《梅氏药物副作用》
- B. 《药物治疗学》
- C. 《中华人民共和国药典》
- D. 《药物流行病学》
- E. 《注射药物手册》

药师在提供药物信息咨询服务时常需查阅各种资料，除药品说明书之外，还可以查阅多种常用药用信息资料

- 6. 查阅药物质量检验标准可首选的书籍是
- 7. 查阅输液剂的配伍禁忌可首选的书籍是

8~9

- A. 氯化钾
 - B. 维生素 K
 - C. 硝普钠
 - D. 苯妥英钠
 - E. 氟罗沙星
8. 在滴注过程中药液必须遮光的是
9. 切勿直接静脉注射，应于临用前稀释的是

10~12

- A. 沉淀、浑浊
 - B. 效价降低
 - C. 过敏反应
 - D. 红色络合物
 - E. 析出晶体
10. 头孢菌素葡萄糖注射液中加入盐酸
11. 瑞替普酶与葡萄糖注射液配伍
12. 青霉素与葡萄糖溶液配伍

13~19

- A. 一级信息源
- B. 二级信息源
- C. 三级信息源
- D. 四级信息源

E. 互联网站

13. “对一个具体问题提供的信息简明、扼要”的是
14. “能很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选”的是
15. “信息新、有研究细节如试验设计、数据处理等资料”的是
16. “提供信息不全面，一般需同时使用几种检索工具”是指
17. “单一试验提供信息，其结果或结论有误将误导读者”是指
18. “有时需要利用所提供的参考文献去验证信息的正确性”是指
19. “方便获取许多药物信息，但是这些信息质量良莠不齐”是指

20~21

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 阿昔洛韦 | B. 两性霉素 B |
| C. 维生素 K | D. 盐酸万古霉素 |
| E. 硫酸庆大霉素 | |
20. 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是
 21. 在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

22~25

- | | |
|---------|--------|
| A. 新颖性 | B. 权威性 |
| C. 归因性 | D. 合理性 |
| E. 网站人员 | |
22. 网站的内容是否及时更新是指
 23. 指明其资料来源通过超链接指向其材料来源是指
 24. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品是指
 25. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的人员是指

26~29

- A. 抗菌药物的合理使用
 - B. 减肥、补钙、补充营养素
 - C. 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
 - D. 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
 - E. 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
26. 护士用药咨询的内容是
 27. 医师用药咨询的内容是
 28. 患者用药咨询的内容是
 29. 公众用药咨询的内容是

三、综合分析选择题

1~3

患者，男，72岁，因咳嗽、发烧入院，经检查后确诊为社区获得性肺炎，医生采用静脉滴注头孢曲松治疗。

1. 护士在给病人输液时，能够使用的注射液是
 - A. 复方氯化钠注射液
 - B. 乳酸钠林格氏注射液
 - C. 氯化钙注射液
 - D. 氯化钠注射液
 - E. 葡萄糖酸钙注射液
2. 如果患者长期使用该药治疗，需要密切关注的不良反应是
 - A. 溶血功能障碍
 - B. 凝血功能障碍
 - C. 肝功能障碍
 - D. 心脏功能障碍
 - E. 甲状腺功能障碍
3. 治疗时，如果加用下列哪一种药物，会增强治疗效果
 - A. 奥美拉唑
 - B. 克拉维酸钾
 - C. 甲氧苄啶
 - D. 头孢氨苄
 - E. 两性霉素 B

四、多项选择题

1. 以下有关药学服务的目的叙述中，正确的有
 - A. 提高用药的有效性
 - B. 提高用药的安全性
 - C. 提高用药的经济性
 - D. 提高用药的适宜性
 - E. 向公众提供直接的、负责的药学服务
2. 下列选项中不宜使用氯化钠注射液溶解的药物包括
 - A. 多烯磷脂胆碱
 - B. 奥沙利铂
 - C. 哌库溴铵
 - D. 氟罗沙星
 - E. 红霉素
3. 药学服务的重要人群包括
 - A. 慢性病患者
 - B. 终生用药者
 - C. 病情复杂患者
 - D. 特殊人群
 - E. 需要监测给药的患者
4. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

- A. 血液透析者
 - B. 肝肾功能不全者
 - C. 小儿、老人、妊娠及哺乳期妇女
 - D. 药物治疗窗窄、需要做监测的患者
 - E. 应用特殊剂型、特殊给药方式的患者
5. 药师在开展药学服务时应特别关注老年人用药，应做到
- A. 反复交代药物的用法用量，直至患者完全明白
 - B. 对药名或药盒包装容易混淆的药物，应贴附提示标签
 - C. 有条件的应配备分剂量药盒
 - D. 尽量选择每日仅服用1~2次的药品
 - E. 尽量采用专业术语让患者充分了解药物信息
6. 药师应提供的药学服务内容包括
- A. 处方点评
 - B. 药品保障供应
 - C. 药学干预
 - D. 药物重整
 - E. 药物治疗管理
7. 现代药学发展主要经历的三个阶段包括
- A. 全程化药学服务阶段
 - B. 以药品供应为中心的传统阶段
 - C. 以提供药物信息和知识为中心的药学服务阶段
 - D. 参与临床用药实践、促进合理用药的临床药学阶段
 - E. 以患者为中心、强调改善患者生命质量的药学服务阶段
8. 对从事药学服务的药师的“职业道德”的要求有
- A. 遵循社会伦理规范
 - B. 有良好的交流沟通能力
 - C. 有良好的人文道德素养
 - D. 尽力为患者提供专业、真实、准确、全面的信息
 - E. 以对药品质量负责、保证用药安全有效为基本准则



扫我看视频

一、最佳选择题

1. 以下有关处方具有法律性的叙述中，最正确的是
 - A. 药师只具有调配处方权
 - B. 医师只具有开具处方权
 - C. 因处方造成医疗事故，医师应负有法律责任
 - D. 因处方造成医疗差错，药师应负有法律责任
 - E. 因处方造成医疗差错，医师、药师分别负有相应的法律责任
2. 以下处方的“后记”内容中，不正确的是
 - A. 药品费用
 - B. 医师签章
 - C. 特殊要求项目
 - D. 调配药师签章
 - E. 发药药师签章
3. 麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是
 - A. 诊断
 - B. 患者姓名、性别
 - C. 药品名称、剂型、规格、数量
 - D. 患者身份证明编号
 - E. 医院名称、就诊科室、就诊日期
4. 依据处方的含义及其重要意义，属于处方的其他医疗文书是
 - A. 临床诊断书
 - B. 药品出库单
 - C. 病区领药单
 - D. 病区用药医嘱单
 - E. 患者化验报告单
5. 目前，一些医疗机构已经利用计算机开具、传递处方，但是应该只限于
 - A. 普通处方
 - B. 儿科处方
 - C. 急诊处方
 - D. 病区用药医嘱单
 - E. 二类精神药品处方
6. 具有肝药酶抑制作用的药物是
 - A. 异烟肼
 - B. 苯妥英钠
 - C. 苯巴比妥
 - D. 卡马西平