



冲刺模拟试卷（一）



扫我看视频

一、最佳选择题

- 可引起齿龈增生的抗癫痫药是
 - 卡马西平
 - 苯巴比妥
 - 丙戊酸钠
 - 扑米酮
 - 苯妥英钠
- 某患者最近服用某药物后体重有所增加，可能增加体重的药物是
 - 硝酸异山梨酯
 - 米氮平
 - 阿托伐他汀
 - 二甲双胍
 - 肝素
- 不影响血小板聚集及凝血机制的药物是
 - 罗非昔布
 - 吲哚美辛
 - 美洛昔康
 - 布洛芬
 - 对乙酰氨基酚
- 用于解救麻醉性镇痛药急性中毒的药物是
 - 对乙酰氨基酚
 - 美沙酮

关于“扫我看视频”，你需要知道——

亲爱的读者，在本书各套试卷开始页附有赠送课程（扫我看视频）。扫描对应二维码，下载并安装“医学考试电子书APP”，即可观看学习。

若想获取更多的视频课程，建议选购正保医学教育网网上辅导课程，详情参见正保医学教育网（<http://www.med66.com>）招生方案。

- C. 芬太尼
E. 纳洛酮
2. 具有类似磺胺结构, 有磺胺药过敏史者应慎用的非甾体药物是
- A. 吲哚美辛
B. 阿司匹林
C. 对乙酰氨基酚
D. 双氯酚酸
E. 塞来替布
3. 秋水仙碱可导致哪种维生素可逆性的吸收不良
- A. 维生素 B₁
B. 维生素 B₁₂
C. 维生素 C
D. 维生素 B₆
E. 维生素 A
4. 属于多糖纤维素分解剂的是
- A. 乙酰半胱氨酸
B. 溴己新
C. 羧甲司坦
D. 茶碱
E. 愈创甘油醚
5. 哮喘急性发作使用的药物中, 最适宜的给药途径是
- A. 吸入给药
B. 经皮给药
C. 肌肉注射
D. 静脉滴注
E. 口服给药
6. 奥美拉唑减少胃酸分泌主要通过
- A. 抑制 H⁺, K⁺-ATP 酶的活性
B. 阻断组胺 H₂受体
C. 阻断 5-HT 受体
D. 阻断 DA 受体
E. 阻断 M 受体
7. 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻, 具有固定和清除多种病原体和毒素的药物是
- A. 地芬诺酯
B. 洛哌丁胺
C. 番泻叶
D. 蒙脱石
E. 甘油
8. 患者, 男, 53 岁, 长期服用普萘洛尔, 如需停药, 整个过程至少需要
- A. 7 天
B. 10 天
C. 14 天
D. 30 天
E. 60 天

12. 具有抑制磷酸二酯酶、扩张血管和正性肌力作用的药物是
- A. 硝普钠
B. 地高辛
C. 肼屈嗪
D. 多巴胺
E. 米力农
13. 服用他汀类药物需要监测肌毒性, 该临床指标是
- A. 乳酸脱氢酶
B. 肌酸激酶
C. 碱性磷酸酶
D. 尿淀粉酶
E. 氨基转移酶
14. 通过影响血管通透性而发挥促凝血作用的药物是
- A. 氨基己酸
B. 酚磺乙胺
C. 卡巴克络
D. 鱼精蛋白
E. 矛头腹蛇血凝酶
15. 服用华法林初期, 应当及时监测凝血指标, 将国际标准化比值(INR)目标控制在
- A. 2.0~3.0
B. 3.0~4.5
C. 4.0~5.0
D. 5.5~6.0
E. 7.0~8.0
16. 对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用的药物是
- A. 替格瑞洛
B. 利伐沙班
C. 氯吡格雷
D. 替罗非班
E. 噻氯匹定
17. 可以治疗甲氨蝶呤引起的巨幼细胞贫血的药物是
- A. 叶酸
B. 烟酸
C. 维生素 B₁₂
D. 硫酸亚铁
E. 亚叶酸钙
18. 不能减小前列腺的体积, 也不能降低 PSA 水平, 但可松弛前列腺平滑肌, 缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是
- A. 西地那非
B. 他达拉非
C. 坦索罗辛
D. 非那雄胺
E. 度他雄胺
19. 丙硫氧嘧啶的作用, 正确的是

- A. 影响碘的摄取
B. 抑制促甲状腺素(TSH)的分泌
C. 作用于甲状腺细胞膜受体
D. 抑制已合成的甲状腺素的释放
E. 抑制甲状腺激素的生物合成
20. 属于短效胰岛素和短效胰岛素类似物的是
A. 甘精胰岛素
B. 地特胰岛素
C. 赖脯胰岛素
D. 普通胰岛素
E. 低精蛋白锌胰岛素
21. 用于治疗妊娠妇女子痫和先兆子痫的首选药物是
A. 卡托普利
B. 美托洛尔
C. 硫酸镁
D. 丙戊酸钠
E. 卡马西平
22. 用于治疗血氨升高所致的精神症状的药物是
A. 精氨酸
B. 维生素 A
C. 维生素 E
D. 氯化钠
E. 果糖
23. 治疗鼠疫宜选用的药物是
A. 庆大霉素
B. 阿莫西林
C. 链霉素
D. 阿米卡星
E. 奈替米星
24. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是
A. 氯霉素
B. 环丙沙星
C. 磺胺嘧啶
D. 阿奇霉素
E. 呋喃妥因
25. 可用维生素 B₆防治异烟肼的哪项不良反应
A. 肝损伤
B. 过敏反应
C. 周围神经炎
D. 胃肠道反应
E. 粒细胞减少
26. 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是
A. 甲硝唑有致畸和致突变作用
B. 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
C. 甲硝唑属于时间依赖性抗菌药物

- D. 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
 E. 服用甲硝唑期间禁止饮酒
27. 对利福平特点的叙述, 错误的是
 A. 对结核杆菌和麻风杆菌作用强
 B. 仅对细胞内的结核杆菌有作用
 C. 对繁殖期和静止期的结核杆菌均有效
 D. 对耐药金黄色葡萄球菌有强大的抗菌作用
 E. 低浓度时抑菌, 高浓度时杀菌
28. 属于抗乙型肝炎病毒药的是
 A. 拉米夫定
 B. 利巴韦林
 C. 扎那米韦
 D. 奥司他韦
 E. 金刚烷胺
29. 属于生物制剂类广谱抗病毒药的是
 A. 奥司他韦
 B. 干扰素
 C. 阿昔洛韦
 D. 利巴韦林
 E. 齐多夫定
30. 破坏疟原虫的生物膜及蛋白质, 最终导致虫体死亡的药物是
 A. 伯氨喹
 B. 青蒿素
 C. 乙胺嘧啶
 D. 氯喹
 E. 噻嘧啶
31. 通过抑制虫体乙酰胆碱, 使虫体肌肉麻痹的药物是
 A. 哌嗪
 B. 乙胺嘧啶
 C. 甲苯咪唑
 D. 噻嘧啶
 E. 吡喹酮
32. 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是
 A. 直接抑制拓扑异构酶, 并与拓扑异构酶形成复合物
 B. 干扰微管蛋白的合成
 C. 与 DNA 发生共价结合使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂
 D. 抑制二氢叶酸还原酶, 使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸
 E. 抑制芳香氨酶的活性
33. 可导致神经毒性(四肢麻木、腱反射消失)的药物是

- A. 氮芥
B. 长春新碱
C. 柔红霉素
D. 环磷酰胺
E. 博来霉素

34. 易发生超敏反应, 用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的药物是

- A. 柔红霉素
B. 长春碱
C. 紫杉醇
D. 博来霉素
E. 环磷酰胺

35. 通过阻断 $5-HT_3$ 受体而发挥止吐作用的药物是

- A. 氯丙嗪
B. 昂丹司琼
C. 多潘立酮
D. 西沙比利
E. 伊托必利

36. 首选用于降低夜间眼压的药物是

- A. 卡替洛尔
B. 拉坦前列素
C. 噻吗洛尔
D. 毛果芸香碱
E. 地匹福林

37. 5岁以下儿童首选的散瞳药是

- A. 2%后马托品
B. 1%硫酸阿托品
C. 10%去氧肾上腺素
D. 四环素可的松
E. 3%氧氟沙星

38. 治疗严重的外耳道炎宜选用的是

- A. 2%酚甘油
B. 3%硼酸乙醇
C. 全身应用广谱抗生素
D. 3%过氧化氢
E. 0.05%羟甲唑啉

39. 可用于治疗重度痤疮, 但妊娠期妇女禁用的是

- A. 阿奇霉素
B. 特比萘芬
C. 异维A酸
D. 环吡酮胺
E. 克罗米通

40. 手掌足跖损害可选用的药物是

- A. 维A酸胶囊
B. 0.05%倍他米松
C. 1%丁酸氢化可的松
D. 氟轻松软膏