

通关必刷 1200 题

第一章

执业药师与药学服务

一、最佳选择题

1. 药学服务的最基本要素是
 - A. 用药教育
 - B. 用药咨询
 - C. 调配处方
 - D. 药物信息的提供
 - E. 与“药物有关”的“服务”
2. 药师的专业技能中，哪项是药师最基本的工作技能
 - A. 调剂技能
 - B. 咨询与用药教育技能
 - C. 沟通技能
 - D. 药品管理技能
 - E. 药历书写技能
3. 药师应对“患者投诉”，下列说法不正确的是
 - A. 保存有形证据
 - B. 当事人需要亲自接待
 - C. 尽快将投诉人带离现场
 - D. 接待者应举止大方，行为端庄
 - E. 接待患者地点宜在办公室、会议室等场所
4. “沟通医、药、患的重要纽带”是
 - A. 处方调配
 - B. 个体化药物治疗
 - C. 静脉药物配置
 - D. 处方点评
 - E. 药物利用研究和评价
5. 以下不属于药学服务的特殊人群的是
 - A. 肝肾功能不全者
 - B. 听障、视障人士
 - C. 血液透析者
 - D. 老年人
 - E. 高血压

6. 中国医院协会药事管理专业委员会在全国临床药师培训中提出了教学药历的格式, 其内容不包括
- A. 用药记录
B. 用药评价
C. 患者基本信息
D. 主诉和现病史
E. 患者知情同意书
7. 书写药历是药师进行规范化药学服务的一项工作, 下列内容一般不作为药历内容的是
- A. 患者姓名
B. 药物过敏史
C. 临床诊断要点
D. 药物监测数据
E. 处方医师姓名
8. 下列关于药学服务(PS)目的的说法最正确的是
- A. 提高患者用药的安全性
B. 提高患者用药的有效性
C. 提高患者用药的实用性
D. 提高患者用药的经济性
E. 改善和提高人类生活质量
9. 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为, 不包括
- A. 严格审核处方
B. 仔细核对药品
C. 进行用药指导
D. 修改错误处方
E. 对药师进行新购入药品培训

二、配伍选择题

1~3

(中国药学会医院药学专业委员会推荐药历的模式与内容)

- A. 主治医师签名
B. 联合用药
C. 主要实验室检查数据
D. 药物治疗建设性意见
E. 患者生活习惯和联系方式
1. 归属“基本情况”的是
2. 归属“用药记录”的是
3. 归属“用药评价”的是

4~5

- A. 认真聆听
B. 关注特殊人群
C. 注意掌握时间
D. 注意语言的表达
E. 双向交流的作用

以下描述分别说明沟通技能的何种作用

4. 老年人的视力、听力和用药依从性差，记忆力减退，应反复交代药品的用法用量和禁忌证直至患者完全明白
5. 药师的回答可使患者获得有关用药的指导，同时，药师也可从沟通中获取患者的用药感受、问题及用药规律

三、多项选择题

1. 药学服务对象中的重要人群包括
 - A. 肝功能不全患者
 - B. 应用特殊剂型、特殊给药途径患者
 - C. 用药后易出现明显的药品不良反应者
 - D. 老年人、小儿、妊娠及哺乳期妇女
 - E. 用药周期长的慢性病患者，或需长期甚至终身用药者
2. 与患者的沟通技巧中下列叙述正确的是
 - A. 尽量避免使用专业术语
 - B. 尽量使用短句
 - C. 应尽可能延长谈话时间
 - D. 提供的信息不宜过多
 - E. 可以准备一些宣传资料
3. 药师从事药学服务的具体工作包括
 - A. 开具处方
 - B. 处方审核
 - C. 处方点评
 - D. 健康教育
 - E. 药物利用研究与评价
4. 药师在开展药学服务时应特别关注老年人用药，应做到
 - A. 反复交代药物的用法用量，直至患者完全明白
 - B. 对药名或药盒包装容易混淆的药物，应贴附提示标签
 - C. 有条件的应配备分剂量药盒
 - D. 尽量选择每日仅服用1~2次的药品
 - E. 尽量采用专业术语让患者充分了解药物信息
5. 药师进行药学服务应具备的专业技能包括
 - A. 沟通技能
 - B. 患者教育技能
 - C. 调剂技能
 - D. 疾病诊断技能
 - E. 药历书写技能
6. 药师应提供的药学服务内容包括
 - A. 处方点评
 - B. 药品保障供应
 - C. 药学干预
 - D. 药物重整

- E. 药物治疗管理
- 7. 现代药学发展主要经历的三个阶段包括
 - A. 全程化药学服务阶段
 - B. 以药品供应为中心的传统阶段
 - C. 以提供药物信息和知识为中心的药学服务阶段
 - D. 参与临床用药实践、促进合理用药的临床药学阶段
 - E. 以患者为中心、强调改善患者生命质量的药学服务阶段



一、最佳选择题



扫我看视频

1. 处方书写时，“隔日1次”可缩写为
 - A. qid.
 - B. qn.
 - C. bid.
 - D. qs.
 - E. qod.
2. 以下归属于不合理联合用药的情况是
 - A. 轻度感染给予广谱或最新抗菌药
 - B. 患者咳嗽，无感染诊断，给予阿奇霉素治疗
 - C. I类手术切口应用第三代头孢菌素
 - D. 在不了解抗菌药物的药动学参数等信息情况下用药
 - E. 对单一抗菌药物已能控制的感染应用2~3个抗菌药
3. 异烟肼与何种中成药联用会使其失去抗菌作用
 - A. 昆布片(碘)
 - B. 香连片(黄连)
 - C. 丹参片(丹参酮)
 - D. 消咳宁片(麻黄碱)
 - E. 蛇胆川贝液(苦杏仁苷)
4. 吗啡中毒用纳洛酮或纳屈酮解救的机制是
 - A. 协同作用
 - B. 敏感化作用

关于“扫我看视频”，你需要知道——

亲爱的读者，在本书中有部分重点章节下附有赠送课程（扫我看视频）。扫描对应二维码，下载并安装“医学考试电子书APP”，即可观看学习。

若想获取更多的视频课程，建议选购正保医学教育网网上辅导课程，详情参见正保医学教育网（<http://www.med66.com>）招生方案。

- C. 减少不良反应
D. 竞争性拮抗作用
- E. 非竞争性拮抗作用
5. 阿莫西林-克拉维酸钾组方的原理是
- A. 竞争性拮抗
B. 作用不同的靶点
- C. 促进机体的利用
D. 保护药品免受破坏
- E. 延缓或降低抗药性
6. 具有肝药酶抑制作用的药物是
- A. 异烟肼
B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥
D. 卡马西平
- E. 奥美拉唑
7. 以下所列审查处方结果中, 可判定为“用药不适宜处方”的是
- A. 字迹难以辨认
B. 无适应证用药
- C. 临床诊断缺项或书写不全
D. 未使用药品规范名称
- E. 无正当理由不首选国家基本药物
8. 以下情况可判为超常处方的是
- A. 单张门诊处方超过 5 种药品的
B. 使用“遵医嘱”字句
- C. 联合用药不适宜
D. 无正当理由超说明书用药
- E. 无正当理由不首选国家基本药物
9. 依据规定, 药库内的湿度是
- A. 药库内的湿度为 15%~30%
B. 药库内的湿度为 30%~45%
- C. 药库内的湿度为 35%~65%
D. 药库内的湿度为 35%~75%
- E. 药库内的湿度为 45%~75%
10. 下列药品中, 应该贮存在棕色玻璃瓶内的药品是
- A. 头孢拉定
B. 硫糖铝片
- C. 狂犬疫苗
D. 硝酸甘油片
- E. 脂肪乳
11. 在运输中应避免振荡的药品是
- A. 氨茶碱
B. 胰岛素
- C. 结合雌激素
D. 重组人促红细胞生成素
- E. 卡莫司汀注射液
12. 会使运动员情绪高涨、斗志昂扬, 还能产生欣快感, 能忍受竞技造成的伤痛, 并提高攻击力的药物是
- A. 可待因
B. 可卡因
- C. 阿米替林
D. 普萘洛尔

- A. 地高辛心脏毒性增强
B. 地高辛失效
C. 肝损害
D. 肾损害
E. 消化道出血
21. 重组人促红细胞生成素贮存时需要特别注意的是
A. 遮光
B. 密闭
C. 低温
D. 15℃以上
E. 不宜振摇
22. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5% 葡萄糖注射液 300ml 中, 临床要求给药速度是 60mg/h, 输注速度是
A. 15ml/h
B. 36ml/h
C. 45ml/h
D. 60ml/h
E. 83.3ml/h
23. 关于“四查十对”的描述, 正确的是
A. 查处方, 对临床诊断
B. 查用药合理性, 对配伍禁忌
C. 查药品, 对药名、剂型、规格、数量
D. 查配伍禁忌, 对临床诊断
E. 查用药合理性, 对科别、姓名、年龄
24. 一些权威性较高的二次文献记载, 应做皮肤敏感试验的药品是
A. 细胞色素 C 注射剂
B. 抗蛇毒血清注射剂
C. 链霉素注射剂
D. 青霉素钠注射剂
E. 鱼肝油酸钠注射剂
25. 在处方适宜性审核时, 应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌, 下列药物合用会有不良反应的是
A. 氨苄西林和舒巴坦
B. 阿莫西林和克拉维酸钾
C. 甲氧氯普胺和氯丙嗪
D. 苯丝肼和左旋多巴
E. 亚胺培南和西司他丁钠
26. 以下药品中不宜冷冻但应冷处贮藏的是
A. 复方甘草合剂
B. 双歧三联活菌制剂
C. 卡前列甲酯栓剂
D. 头孢他啶片
E. 葡萄糖注射液
27. 因刺激血红细胞的生长, 以提高血液中携氧量, 被长跑运动员用于提高成绩, 因此被列为兴奋剂管理的药物是
A. 苯丙酸诺龙
B. 可卡因

- C. 可待因
D. 人促红细胞生成素
- E. 麻黄碱
28. 下列描述中, 不正确的是
- A. 急诊处方印刷用纸颜色为淡黄色、右上角标注“急诊”
B. 麻醉药品处方印刷用纸颜色为淡红色、右上角标注“麻、精一”
C. 儿科处方印刷用纸颜色为淡蓝色、右上角标注“儿科”
D. 二类精神药品处方印刷用纸为白色, 右上角标注“精二”
E. 普通处方印刷用纸为白色, 右上角无标注
29. 处方的性质有
- A. 法律性、技术性和经济性
B. 技术性、合理性和安全性
C. 经济性、安全性和合理性
D. 技术性、有效性和法律性
E. 技术性、经济性和合法性
30. 以下项目与内容中, 属于处方前记的是
- A. 临床诊断、药品名称、剂型
B. 药品名称、剂型、金额
C. 患者姓名、性别、年龄和临床诊断
D. 医师、配方人、核对人与发药人签名
E. 药品名称、剂型、规格、数量和用法
31. O. U. 表示
- A. 饭后
B. 双眼
C. 口服
D. 每日
E. 生理盐水
32. 以下不属于高警示药品的是
- A. 胰岛素, 皮下或静脉注射
B. 0.9%的氯化钠注射液
C. 口服化疗药
D. 胺碘酮静脉注射液
E. 硫酸镁注射液
33. 一位巨幼细胞贫血患儿肌内注射维生素 B₁₂(0.5mg/ml), 一次给药剂量为 50μg, 应抽取的药液是
- A. 0.10ml
B. 0.20ml
C. 0.30ml
D. 0.40ml
E. 0.05ml
34. 单糖浆配方: 蔗糖 85g 加水溶解至 100ml。已知单糖浆的密度是 1.314g/ml, 求算单糖浆的重量比重量百分浓度是
- A. 45.0%(g/g)
B. 52.3%(g/g)
C. 64.7%(g/g)
D. 68.0%(g/g)
E. 73.3%(g/g)

35. 配置 10% 葡萄糖注射液 250ml, 现用 50% 和 5% 的葡萄糖注射液混合, 需要
- 50% 葡萄糖注射液 28ml 和 5% 葡萄糖注射液 222ml
 - 50% 葡萄糖注射液 72ml 和 5% 葡萄糖注射液 178ml
 - 50% 葡萄糖注射液 85ml 和 5% 葡萄糖注射液 165ml
 - 50% 葡萄糖注射液 94ml 和 5% 葡萄糖注射液 156ml
 - 50% 葡萄糖注射液 106ml 和 5% 葡萄糖注射液 144ml
36. 以下所列审查处方结果中, 可判定为“不规范处方”的是
- 重复给药
 - 有配伍禁忌
 - 新生儿未写明体重或日、月龄
 - 用法、用量或联合用药不适宜
 - 无正当理由不首选国家基本药物
37. 运动员参赛时禁用的药品是
- 维生素 C
 - 苯丙酸诺龙
 - 氨氯地平
 - 布洛芬
 - 青霉素
38. 下列维生素类药品中, 最易受光线影响的是
- 维生素 C 片
 - 维生素 B₁ 片
 - 维生素 B₆ 片
 - 复合维生素 B 片
 - 维生素 AD 制剂
39. 药品贮存的“凉暗处”是指
- 不超过 20℃
 - 不超过 15℃
 - 不超过 20℃、遮光
 - 不超过 15℃、遮光
 - 10℃ ~ 30℃
40. 以下药品中储存过程中不宜振摇的是
- 布洛芬
 - 维生素 AD
 - 多潘立酮
 - 重组人促红细胞生成素
 - 华法林
41. 以下有关项目中, 可作为药品外观质量检查的主要内容是
- 药品性状
 - 药品含量
 - 药品杂质检查
 - 药品内包装
 - 药品有效期
42. 以下属于高警示药品的是
- 0.9% 的氯化钠注射液
 - 5% 的葡萄糖注射液
 - 10ml 的灭菌注射用水
 - 维生素 C 泡腾片
 - 普萘洛尔, 静脉注射