



# 冲刺模拟试卷（一）



扫我看视频

## 一、最佳选择题

- 患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予
  - 氯苯那敏片
  - 对乙酰氨基酚片
  - 氯吡格雷片
  - 奥司他韦片
  - 苯海拉明片
- 《中华人民共和国药典》收录的处方属于
  - 法定处方
  - 医师处方
  - 协定处方
  - 急诊处方
  - 普通处方
- 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 0.9% 氯化钠注射液 250ml 后，出现黑色沉淀，出现沉淀的原因是
  - 酚妥拉明和多巴胺发生反应
  - 多巴胺和呋塞米发生反应
  - 酚妥拉明和呋塞米发生反应
  - 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

### 关于“扫我看视频”，你需要知道——

亲爱的读者，在本书各套试卷开始页附有赠送课程（扫我看视频）。扫描对应二维码，下载并安装“医学考试电子书APP”，即可观看学习。

若想获取更多的视频课程，建议选购正保医学教育网网上辅导课程，详情参见正保医学教育网（<http://www.med66.com>）招生方案。

- E. 多巴胺在葡萄糖溶液中分解
4. 微生物制剂双歧三联活菌胶囊需要在冷处贮存, 其贮存条件是指
- A. 温度不超过 20℃                      B. 温度 10℃ ~ 20℃
- C. 温度不超过 20℃ 且遮光              D. 温度不超过 -5℃ 且遮光
- E. 温度在 2℃ ~ 10℃ 之间
5. 某患者输注万古霉素 0.5g 溶解至 100ml 生理盐水中, 已知每毫升相当滴数为 15 滴, 要求滴注时间不得少于 1 小时, 请问每分钟滴数最多为
- A. 5 滴    B. 15 滴
- C. 25 滴    D. 30 滴
- E. 50 滴
6. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药
- A. 防风通圣丸(麻黄碱)                      B. 蛇胆川贝液(苦杏仁苷)
- C. 丹参片(丹参酮)                          D. 昆布片(碘)
- E. 六神丸(蟾蜍)
7. 患者, 男, 63 岁, 诊断为急性胰腺炎伴脂质代谢紊乱, 不宜静脉滴注的药物是
- A. 胰岛素注射液                              B. 头孢哌酮钠-他唑巴坦钠注射液
- C. 葡萄糖注射液                              D. 乌司他丁注射液
- E. 脂肪乳注射液
8. 严禁直接服用或口含的剂型是
- A. 缓释片                                      B. 泡腾片
- C. 含漱剂                                      D. 咀嚼片
- E. 舌下片
9. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是
- A. 氯苯那敏                                      B. 碳酸氢钠
- C. 坎地沙坦                                      D. 头孢哌酮
- E. 地塞米松
10. 导致肾损害和肾衰竭的不良事件是
- A. “刺五加事件”                              B. “马兜铃酸事件”
- C. “鱼腥草素钠事件”                          D. “罗非昔布事件”
- E. “克林霉素磷酸酯事件”

11. 患者,女,54岁,患有高血压、糖尿病和阴道炎,服用氢氯噻嗪、硝苯地平、二甲双胍、阿卡波糖和甲硝唑,该患者近日中暑后服用藿香正气水(含有乙醇),出现面部潮红、头痛、眩晕等症状,引起该症状的药物配伍是

- A. 氢氯噻嗪和藿香正气水
- B. 硝苯地平和藿香正气水
- C. 二甲双胍和藿香正气水
- D. 阿卡波糖和藿香正气水
- E. 甲硝唑和藿香正气水

12. 患儿,11个月,体重10kg,因感冒发热就诊,处方开具对乙酰氨基酚,已知对乙酰氨基酚成人剂量1次500mg,按体表面积计算该患儿一次剂量应为

- A. 60mg
- B. 80mg
- C. 100mg
- D. 120mg
- E. 130mg

13. 由于磷不能通过透析被清除,为防止高磷血症,腹膜透析者必须在进食的同时服用的药物是

- A. 铁剂
- B. 钙剂
- C. 钙镁磷合剂
- D. 磷软化剂
- E. 钙结合剂

14. I期临床试验阶段,试验样本数为多少例

- A. <10例
- B. 20~30例
- C. 200~300例
- D. 1000~3000例
- E. >2000例

15. 半衰期小于30分钟的药物应如何制定给药方案

- A. 治疗指数低的药物一般要口服给药
- B. 治疗指数高的药物一般要静脉滴注给药
- C. 治疗指数低的药物应分次给药
- D. 治疗指数高的药物应分次给药,但维持量要随给药间隔时间的延长而减小
- E. 治疗指数高的药物应分次给药,但维持量要随给药间隔时间的延长而增大

16. 出现粪便显黑色,有光泽,且粪隐血呈阳性症状时,首先考虑的疾病是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 阻塞性黄疸
- C. 痔疮,肛裂
- D. 胃、十二指肠溃疡伴出血
- E. 下消化道出血

17. 下列关于解热药的使用,叙述错误的是

- A. 退热属对症治疗, 可能会掩盖病情  
B. 多数解热镇痛药(肠溶制剂除外)宜在餐前服药  
C. 布洛芬用于晚期妊娠可使孕期延长  
D. 阿司匹林及其制剂可诱发变态反应, 出现荨麻疹和哮喘  
E. 解热镇痛药用于解热一般不超过 3 天
18. 患者, 男, 45 岁, 患有高血压。因感冒发热、咽痛、流鼻涕到药店买药, 药师不应推荐其使用的药物是
- A. 复方酚咖伪麻胶囊  
B. 维 C 银翘片  
C. 抗感灵片  
D. 扑感片  
E. 对乙酰氨基酚片
19. 具有较强的刺激性, 服用时不得嚼碎的缓泻药是
- A. 乳果糖  
B. 比沙可啶  
C. 聚乙二醇 4000  
D. 复方嗜酸乳杆菌片  
E. 洛哌丁胺
20. 关于阴道炎治疗用药注意事项与患者教育, 叙述错误的是
- A. 孕妇和哺乳期妇女禁用聚甲酚磺醛栓  
B. 细菌性阴道炎必须夫妻双方同时治疗  
C. 阴道连续用药不宜超过 10 天, 常同服复方维生素 B  
D. 甲硝唑对有活动性中枢神经系统疾病和血液病者禁用  
E. 使用硝酸咪康唑乳膏后若出现阴茎红肿, 需立即停药并用冷水冲洗
21. 烫伤后的应急处理措施, 错误的是
- A. 镇痛、镇静时应慎用或不用氯丙嗪  
B. 对局部小面积轻度烫伤可外涂京万红软膏  
C. 烧伤后补液不宜选用白开水或无盐饮料  
D. 立即用冷水或冰水湿敷或浸泡烫伤区域 20~30 分钟  
E. 可选用红汞、甲紫对烧伤部位进行消毒处理, 但切忌用塑料布包扎或覆盖创面烫伤
22. 高浓度可抑制肝药酶 CYP1A2 活性, 竞争性抑制氨茶碱代谢, 使茶碱血药浓度升高的是
- A. 扎鲁司特  
B. 灰黄霉素  
C. 利福平  
D. 卡马西平

E. 奥美拉唑

23. 治疗严重的先兆子痫首选

A. 呋塞米

B. 硫酸镁

C. 赖诺普利

D. 硝苯地平

E. 维拉帕米

24. 患者,女,55岁,临床诊断:2型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

处方:美托洛尔缓释片 47.5mg qd po

单硝酸异山梨酯缓释片 10mg qd po

瑞格列奈片 1mg tid po

阿卡波糖片 50mg tid po

甲钴胺片 0.5mg tid po

药师对该处方的审核和分析,正确的是

A. 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理

B. 选用美托洛尔缓释片不合理

C. 瑞格列奈片用量不合理

D. 选用阿卡波糖片不合理

E. 甲钴胺片用量不合理

25. 下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是

A. 银杏叶片

B. 叶酸

C. 阿司匹林

D. 口服避孕药

E. 非洛地平

26. 患者,男,60岁,呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“小字征”表现,确诊为帕金森病,患者同时患有闭角型青光眼。不宜使用的治疗帕金森病的药物是

A. 复方左旋多巴

B. 普拉克索

C. 多奈哌齐

D. 司来吉兰

E. 金刚烷胺

27. 某患者因抑郁症用氟西汀(35mg,早餐后顿服)治疗,用药7天后,症状并没有明显的改善,下列药师用药指导意见,正确的是

A. 药物剂量太小,应增大剂量

B. 此药疗效差,建议换用丙米嗪

C. 此药疗效差,建议换用舍曲林

- D. 单一用药无效, 建议联合使用氟伏沙明
- E. 抗抑郁药多数需要足够的疗程才会有显著的情绪改善, 建议继续服药
28. 以下治疗胃食管反流病的药物中, 可影响性功能的是
- A. 多潘立酮  
B. 西咪替丁  
C. 兰索拉唑  
D. 铝碳酸镁  
E. 枸橼酸铋钾
29. 关于胆石症的治疗及患者教育, 叙述错误的是
- A. 可用消炎利胆片进行治疗
- B. 绝大多数患者胆石症是不需要手术的
- C. 如无明确的细菌感染指征, 不要随意用抗菌药物
- D. 肥胖者要控制体重, 避免快速减重和不吃早餐
- E. 不针对胆石症或慢性胆囊炎长期服用中药或溶石药物
30. 某甲减患者已出现黏液性水肿昏迷, 此时宜首选的治疗药物是
- A. 静脉注射  $T_3$   
B. 静脉注射  $T_4$   
C. 口服  $T_3$   
D. 口服  $T_4$   
E. 放射性  $^{131}I$  治疗
31. 为比较不同  $\beta$  受体阻滞剂治疗高血压的经济性, 将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估, 此药物经济学评价方法是
- A. 成本-效益分析  
B. 最小成本分析  
C. 成本-效果分析  
D. 成本-效用分析  
E. 成本-费用分析
32. 早产儿为预防佝偻病, 服用维生素 D 的剂量为
- A. 400IU/d  
B. 100~200IU/d  
C. 200~400IU/d  
D. 800~1000IU/d  
E. 2000~4000IU/d
33. 可提示秋水仙碱严重中毒的前驱症状是
- A. 皮疹  
B. 发热  
C. 疼痛  
D. 骨髓抑制  
E. 胃肠道反应
34. 患者, 男, 70 岁, 患有高血压、2 型糖尿病、前列腺增生, 近日出现暂时性尿失禁症状, 怀疑与其服用的药物有关, 复核其使用的药物, 可能造成其尿失禁的

药物是

- A. 二甲双胍
- B. 非那雄胺
- C. 依那普利
- D. 氢氯噻嗪
- E. 格列本脲

35. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法, 错误的是

- A. 6个月~2岁以内婴幼儿为高危人群
- B. 恶性贫血者需要终生维持治疗
- C. 可静脉滴注维生素 B<sub>12</sub> 100~500μg
- D. 叶酸和维生素 B<sub>12</sub> 均为水溶性维生素
- E. 在不能确定只是由于单纯叶酸缺乏引起的贫血时, 叶酸应联合维生素 B<sub>12</sub> 治疗

36. 患者, 女, 45岁, 因成骨肉瘤使用环磷酰胺、甲氨蝶呤联合化疗, 用药过程中, 患者出现出血性膀胱炎, 适宜的处理措施是

- A. 停药, 给予糖皮质激素
- B. 给予糖皮质激素冲击治疗
- C. 停药, 水化, 给予美司钠治疗
- D. 给予抗生素治疗
- E. 不用处理, 待停药后自行缓解

37. 以下药品, 可以抑制骨髓造血功能的是

- A. 甲硝唑
- B. 曲克芦丁
- C. 辛伐他汀
- D. 甲氨蝶呤
- E. 阿奇霉素

38. 目前国内免费治疗艾滋病的一线方案为

- A. 拉米夫定+利巴韦林+奈韦拉平
- B. 齐多夫定+奈韦拉平+雷特格韦
- C. 奈韦拉平+洛匹那韦+雷特格韦
- D. 齐多夫定+奈韦拉平+拉米夫定
- E. 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平

39. 患者, 女, 50岁, 近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状, 临床诊断为围绝经期综合征, 在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是

- A. 乳腺增生
- B. 近6个月内患活动性静脉栓塞

- C. 严重肝功能障碍  
D. 血卟啉病  
E. 脑膜瘤
40. 用于解救地西洋过量或者中毒的特异性解救药物是  
A. 氟马西尼  
B. 谷胱甘肽  
C. 氟奋乃静  
D. 二巯丙醇  
E. 碘解磷定

## 二、配伍选择题

[41~42]

- A. 10~80mg  
B. 5~20mg  
C. 10~20mg  
D. 10~100mg  
E. 40~200mg

41. 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是  
42. 洛伐他汀的日剂量范围

[43~44]

- A. 西咪替丁  
B. 地红霉素  
C. 西酞普兰  
D. 奥美拉唑  
E. 度洛西汀

43. 属于肝药酶 CYP3A4 抑制剂的是  
44. 属于肝药酶 CYP2C19 抑制剂的是

[45~46]

- A. 重组人促红细胞生成素  
B. 硝酸甘油  
C. 硫酸阿托品  
D. 胃蛋白酶  
E. 松节油搽剂

45. 易风化的药物是  
46. 运输过程中不宜振摇的药品是

[47~48]

- A. 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液  
B. 头孢曲松与乳酸钠林格注射液  
C. 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液  
D. 青霉素与 5%葡萄糖注射液  
E. 维生素 C 与 5%葡萄糖注射液

47. 两种药物配伍容易形成白色微粒的是



48. 两种药物配伍之后效价降低的是

[49~51]

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 早晨 | B. 餐中 |
| C. 餐前 | D. 睡前 |
| E. 空腹 |       |

49. 氟西汀的适宜服用时间是

50. 复方三硅酸镁的适宜服用时间是

51. 比沙可啶的适宜服用时间是

[52~53]

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 硫酸亚铁  | B. 维生素 D |
| C. 西咪替丁  | D. 左旋多巴  |
| E. 甲苯磺丁脲 |          |

52. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的药品是

53. 服药期间进食高蛋白食物可阻碍吸收的药品是

[54~56]

- A. 药品标签和包装缺陷
- B. 静脉用药的浓度计算错误
- C. 患者自行选购药品而致误用假药、劣药
- D. 老年痴呆患者误服药物
- E. 医院计算机医嘱系统缺陷导致用药错误
54. 以上用药错误的事例中, 属于“认知缺失或障碍”的是
55. 以上用药错误的事例中, 属于“管理缺失”的是
56. 以上用药错误的事例中, 属于“操作失误”的是

[57~58]

- |              |                |
|--------------|----------------|
| A. 铋制剂       | B. 卡托普利        |
| C. 布地奈德气雾剂   | D. 磺胺类、氟喹诺酮类药物 |
| E. 特拉唑嗪、多沙唑嗪 |                |

57. 应提示患者使用该药物后应漱口, 并将漱口水吐出的是

58. 应提示患者服用该药后可能会出现咳嗽的是

[59~60]

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| A. 氟喹诺酮类抗生素 | B. $\beta$ 内酰胺类抗生素 |
|-------------|--------------------|

C. 磺胺类药物 D. 糖皮质激素

E. 氨基糖苷类抗生素

59. 儿童长期使用会导致发育迟缓、身材矮小、免疫力低下的药物是

60. 可引起儿童第Ⅷ对脑神经损伤的药物是

[61~62]

A. I 期临床试验

B. II 期临床试验

C. III 期临床试验

D. IV 期临床试验

E. 临产前实验

61. 试验样本数 $\geq 2000$  例的临床药理学评价试验阶段是

62. 初步的临床药理学评价试验阶段是

[63~65]

A. 正常血象

B. 轻度贫血

C. 中度贫血

D. 重度贫血

E. 极重度贫血

63. Hb 量 $>90\text{g/L}$  但低于正常参考的下限可诊断为

64. Hb 量为  $61\sim 90\text{g/L}$  可诊断为

65. Hb 量为  $31\sim 60\text{g/L}$  可诊断为

[66~67]

A. 0.1% 酞丁安滴眼液

B. 两性霉素 B 滴眼液

C. 左氧氟沙星滴眼液

D. 0.1% 碘苷滴眼液

E. 醋酸可的松滴眼液

急性结膜炎的非处方药治疗

66. 流行性结膜炎宜选用

67. 过敏性结膜炎宜选用

[68~69]

A. 多潘立酮片

B. 铝碳酸镁咀嚼片

C. 乳酶生片

D. 甲氧氯普胺片

E. 酵母片

68. 患者, 男, 48 岁, 因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药, 药师应推荐的药品是

69. 患者, 男, 48 岁, 因胆汁反流、腹痛来药店购药, 药师应推荐的药品是

[70~71]

- A. 维生素 AD
- B. 维生素 C
- C. 复合维生素 B
- D. 葡萄糖酸钙
- E. 硫酸亚铁

70. 可预防坏血病但孕妇过量服用可诱发新生儿坏血病的药物是

71. 可用于治疗贫血但可引起便秘并排黑便的药物是

[72~73]

- A. 盐酸异丙嗪
- B. 氯苯那敏
- C. 炉甘石洗剂
- D. 泼尼松
- E. 氯雷他定

关于荨麻疹的药物治疗

72. 局部用药可选择具止痒和收敛作用的非处方药是

73. 对病情严重者推荐口服第二代抗组胺处方药

[74~75]

- A. 布地奈德
- B. 异丙托溴铵
- C. 沙丁胺醇
- D. 羧甲司坦
- E. 多索茶碱

74. 起效快, 可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

75. 可稀释痰液, 并借助咳嗽反射帮助痰液排出, 避免堵塞气道的药品是

[76~78]

- A. 粒细胞减少症
- B. 消化性溃疡
- C. 慢性肾衰竭
- D. 溶血性贫血
- E. 心跳骤停

76. 抗癫痫药物苯妥英钠, 可引起的典型药源性疾病是

77. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶, 可引起的典型药源性疾病是

78. 快速静脉滴注两性霉素 B, 可能引起

[79~80]

- A. 普萘洛尔
- B. 氢氯地平
- C. 氯沙坦
- D. 哌唑嗪
- E. 氢氯噻嗪

79. 患者, 男, 65 岁, 因高血压长期服用抗高血压药, 近日患者出现足踝部水

肿,引起此不良反应的药物是

80. 患者,男,65岁,诊断为高血压(2级),同时有哮喘病史,不宜选用的药物是  
[81~82]

- A. 胺碘酮
- B. 美托洛尔
- C. 硝苯地平
- D. 维拉帕米
- E. 去乙酰毛花苷

81. 心房颤动并伴有明显左心室肥大等器质性心脏病患者,宜首选的药物是

82. 房颤合并有支气管哮喘患者,最适宜选用的控制心室率的药物是

[83~85]

- A. 奥美拉唑
- B. 泼尼松龙
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮
- E. 西咪替丁

83. 宜于餐后或睡前顿服的组胺 H<sub>2</sub>受体拮抗剂是

84. 宜于餐前 30 分钟服用的质子泵抑制剂是

85. 宜于餐前 1 小时或睡前服用的胃黏膜保护剂是

[86~87]

- A. 苯溴马隆
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 阿司匹林
- D. 丙磺舒
- E. 别嘌醇

86. 痛风急性发作者不宜服用,因可能发生转移性痛风的药物是

87. 痛风急性期不宜用,因可引起血尿酸水平升高而加重痛风症状的药物是

[88~90]

- A. 白消安
- B. 甲氨蝶呤
- C. 柔红霉素
- D. 氟尿嘧啶
- E. 博来霉素

88. 沿静脉出现迂回线状色素沉着,迅速晒黑而无灼痛或红斑的抗肿瘤药是

89. 在躯干部引起鞭打状色素沉着和膝肘部及甲周色素沉着的抗肿瘤药是

90. 引起弥漫性青铜色色素沉着,酷似 Addison 病的抗肿瘤药是

### 三、综合分析选择题

[91~93]

患者，女，62岁，既往有糖尿病、高血压病、高脂血症等病史，近期进行了心脏支架手术。医师处方如下：

姓名	董某	性别	女	年龄	62
临床诊断：	R:				
2型糖尿病	氨氯地平片 5mg×7×4 盒/5mg tid po 清晨				
高血压 2级	氯吡格雷片 75mg×7×4 盒/750mg qd po 清晨				
高脂血症	辛伐他汀片 20mg×7×4 盒/20mg qd po 清晨				
PCI 术后	二甲双胍片 0.25g×48×3 盒/0.5g tid po 餐中				
	阿卡波糖片 50mg×30×3 盒/50mg tid po 与第一口饭同服				

91. 本处方中，给药次数错误的是

- A. 氯吡格雷
- B. 氨氯地平
- C. 辛伐他汀
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

92. 本处方中，单次给药剂量错误的是

- A. 氯吡格雷
- B. 氨氯地平
- C. 辛伐他汀
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

93. 本处方中，给药时间错误的是

- A. 氯吡格雷
- B. 氨氯地平
- C. 辛伐他汀
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

[94~96]

某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg，说明书部分内容节选如下，请回答问题。

【用法用量】部分注明如下内容：

开始服药前，未使用激素类避孕药的妇女(过去 1 个月)应该在妇女自然月经周期的第 1 天开始服药(即月经出血的第 1 天)。也可以在第 2~5 天始，这种情况下，推荐在第一个服药周期的最初 7 天内，加用屏障避孕法。